

## **Bijsluiter : informatie voor de gebruiker**

### **NORIT 250 mg tabletten** **NORIT 200 mg capsules, hard** *Actieve kool*

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt zij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Norit en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Norit en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Norit bevat actieve kool. Dit zal schadelijke stoffen binden in het maagdarmkanaal en ze op deze manier mee afvoeren.

Norit wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen en bij de symptomen van diarree. Soms wordt Norit toegediend bij een maagspoeling. Dat gebeurt dan meestal in het ziekenhuis.

Norit bestaat onder de vorm van tabletten en capsules, hard.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij vergiftigingen (veroorzaakt) door **sterke zuren, basen** of **petroleumhoudende stoffen**.
- Vlak voor een inwendig **onderzoek van slokdarm of maag** (endoscopie).

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt, waaronder ook voorbehoedsmiddelen. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

- Norit kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in zeer hoge doses wordt gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot **spijsverteringsmoeilijkheden** en **vitaminetekort**.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Norit kan in de darm een hele reeks stoffen aan zich binden. Hierdoor kunnen ook geneesmiddelen gebonden en met de stoelgang mee uitgedreven worden. Op die manier kan er onvoldoende van dat geneesmiddel opgenomen worden en kan de werking verminderen.

- Volgende producten kunnen o.a. aan Norit gebonden worden: sommige **antibiotica**, middelen die inwerken op de **bloedstolling**, **braakmiddelen**.
- De werking van orale voorbehoedsmiddelen (“**de pil**”) kan worden verstoord bij gelijktijdige toediening van actieve kool. Gebruik daarom een ander en betrouwbaar voorbehoedsmiddel gedurende de behandeling met Norit.
- **Aspirine** (pijnstiller en bloedverdunner) en **furosemide** (geneesmiddel dat de urineproductie bevordert: “**plaspil**”) kunnen zich eveneens aan Norit binden. Een dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.
- **Fenytoïne** en **carbamazepine** (beiden gebruikt bij vallende ziekte (epilepsie)) binden zich ook aan Norit. Bij gelijktijdig gebruik moet het gehalte van deze geneesmiddelen in het bloed gecontroleerd te worden. Een dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.

Gebruikt u naast Norit nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

#### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Norit kan spijsverteringsenzymen en vitaminen binden wanneer het in zeer hoge doses wordt gegeven. Dit kan soms aanleiding geven tot spijsverteringsmoeilijkheden en vitaminetekort.

#### **Zwangerschap, borstvoeding**

Norit kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing.

#### **Norit bevat lactose, sucrose en natrium**

Norit 250 mg tabletten bevat de suikers **lactose** en **sucrose**. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Norit 250 mg tabletten bevat natrium. Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

### **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indien er geen beterschap optreedt na 7 dagen, raadpleeg dan uw arts opnieuw.

Neem Norit (zowel de tabletten als de capsules) steeds via de mond in met een beetje water.

	<b>De tabletten (250 mg)</b>	<b>De capsules (200 mg)</b>	<b>Opmerkingen</b>
<b>Diarree</b>	3 tot 5 tabletten per keer innemen.  Tot 3 keer per dag herhalen.	3 tot 4 capsules per keer innemen.  Tot 3 keer per dag herhalen (of vaker indien nodig).	Stop de behandeling met Norit als de diarree verdwenen is.  Bij ernstige diarree moet het vochteevenwicht hersteld worden. De arts kan dit doen door opgeloste zouten bij u in te spuiten.
<b>Vergiftiging</b>	Onmiddellijk 10 tabletten innemen.  Aantal keer herhalen met korte tussenpozen.	Onmiddellijk 10 tot 20 capsules innemen.  Aantal keer herhalen met korte tussenpozen.	Deze dosis is een voorgestelde dosis. Volg de aanwijzingen van uw arts steeds nauwgezet op.  Na de inname van Norit kan de arts een maagspoeling uitvoeren of Norit met water mengen en via een maagsonde toedienen

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u teveel van Norit heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (**070/245.245**).

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: zeer vaak ( $\geq 1/10$ ); vaak ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); soms ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ); zelden ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ); zeer zelden ( $< 1/10000$ ).

Zeer vaak: zwart gekleurde stoelgang. Dit heeft echter geen enkele schadelijke invloed.

Vaak: braken en constipatie.

Soms: maagdarmonobstructie.

Zeer zelden: acute blindedarmonsteking (appendicitis).

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie, Galileelaan 5/03, 1210 Brussel, Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be), e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, de blisterverpakking en de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de tabletten of capsules zijn verkleurd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in Norit 200 mg capsules, hard en Norit 250 mg tabletten is actieve kool.
- De andere stoffen in Norit 250 mg tabletten zijn sucrose, lactose, natriumcarboxymethylcellulose en magnesiumstearaat.
- De andere stoffen in Norit 200 mg capsules, hard zijn gelatine, titaandioxide en ijzeroxide.

### Hoe ziet Norit eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Norit 250 mg tabletten: verpakking met 75 tabletten, verpakt in polypropyleen tablettencontainer.

Norit 200 mg capsules, hard: 30 capsules, hard in blisterverpakking.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

KELA Pharma nv  
Sint Lenaartseweg 48  
B-2320 HOOGSTRATEN

*Fabrikant*

Cabot Norit Nederland B.V.  
Mr. Ovingkanaal 0.Z.3  
NL-7891 EV KLAZIENAVEEN

### Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

Norit 250 mg tabletten: BE084883.  
Norit 200 mg capsules, hard: BE123837.

### Algemene indeling voor de aflevering

Vrije aflevering.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 08/2021**