

**B. BIJSLUITER**

**BIJSLUITER**  
CONTRALAC 2 mg, tabletten voor teven.

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:  
VIRBAC  
1<sup>ère</sup> Avenue – 2065 m – L.I.D.  
06516 CARROS FRANKRIJK

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

CONTRALAC 2 mg, tabletten voor teven.

**3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)**

**Werkzame bestanddelen:**

Metergoline .....	2	mg
Hulpstof..... qsp	1	tablet

**Hulpstoffen**

Carboxymethylcellulose zetmeel, povidon, aardappelzetmeel, magnesiumstearaat, lactose

**4. INDICATIE(S)**

Onderbreken lactatie na pseudo dracht Onderbreken lactatie post-partum.

**5. CONTRA-INDICATIE(S)**

CONTRALAC niet gebruiken bij zwangerschap.  
Niet gebruiken bij gekenden hypersensitiviteit aan metergoline.

**6. BIJWERKINGEN**

Braken in het begin van de behandeling. Matige diarree.  
Gedrag modificatie (opwinding of ongerustheid).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts te contacteren.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

**7. DOELDIERSOORT**

Honden (teven)

## 8. DOSERING VOOR ELK DOELDIER , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Teef:

0,2 mg metergoline per kg per dag verdeeld over twee doses :1 tablet 's ochtends en 's avonds per 20 kg gewicht.

## 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De gebruikelijke behandeling is 4 dagen. Bij aanhoudende klachten na het einde van de behandeling, verlengen met nogmaals 4 dagen (8 dagen in totaal).

## 10. WACHTTIJD

Niet van toepassing

## 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht. Niet bewaren boven 25° C.

Dit diergeneesmiddel niet meer gebruiken na de uiterste vervaldatum vermeld op de buitenverpakking na EXP.

De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand

## 12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

### Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De mogelijke bijwerkingen in het algemeen waargenomen vereisen in het algemeen geen stoppen van de behandeling wat afhangt van de beslissing van de behandelende dierenarts. Indien het dier een gedragsverandering heeft met agressie, zou het beter zijn om de behandeling te stoppen. De spectaculaire daling van het borst volume kan ertoe leiden de behandeling te vroeg te stoppen. Een terugval kan dan optreden. Herbehandeling wordt aangegeven.

### Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het geneesmiddel aan de dieren

toedient. Vermijd direct contact in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel.

In geval van accidentele inname, een arts raadplegen.

### Gebruik tijdens dracht, lactatie.

CONTRALAC niet gebruiken bij de dracht.

**Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie** Interactie met serotonerge en dopaminerge middelen

### Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota, indien noodzakelijk)

Braken bij het begin van de behandeling kan worden behandeld met anti-emetica.

## 13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze

maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu

**14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

November 2017.

**15. OVERIGE INFORMATIE**

Doos van 1 of 2 blisters met 8 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

BE-V166932

Op diergeneeskundig voorschrift .