

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR PATIENTEN

### Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen, Lösung

Natriumcromoglicat

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen beachten?
3. Wie ist Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. WAS IST ALLERGO-COMOD 20 MG/ML AUGENTROPFEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen enthalten den Wirkstoff Natriumcromoglicat, eine Substanz gegen Allergie.

Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen wird zur Vorbeugung einer Entzündung des Auges verwendet, die durch Allergien verursacht wird.

#### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ALLERGO-COMOD 20 MG/ML AUGENTROPFEN BEACHTEN?

##### Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen Natriumcromoglicat oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- während der ersten drei Schwangerschaftsmonate.

##### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Nach der Behandlung mit Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen sind die folgenden Maßnahmen zu treffen, um eine systemische Resorption zu vermeiden:
  - das Augenlid für 2 Minuten geschlossen halten,
  - den Tränenkanal für 2 Minuten mit dem Finger verschließen.
- Vor der Behandlung die Hände gründlich waschen. Kontakt zwischen der Flaschenspitze und den Augen oder den Augenlidern vermeiden. Das Fläschchen sofort nach der Anwendung wieder verschließen.
- Dauern die Symptome an, ohne dass eine Besserung eintritt, ist ärztlicher Rat einzuholen.
- Bei gleichzeitiger Anwendung anderer Arzneimittel, lesen Sie den Abschnitt "*Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln*".

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen anwenden.

#### **Kinder und Jugendliche**

Nicht zutreffend.

#### **Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Bei gleichzeitiger Anwendung anderer Augentropfen warten Sie 15 Minuten zwischen jeder Behandlung.

#### **Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen zusammen mit Nahrungsmitteln oder Getränken**

Nicht zutreffend.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Obwohl keine negativen Effekte auf den Fötus bekannt sind, sollte die Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen nach Möglichkeit während der Schwangerschaft, insbesondere während der ersten drei Monate, vermieden werden.

Im Fall einer Schwangerschaft sollte die Anwendung dieses Arzneimittels nur nach Absprache mit Ihrem Arzt erfolgen.

Obwohl keine negativen Effekte auf den Fötus bekannt sind, sollte die Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen nach Möglichkeit während der Stillzeit vermieden werden.

Während der Stillzeit sollte die Anwendung dieses Arzneimittels nur nach Absprache mit Ihrem Arzt erfolgen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Unmittelbar nach der Anwendung der Augentropfen kann eine vorübergehende Beeinträchtigung des Sehvermögens auftreten.

### **3. WIE IST ALLERGO-COMOD 20 MG/ML AUGENTROPFEN ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Liegt zu Beginn der Behandlung bereits eine starke Augenreizung vor, kann eine Verabreichung von Corticosteroiden (Substanz zur Behandlung von Entzündungen) notwendig sein, um den vorliegenden Entzündungsprozess zu stoppen.

Vor der Behandlung die Hände gründlich waschen. Kontakt zwischen der Flaschenspitze und den Augen oder den Augenlidern vermeiden. Das Fläschchen sofort nach der Anwendung wieder verschließen.

Soweit nicht anders verordnet, geben Sie vier Mal täglich 1 Tropfen in jedes Auge.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen wie lange Sie Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen anwenden sollen. Brechen Sie Ihre Behandlung nicht vorzeitig ab.

Da Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen einen vorbeugenden Effekt haben, ist es wichtig während der gesamten Zeit, in der Sie dem Allergen ausgesetzt sind, eine kontinuierliche Behandlung zu gewährleisten. Die Symptome der Bindehautentzündung können wieder auftreten, sobald die kontinuierliche Behandlung unterbrochen wird.

#### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Die Dosierung ist für Kinder und Erwachsene gleich.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen angewendet haben als Sie sollten**

Wenn Sie zuviel von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen angewendet haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder der Vergiftungszentrale (Telefon 070/245.245) auf.

Es sind keine toxischen Effekte zu erwarten, wenn Sie zuviel Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen verabreicht haben.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen abbrechen**

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen sind möglich bei der Verwendung von Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen:

- Überempfindlichkeitsreaktionen.
- Vorübergehende Missempfindungen wie Kribbeln oder Brennen.
- Unmittelbar nach der Anwendung der Augentropfen kann eine vorübergehende Beeinträchtigung des Sehvermögens auftreten.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

#### **Belgien:**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz:

Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

**Luxemburg** :Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST ALLERGO-COMOD 20 MG/ML AUGENTROPFEN AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
Nicht über 25 °C lagern.

Nicht länger als 3 Monate nach Anbruch der Flasche zu verwenden.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach «EXP» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen enthält**

- Der Wirkstoff ist Natriumcromoglicat 20 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumedetat, Sorbitol, Wasser für Injektionszwecke bis 10 ml.

### **Wie Allergo-COMOD 20 mg/ml Augentropfen aussieht und Inhalt der Packung** Augentropfen im 10 ml Fläschchen

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Unternehmer:

URSAPHARM Benelux B.V., Steenovenweg 5, NL-5708 HN Helmond  
Tel: +31-492-472 473, Fax: +31-492-472 673, E-mail: info@ursapharm.be

Hersteller:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Deutschland

Zulassungsnummer:

BE210567

LU: 2000090051

Abgabestatus: nicht verschreibungspflichtig

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 12/2023.**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 07/2024.**