

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Lambo Glyzerinzäpfchen Erwachsene 3,7 g
Lambo Glyzerinzäpfchen Kinder 2 g
Lambo Glyzerinzäpfchen Säuglinge 1 g

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Sie Lambo Glyzerinzäpfchen dennoch genau anwenden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht benötigen Sie diese später nochmals.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Lambo Glyzerinzäpfchen und wofür werden diese angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Lambo Glyzerinzäpfchen beachten?
3. Wie sind Lambo Glyzerinzäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Lambo Glyzerinzäpfchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND LAMBO GLYZERINZÄPFCHEN UND WOFÜR WERDEN DIESE ANGEWENDET?

Glyzerin gehört zu den Laxiermitteln. Zieht im Darm Wasser an und macht den Stuhlgang weich. Dadurch wird der Darm innerhalb von 30 Minuten zur Entlastung angeregt.

Behandlung von willkürlicher Konstipation.

Wenn Sie nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LAMBO GLYZERINZÄPFCHEN BEACHTEN?

Lambo Glyzerinzäpfchen dürfen nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen Glyzerin oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- bei verstopftem Darmkanal;
- bei Bauchschmerzen mit unbekannter Ursache;
- bei Übelkeit und Erbrechen;
- bei entzündetem Grimmdarm und Anusfissuren;
- bei Austrocknungserscheinungen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- wenn Sie in einem fortgeschrittenen Alter sind;
- wenn Sie an der Zuckerkrankheit leiden;
- bei längerer Anwendung der Zäpfchen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Anwendung von Lambo Glyzerinzäpfchen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wassertreibende Arzneimittel können Störungen des inneren Mineralstoffhaushalts verschlimmern.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft:

Lambo Glyzerinzäpfchen dürfen angewendet werden während der Schwangerschaft.

Stillzeit:

Lambo Glyzerinzäpfchen dürfen angewendet werden während der Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Ohne Einfluss

3. WIE SIND LAMBO GLYZERINZÄPFCHEN ANZUWENDEN ?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau an wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt täglich 1 oder 2 Zäpfchen, in den Anus einführen.

Das Einführen der Zäpfchens wird vereinfacht, wenn man sie anfeuchtet, damit sie besser gleiten.

Eine langfristige Anwendung von Laxiermitteln ist zu vermeiden. Sie müssen versuchen, durch eine Anpassung der Ernährung und Veränderung der Lebensgewohnheiten die chronische Verstopfung zu überwinden.

Anwendung bei Kindern

Die empfohlene Dosis beträgt täglich 1 oder 2 Zäpfchen, in den Anus einführen.

Das Einführen der Zäpfchens wird vereinfacht, wenn man sie anfeuchtet, damit sie besser gleiten.

Eine langfristige Anwendung von Laxiermitteln ist zu vermeiden. Sie müssen versuchen, durch eine Anpassung der Ernährung und Veränderung der Lebensgewohnheiten die chronische Verstopfung zu überwinden.

Wenn Sie eine größere Menge von Lambo Glyzerinzäpfchen angewendet haben, als Sie sollten:

Nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antigiftzentrum (070/245.245) auf, wenn Sie zu viel Lambo Glyzerin verwendet haben

Bei rektaler Einnahme von Glycerin ist kein Risiko einer Überdosierung bekannt. Eine zufällige orale Einnahme großer Mengen von Glyzerinzäpfchen kann zu Schleimhautreizungen, Brechreiz, Kopfschmerzen und Durstgefühl führen.

Trinken von Flüssigkeit ist zu empfehlen.

Bei extremen Fällen kann sich ein zu hoher Blutzuckergehalt einstellen. Dieser muss von einem

Arzt festgestellt und behandelt werden.

Wenn Sie die Anwendung von Lambo Glyzerinzäpfchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittel haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Selten können rektale Irritationen oder ein Verbrennungsgefühl auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. WIE SIND LAMBO GLYZERINZÄPFCHEN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern.

Wenn Sie die Zäpfchen an einem kühlen Ort lagern, lassen Sie das Zäpfchen eine halbe Stunde vor der Verwendung auf Zimmertemperatur kommen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach "EXP" angegeben Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf dem letzten Tag des angegebenen Monats.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie bemerken dass die Zäpfchen verfärbt sind.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Lambo Glyzerinzäpfchen enthält

- Der Wirkstoff ist Glyzerin 65 %
- Die sonstigen Bestandteile sind Gelatine 13 % und gereinigtes Wasser 22 %.

Wie Lambo Glyzerinzäpfchen aussieht und Inhalt der Packung

Packung zu 10 und 100 Zäpfchen für Erwachsene, Packung zu 10 Zäpfchen für Kinder oder Packung zu 10 Zäpfchen für Säuglinge.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Laboratoria LAMBO N.V.

Simon de Heuvellaan 4

B - 2110 Wijnegem (Belgien)

Tel.: 03 236 23 64

Fax: 03 235 12 93

E-mail: info@labo-lambo.be

Zulassungsnummer:

BE193645 (Erwachsene 10 Zäpfchen)

BE207952 (Erwachsene 100 Zäpfchen)

BE193636 (Kinder 10 Zäpfchen)

BE193627 (Säuglinge 10 Zäpfchen)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 01/2018.