

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Fagrocerine adultes 3,7 g, suppositoires
Fagrocerine enfants 2 g, suppositoires
Fagrocerine nourrissons 1 g, suppositoires

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou par votre pharmacien.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale, néanmoins, il est nécessaire de l'employer soigneusement afin d'obtenir les meilleurs résultats.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez votre médecin.
- Si vous ressentez un des effets indésirables mentionnés dans la rubrique 4 ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Fagrocerine et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ce médicament ?
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE FAGRO CERINE ET DANS QUEL CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

Ce médicament appartient au groupe des laxatifs. Elle attire l'eau dans l'intestin et ramollit les selles, ce qui stimule l'intestin et permet l'évacuation dans les 30 minutes.

Vous pouvez employer ce médicament pour le soulagement temporaire d'une constipation passagère.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER CE MÉDICAMENT ?

N'utilisez pas ce médicament

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6;
- en cas de paralysie intestinale;
- en cas de douleur abdominale de cause inconnue;
- en cas de nausées et vomissements;
- en cas d'inflammation rectale et fissures anales;
- en cas de symptômes de déshydratation.

Faites attention avec ce médicament

- si vous êtes âgée;
- si vous êtes diabétique;
- en cas d'utilisation prolongée.

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Utilisation d'autres médicaments

Les diurétiques peuvent aggraver les troubles électrolytiques.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez d'autres médicaments ou si vous en avez utilisés récemment ou si vous pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Grossesse:

Fagrocerine peuvent être utilisés pendant la grossesse

Allaitement:

Fagrocerine peuvent être utilisés pendant l'allaitement

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines

Fagrocerine n'ont pas d'effet sur l'aptitude à conduire ou sur l'utilisation de machines.

3. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin ou votre pharmacien vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

La dose recommandée est de 1 à 2 suppositoires par jour. Introduire profondément dans l'anus. L'introduction d'un suppositoire est facilitée par son humidification, ce qui lui permet de mieux glisser.

L'utilisation prolongée d'un laxatif doit être évitée. Il faut essayer de vaincre la constipation chronique par l'adaptation du régime alimentaire et par des changements du mode de vie.

Utilisation chez les enfants

La dose recommandée est de 1 à 2 suppositoires par jour. Introduire profondément dans l'anus. L'introduction d'un suppositoire est facilitée par son humidification, ce qui lui permet de mieux glisser.

L'utilisation prolongée d'un laxatif doit être évitée. Il faut essayer de vaincre la constipation chronique par l'adaptation du régime alimentaire et par des changements du mode de vie.

Si vous avez pris plus de Fagrocerine que vous n'auriez dû:

Si vous avez utilisé ou pris trop de Fagrocerine prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245)

Il n'y a pas de risque de surdosage connu pour l'administration rectale de la glycérine.

L'ingestion orale accidentelle de grandes quantités Fagrocerine peut provoquer l'irritation des muqueuses, des nausées, des maux de tête ou de la soif.

L'absorption d'eau peut être proposée.

Dans le cas extrême d'apparition de glycémie sanguine trop élevée, il faut faire appel au médecin pour la confirmer et traiter.

Si vous avez oublié de prendre Fagrocerine:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Une irritation rectale ou une sensation de brûlure peuvent apparaître rarement.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, www.afmps.be, Division Vigilance : site internet : www.notifieruneffetindesirable.be, e-mail : adr@fagg-afmps.be.

5. COMMENT CONSERVER FAGRO CERINE?

Conserver en dessous de 25 °C.

Si vous aviez conservé les suppositoires au froid, il faut laisser le suppositoire à température ambiante une demi-heure avant l'introduction.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiqué sur l'étiquette après la mention «EXP». La date péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que les suppositoires ont changé de couleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Que contient ce médicament ?

- La substance active est glycérine 65 %
- Les autres composants sont gélatine 13 % et de l'eau purifiée 22 %.

Aspect de Fagrocérine et contenu de l'emballage

Boîtes de 10 et 100 suppositoires pour adultes, boîte de 10 suppositoires pour enfants et boîte de 10 suppositoires pour nourrissons.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché :

Fagron Belgium N.V.
Venecoweg 20A
9810 Nazareth-De Pinte
Belgique
E-mail: info@fagron.be

Fabricant:

Laboratoires LAMBO S.A.
Simon de Heuvellaan 4
B - 2110 Wijnegem (Belgique)

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché:

BE 193645 (Adultes 10 pièces)
BE207952 (Adultes 100 pièces)
BE193636 (Enfants 10 pièces)
BE193627 (Nourrissons 10 pièces)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvé est 07/2025.