Gebrauchsinformation: Information für Anwender

MEDICA HALSSPRAY LEMON 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

Chlorhexidindigluconat - Lidocain Hydrochlorid Monohydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Artz.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Medica Halsspray Lemon und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Medica Halsspray Lemon beachten?
3. Wie ist Medica Halsspray Lemon anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Medica Halsspray Lemon aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Medica Halsspray Lemon und wofür wird es angewendet?

Medica Halsspray Lemon ist ein Spray für die lokale Anwendung in Mund- und Rachenraum.
Es ist ein Desinfektionsmittel und lokal schmerzstillendes Mittel.
Medica Halsspray Lemon ist angezeigt bei:

- Behandlung der Symptome von Halsschmerzen, rotem Hals, Erkrankungen der Rachenhöhle mit Reizungen.

Im Fall einer bakteriellen Infektion mit Fieber ist eine ergänzende Behandlung erforderlich.
Medica Halsspray Lemon enthält keinen Zucker und ist folglich auch für Diabetiker geeignet.
Wenn Sie sich nach 3 bis 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Medica Halsspray Lemon beachten?

Medica Halsspray Lemon darf nicht angewendet werden,

- Wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidindigluconat oder Lidocain Hydrochlorid Monohydrat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei Kindern unter 2,5 Jahren (30 Monaten).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Medica Halsspray Lemon anwenden.

- Medica Halsspray Lemon darf nicht langanhaltend, ununterbrochen oder immer wieder verwendet werden. Beschränken Sie den Gebrauch lediglich auf die notwendige Linderung von Schmerzen und Reizungen.
- Kontakt mit den Augen und Ohren ist zu vermeiden. Sollte das Spray doch einmal in die Augen gelangen, müssen diese sofort und gründlich mit Wasser ausgespült werden.
- Wenn eine zu hohe Dosis verwendet wird (mehr als 1 Flasche pro Tag), besteht ein geringes Risiko einer verminderten Kontrolle des Schluckreflexes.
- Wenn Sie zu extremen Allergien neigen.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel anwenden. Bitte lesen Sie auch die Abschnitt: „Anwendung von Medica Halsspray Lemon zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Kinder

Dieses Arzneimittel darf nicht bei Kindern unter 2,5 Jahren angewendet werden.

Anwendung von Medica Halsspray Lemon zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

- Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln für leichte Formen von Alzheimer (Cholinesterasehemmern) anwenden.
- Nicht gleichzeitig mit anderen Desinfektionsmitteln anwenden.

Anwendung von Medica Halsspray Lemon zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Medica Halsspray Lemon enthält Alkohol. Bitte lesen Sie auch die Abschnitt: „Medica Halsspray Lemon enthält Ethanol (E1510) und Propylenglykol (E1520)“.

Werden die vorangegangenen Vorsichtsmaßnahmen respektiert, kann Medica Halsspray Lemon während der Schwangerschaft und der Stillzeit benutzt werden. Informieren Sie Ihren Arzt über die Benutzung dieses Arzneimittels.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Medica Halsspray Lemon enthält Ethanol (E1510) und Propylenglykol (E1520)

Dieses Arzneimittel enthält max. 100 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 Zerstäubungen. Die Menge pro 5 Zerstäubungen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 3 ml Bier oder 2 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Dieses Arzneimittel enthält 85 mg Propylenglykol pro 5 Zerstäubungen.

3. Wie ist Medica Halsspray Lemon anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene: 3 bis 5 Zerstäubungen pro Anwendung, 6 bis 10 Mal pro Tag.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Kinder ab 12 Jahren: 3 bis 5 Zerstäubungen pro Anwendung, 6 bis 10 Mal pro Tag.

Kinder ab 2,5 Jahren (30 Monaten): 2 bis 3 Zerstäubungen pro Anwendung, 3 bis 5 Mal pro Tag.

Zerstäuber auf die Rachenhöhle richten und Spraykopf eindrücken.

Dieses Arzneimittel darf nicht über einen längeren Zeitraum benutzt werden. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, falls sich die Symptome verschlimmern oder nicht verbessern nach 3 bis 4 Tagen.

Es empfiehlt sich, den Zerstäuber präventiv täglich gemäß dem folgenden Verfahren zu reinigen:

1. Drehen Sie das Spray um und drücken Sie den Sprühknopf, bis keine Flüssigkeit mehr herauskommt.
2. Entfernen Sie den Zerstäuber aus der Sprühpumpe und geben Sie ihn einige Minuten in ein Warmwasserbad.
3. Nehmen Sie den Zerstäuber aus dem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.
4. Geben Sie den trockenen Zerstäuber auf die Sprühpumpe, indem Sie diese nach unten drehen, bis die Sprühpumpe blockiert.

Wenn Sie eine größere Menge von Medica Halsspray Lemon angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Medica Halsspray Lemon angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Dieses Arzneimittel enthält lediglich einen Bruchteil einer giftigen (toxischen) Dosis. Bei richtiger Anwendung sind die Risiken auf eine Überdosierung sehr gering.
Symptome einer Überdosierung sind: Ruhelosigkeit, Ohrensausen, Atmungsschwierigkeiten, Herzrhythmusstörungen, Verringerung der Kontrolle des Schluckreflexes.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bei korrekter Anwendung wird dieses Arzneimittel gewöhnlich gut vertragen.

- Es kann zu Geschmacksstörungen, einem brennenden Gefühl auf der Zunge und schweren allergischen Reaktionen (anaphylaktischen Reaktionen mit Symptomen sowie Übelkeit, Schwindelgefühl, Atemnot und niedriger Blutdruck) kommen. Beenden Sie die Anwendung von Medica Halsspray Lemon und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Sehr selten: allergische Haut- und Schleimhautreaktionen.
- Bei langanhaltender, ununterbrochener Anwendung kann eine bräunliche Verfärbung der Zähne auftreten. Diese Verfärbung ist jedoch leicht zu entfernen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - www.afmps.be - Abteilung Vigilanz: Website: www.notifieruneffetindesirable.be - E-mail: adr@fagg-afmps.be.

Luxemburg:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg - Website: www.guichet.lu/pharmakovigilanz.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Medica Halsspray Lemon aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

Was Medica Halsspray Lemon enthält

- Die Wirkstoffe sind: Chlorhexidindigluconat 20 mg/10 ml - Lidocain Hydrochlorid Monohydrat 5 mg/10 ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Zitronenaroma – Sucralose – Glycerol (E422) – Propylenglykol (E1520) - Zitronensäure Monohydrat – Ethanol (E1510) - gereinigtes Wasser.

  Siehe Abschnitt 2, „Medica Halsspray Lemon enthält Ethanol (E1510) und Propylenglykol (E1520)“.

Wie Medica Halsspray Lemon aussieht und Inhalt der Packung

Medica Halsspray Lemon ist erhältlich in einer Flasche mit Sprühpumpe mit 30 ml Spray zur Anwendung in der Mundhöhle (Aufnahme über die Mundschleimhaut).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgien

Zulassungsnummer

BE179575

LU: 2011060039

Art der Abgabe

Freie Abgabe.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12/2025.