

**MEDICA SPRAY POUR LA GORGE LEMON, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml,
solution pour pulvérisation buccale
Gluconate de chlorhexidine - Chlorhydrate de lidocaïne**

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.



- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 à 4 jours.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que Medica spray pour la gorge lemon et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Medica spray pour la gorge lemon?
3. Comment utiliser Medica spray pour la gorge lemon?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Medica spray pour la gorge lemon?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MEDICA SPRAY POUR LA GORGE LEMON ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Medica spray pour la gorge lemon est un spray pour une action locale dans la bouche et la gorge. Il est un désinfectant et analgésique local.

Medica spray pour la gorge lemon est indiqué dans:

- Le traitement symptomatique du mal de gorge, de la gorge rouge, d'affections du pharynx accompagnées d'irritation.
- Un traitement complémentaire est nécessaire en cas d'infection bactérienne avec fièvre.
- Medica spray pour la gorge lemon ne contient pas de sucre et convient donc aussi aux diabétiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MEDICA SPRAY POUR LA GORGE LEMON?

N'utilisez jamais Medica spray pour la gorge lemon

- Si vous êtes allergique au gluconate de chlorhexidine ou au chlorhydrate de lidocaïne ou à l'un des autres composants contenus dans Medica spray pour la gorge lemon mentionnés dans la rubrique 6.

- Chez des enfants de moins de 2,5 ans (30 mois).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Medica spray pour la gorge lemon.

- Medica spray pour la gorge lemon ne peut pas être utilisé de façon prolongée, ininterrompue ou répétée. Limiter l'usage au strict nécessaire pour soulager la douleur et l'irritation.
- En cas de l'utilisation d'une trop forte dose (plus d'un flacon par jour) il y a un risque minime de diminution du contrôle du réflexe de déglutition.
- Medica spray pour la gorge lemon contient de l'alcool et du propylène glycol. Veuillez également lire la rubrique «Medica spray pour la gorge lemon contient de l'alcool et du propylène glycol».
- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Medica spray pour la gorge lemon».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants

N'utilisez pas ce médicament chez des enfants de moins de 2,5 ans.

Autres médicaments et Medica spray pour la gorge lemon

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avec récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

- Ne pas utiliser en même temps que des médicaments pour les formes légères d'Alzheimer (des inhibiteurs de cholinestérase).
- Ne pas utiliser en même temps que d'autres désinfectants.

Medica spray pour la gorge lemon avec des aliments, boissons et de l'alcool

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Medica spray pour la gorge lemon contient de l'alcool. Veuillez également lire la rubrique «Medica spray pour la gorge lemon contient de l'alcool et du propylène glycol».

Si les précautions susmentionnées sont respectées, Medica spray pour la gorge lemon peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Informez votre médecin de l'utilisation de ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Medica spray pour la gorge lemon contient de l'alcool et du propylène glycol

Medica spray pour la gorge lemon contient d'alcool (29,7 % de vol d'éthanol), c.-à-d. jusqu'à 108 mg par 5 pulvérisations, ce qui équivaut à 2,7 ml de bière ou de 1,1 ml de vin par 5 pulvérisations. Cette quantité est dangereux en cas d'utilisation chez les sujets alcooliques. Il

convient également d'en prendre compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Medica spray pour la gorge lemon contient 17 mg du propylène glycol par pulvérisation, ce qui peut provoquer des symptômes semblables à ceux provoqués par l'alcool.

3. COMMENT UTILISER MEDICA SPRAY POUR LA GORGE LEMON?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est:

Adultes et enfants à partir de 12 ans: 3 à 5 pulvérisations par fois, 6 à 10 fois par jour.

Enfants à partir de 2,5 ans (30 mois): 2 à 3 pulvérisations par fois, 3 à 5 fois par jour.

Orientez le pulvérisateur vers le fond de la gorge et appuyez sur le dessus du pulvérisateur.

Ce médicament ne peut pas être utilisé pendant une période prolongée. Consultez un médecin si vos symptômes s'aggravent ou s'il n'y a pas d'amélioration après 3 à 4 jours.

Il est conseillé de nettoyer quotidiennement le pulvérisateur, à titre préventif, selon la procédure suivante :

1. Tenez le spray à l'envers et appuyez sur l'embout de pulvérisation jusqu'à ce que plus aucun liquide ne sorte.
2. Retirez le pulvérisateur de la pompe de pulvérisation et mettez-le quelques minutes dans un bain d'eau chaude.
3. Sortez le pulvérisateur de l'eau et faites-le sécher.
4. Quand il est sec, remplacez le pulvérisateur sur la pompe de pulvérisation en le tournant vers le bas de manière à bloquer la pompe de pulvérisation.

Si vous avez utilisé plus de Medica spray pour la gorge lemon que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Medica spray pour la gorge lemon, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Ce médicament ne contient qu'une fraction de la dose toxique. En cas d'emploi correct, les risques de surdosage sont très minimes.

Les symptômes de surdosage sont: l'agitation, le bourdonnement d'oreilles, les difficultés respiratoires, la perturbation du rythme du cœur, la diminution du contrôle du réflexe de déglutition.

Si vous oubliez d'utiliser Medica spray pour la gorge lemon

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous arrêtez d'utiliser Medica spray pour la gorge lemon

Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, Medica spray pour la gorge lemon peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans le cadre d'un usage correct, ce médicament est généralement bien toléré.

- Très rares: des réactions allergiques de la peau et des muqueuses.
- En cas d'usage prolongé sans interruption, une coloration brunâtre des dents peut apparaître. Cette coloration s'enlève cependant facilement.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Division Vigilance :

EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be,

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

5. COMMENT CONSERVER MEDICA SPRAY POUR LA GORGE LEMON?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver à température ambiante (15-25°C).

N'utilisez pas Medica spray pour la gorge lemon après la date de péremption indiquée sur l'étiquette/la boîte après « EXP ». Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre derniers l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

Ce que contient Medica spray pour la gorge lemon

- Les substances actives sont gluconate de chlorhexidine 20 mg/10 ml - chlorhydrate de lidocaïne 5 mg/10 ml.
- Les autres composants sont arôme citron - sucralose - glycérol - propylène glycol - acide citrique monohydraté - éthanol - eau purifiée.

Aspect de Medica spray pour la gorge lemon et contenu de l'emballage extérieur

Medica spray pour la gorge lemon est disponible dans un flacon avec pompe contenant 30 ml de solution pour pulvérisation buccale (absorption par la muqueuse buccale).

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE179575

Mode de délivrance

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 06/2018.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2019.