

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

AUGVERZ 1 mg/ml + 3 mg/ml Augentropfen

Dextran 70/Hypromellose

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Apotheker.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist AUGVERZ und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von AUGVERZ beachten?
3. Wie ist AUGVERZ anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist AUGVERZ aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist AUGVERZ und wofür wird es angewendet?

AUGVERZ Augentropfen sind Benetzungsmittel (enthalten Dextran 70 und Hypromellose).

Sie werden bei Erwachsenen zur Behandlung folgender Erkrankungen angewendet:

- Augentrockenheit
- unzureichende Wirkung der Tränendrüsen
- Instabilität des Tränenfilms

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von AUGVERZ beachten?

AUGVERZ darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Dextran 70, Hypromellose oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie AUGVERZ nur als Tropfen für die **Augen**.
- Wenn Sie Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Veränderungen in Ihrem Gesichtsfeld, eine Augenreizung oder eine anhaltende Rötung feststellen oder wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 Tagen nicht verbessern, brechen Sie die Anwendung des Arzneimittels ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie weitere Arzneimittel anwenden, sollten Sie auch den Abschnitt „Anwendung von AUGVERZ zusammen mit anderen Arzneimitteln“ lesen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie AUGVERZ anwenden.

Anwendung von AUGVERZ zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wenn Sie noch andere Augenprodukte anwenden, müssen Sie zwischen den einzelnen Anwendungen mindestens 5 Minuten warten. Wenn Sie auch eine Augensalbe anwenden, sollten Sie diese zuletzt auftragen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Anwendung von AUGVERZ zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Einnahme von Nahrungsmitteln und Getränken hat keinen Einfluss auf Ihre Behandlung.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fertilität

Sie können AUGVERZ während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

Bei AUGVERZ sind keine Auswirkungen auf die Fertilität zu erwarten.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Wenn Sie nach der Anwendung von AUGVERZ eine Weile verschwommen sehen, dürfen Sie kein Fahrzeug führen und keine Maschine bedienen, bis Sie wieder scharf sehen.

3. Wie ist AUGVERZ anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Empfohlene Dosis:

- Geben Sie 1 oder 2 Tropfen in das erkrankte Auge (die erkrankten Augen), wenn nötig.
- Sie können die Augentropfen so oft wie nötig anwenden, wenn Ihnen Ihr Arzt nichts Anderes geraten hat.

Verwenden Sie AUGVERZ nur als Tropfen für die **Augen**.

Entfernen Sie, nachdem Sie den Verschluss des Fläschchens abgenommen haben, den ggf. losen Sicherheitsring, bevor Sie das Arzneimittel anwenden.

Um eine Verunreinigung des Tropfpipette und der Lösung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie die Augenlider, deren Umgebung oder andere Oberflächen nicht mit dem Tropfpipette berühren. Halten Sie die Flasche fest verschlossen, wenn Sie sie nicht benutzen.


Wenn Ihnen Ihr Arzt AUGVERZ verschrieben hat, wird er Ihnen auch sagen, wie lange Sie dieses Arzneimittel anwenden müssen. Brechen Sie die Behandlung nicht vorzeitig ab.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 Tagen nicht verbessern.

Anwendung:



1



2



3

1. **Waschen Sie Ihre Hände**, bevor Sie AUGVERZ anwenden.
2. Verwenden Sie für die bestmögliche Sicht einen Spiegel.
3. Drehen Sie den Verschluss des Fläschchens ab.
4. **Achten Sie darauf, dass der Tropfenzähler mit nichts anderem in Berührung kommt**, da sonst der Inhalt verunreinigt werden kann.
5. Halten Sie das Fläschchen verkehrt herum zwischen Daumen und Zeigefinger.
6. Legen Sie Ihren Kopf in den Nacken.
7. Ziehen Sie das untere Augenlid des erkrankten Auges mit einem Finger Ihrer anderen Hand nach unten (Abbildung 1).
8. Halten Sie den Tropfenzähler dicht an Ihr Auge ohne es zu berühren und drücken Sie mit dem Zeigefinger **vorsichtig** auf den Boden des Fläschchens (Abbildung 2), sodass Sie 1 oder 2 Tropfen zwischen Ihrem Augapfel und Ihr unteres Augenlid träufeln können.
9. **Schließen Sie Ihr Augenlid und drücken Sie 2 Minuten lang mit einem Finger auf Ihren Augwinkel neben der Nase** (Abbildung 3).
10. Wiederholen Sie wenn nötig die Schritte 5 bis 8 am anderen Auge. Schrauben Sie den Verschluss wieder auf das Fläschchen.

Falls kein Tropfen in Ihr Auge gelangt ist, versuchen Sie es noch einmal.

Wenn Sie eine größere Menge von AUGVERZ angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel AUGVERZ **in Ihr Auge** gegeben haben, können Sie das Auge mit lauwarmem Wasser ausspülen. Geben Sie keine Tropfen mehr nach, bis es Zeit ist für die nächste Dosis.

Wenn Sie zu viel AUGVERZ angewendet haben oder das Arzneimittel aus Versehen **verschluckt** haben, sollten Sie keine Nebenwirkungen erfahren. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich von Ihrem Arzt, Apotheker oder der für Sie zuständigen Giftinformationszentrale (**070/245.245**) beraten zu lassen.

Wenn Sie die Anwendung von AUGVERZ vergessen haben

Wenn Sie die Anwendung der Augentropfen vergessen haben, wenden Sie die nächste Dosis dann wie geplant an. Wenn es beinahe Zeit für die nächste Dosis ist, lassen Sie die vergessene Dosis aus und fahren Sie mit dem üblichen Dosierungsschema fort. Wenden Sie **nicht** die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von AUGVERZ abbrechen

Wenn Sie die Behandlung abbrechen, können die Symptome der Augentrockenheit zurückkehren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Nebenwirkungen sind entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens angeordnet: „**Sehr häufig**“: mehr als 1 Behandler von 10, „**Häufig**“: 1 bis 10 Behandler von 100, „**Gelegentlich**“: 1 bis 10

Behandelte von 1.000, „**Selten**“: 1 bis 10 Behandelte von 10.000, „**Sehr selten**“: weniger als 1 Behandler von 10.000 „**nicht bekannt**“: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

- **Augen:**
 - **Sehr häufig:** Verschwommenes Sehen.
 - **Häufig:** Augentrockenheit – Augenbeschwerden – ungewöhnliches Gefühl im Auge – Fremdkörpergefühl im Auge – Beschwerden an den Augenlidern.
 - **Gelegentlich:** Lichtempfindlichkeit – verringertes Gefühl im Auge – juckendes Auge – Augenreizung – Rötung des Auges.
 - **Häufigkeit nicht bekannt:** Schwellung der Augen – Augenschmerzen – Augenausfluss – Rötung der Augenlider – schuppige Augenlider – gesteigerte Tränenproduktion.
- **Reaktionen in anderen Körperteilen:**
 - **Gelegentlich:** Kopfschmerzen – Unwohlsein.
 - **nicht bekannt:** Allergie (Überempfindlichkeit).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
Galileelaan 5/03
B-1210 Brüssel
Website: www.notifierunefetindesirable.be
E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg :

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB)
CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois
Rue du Morvan
54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX
Tel: (+33) 3 83 65 60 85 / 87
E-mail: crpv@chru-nancy.fr
oder
Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tel.: (+352) 2478 5592
E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link für das Formular:

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist AUGVERZ aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25 °C lagern.

Wenden Sie AUGVERZ nicht länger als 4 Wochen nach dem ersten Öffnen an.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was AUGVERZ enthält

- Die Wirkstoffe sind: Dextran 70 (1 mg/ml) und Hypromellose (3 mg/ml).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Borax, Polyquaternium-1, konzentrierte Salzsäure und/oder Natriumhydroxid (zum Einstellen des pH-Werts) und gereinigtes Wasser.

Wie AUGVERZ aussieht und Inhalt der Packung

AUGVERZ Augentropfen werden in einem Kunststoffbehälter mit einer 5-ml-, 10-ml- oder 15-ml-Tropfpipette (DROPTAINER®) und Schraubverschluss geliefert.

Nicht alle genannten Verpackungsgrößen werden in den Handel gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer and Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Alcon NV
Stationsstraat 55
B-2800 Mechelen

Hersteller

SA ALCON-COUVREUR NV	oder	SIEGFRIED EL MASNOU, S.A.
Rijksweg 14		Camil Fabra 58
B-2870 Puurs		08320 El Masnou, Barcelona
		Spanien

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
B-2870 Puurs-Sint-Amands

Zulassungsnummer: BE185674

Abgabeweise: Frei erhältliches Arzneimittel.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 03/2022.