

## GEBRAUCHSINFORMATION

### 1. Bezeichnung des Tierarzneimittels

Eurican Puppy Injektionssuspension für Hunde

### 2. Zusammensetzung

Pro Dosis von 1 ml:

#### Wirkstoff:

Hundeparvovirus attenuiert, Stamm CPV 115-780916 – Cornell University

min.  $10^{5,5}$  TCID<sub>50</sub> auf Katzennierenzellen titriert

#### Sonstige Bestandteile:

Polypeptide und Kohlenhydrate

Gepufferte Kochsalzlösung

qsp 1 ml

### 3. Zieltierart(en)

Hunde.

### 4. Anwendungsgebiet(e)

Aktive Immunisierung von Hunden, ab einem Lebensalter von 4 Wochen, die Antikörper mütterlichen Ursprungs besitzen, zur Vorbeugung von Sterblichkeit und von klinischen Zeichen, und um die virale Ausscheidung, verursacht durch Hundenparvirose, zu vermindern.

### 5. Gegenanzeigen

Keine.

### 6. Besondere Warnhinweise

#### Besondere Warnhinweise:

Nur Tiere in gutem Gesundheitszustand impfen.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Bei versehentlicher Selbstinjektion ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

#### Trächtigkeit und Laktation:

Nicht anwenden während der Trächtigkeit und Laktation.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Es liegen keine Informationen zur Unschädlichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung eines anderen Tierarzneimittels vor, mit Ausnahme eines Impfstoffes gegen Leptospirose desselben Zulassungsinhaber. Diese Kombination kann ab einem Alter von 7 Wochen verabreicht werden. Deshalb wird empfohlen, innerhalb von 14 Tagen vor oder nach der Impfung mit diesem Impfstoff, keine anderen Impfstoffe zu verwenden.

#### Überdosierung:

Keine anderen post-vakzinalen Reaktionen als die, die nach der Verabreichung einer Monodosis beobachtet wurden.

### 7. Nebenwirkungen

Hunde:

**Sehr häufig (> 1 Tier / 10 behandelte Tiere):**

Überempfindlichkeitsreaktionen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Eine entsprechende symptomatische Behandlung erfordern.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können Nebenwirkungen auch an den Zulassungsinhaber oder den örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über Ihr nationales Meldesystem {Details zum nationalen System} melden.

**8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung**

Vor Gebrauch schütteln.

Injektion einer Dosis von 1 ml subkutan nach folgendem Impfplan:

Erstimpfung

- Erste Injektion ab einem Alter von 4 Wochen.
- Zweite Injektion zwei bis vier Wochen nach der ersten Injektion.
- Um einen Langzeitimpfschutz zu gewährleisten, muss ein konventionelles Impfschema mit einem Impfstoff der eine Parvovirusvalenz enthält ab einem Alter von 12 Wochen angewendet werden.

Auffrischung

- Erste Auffrischung: 1 Jahr nach der Erstimpfung mit einem Impfstoff der eine Parvovirusvalenz enthält.

**9. Hinweise für die richtige Anwendung**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen der Asepsis beachten.

Nur sterile und vollständig Antiseptika- und Desinfektionsmittel-freie Gerätschaften verwenden.

**10. Wartezeiten**

Nicht zutreffend.

**11. Besondere Lagerungshinweise**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Kühl lagern und transportieren (2 °C – 8 °C). Vor Licht schützen.

Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nach „Exp.“ nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**12. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Nutzen Sie Rücknahmesysteme für die Entsorgung nicht verwendeter Tierarzneimittel oder daraus entstandener Abfälle nach den örtlichen Vorschriften und die für das betreffende Tierarzneimittel geltenden nationalen Sammelsysteme. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

**13. Einstufung von Tierarzneimitteln**

Tierarzneimittel, das der Verschreibungspflicht unterliegt.

**14. Zulassungsnummern und Packungsgrößen**

BE-V165356

Packungsgröße:

Schachtel mit 10 Fläschchen von 1 Dosis

**15. Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage**

November 2024

Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel sind in der Produktdatenbank der Europäischen Union verfügbar (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Kontaktangaben**

Zulassungsinhaber und Kontaktangaben zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23  
1050 Brüssel  
Belgien

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
Laboratoire Porte des Alpes  
99, rue de l'Aviation  
69800 Saint-Priest  
Frankreich