

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

Nasasinuspray Anti-allergie 0,5 mg/ml neusspray, suspensie  
*levocabastine*

### **Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Nasasinuspray Anti-allergie en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is Nasasinuspray Anti-allergie en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Nasasinuspray Anti-allergie neusspray is een middel tegen allergische neusklachten.

Nasasinuspray Anti-allergie neusspray is aangewezen bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 3 jaar voor een snelle en langdurige verlichting van de symptomen van allergie (overgevoeligheid) en hooikoorts, zoals niezen, lopende en jeukende neus. Die kunnen zowel in bepaalde seizoenen als het hele jaar door optreden.

### **2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Nasasinuspray Anti-allergie neusspray is niet aangewezen voor de behandeling van een verkoudheid.
- Als u een nieraandoening heeft, dient u het chronisch gebruik van Nasasinuspray Anti-allergie neusspray te vermijden, omdat het geneesmiddel vooral via de nieren wordt uitgescheiden.
- Ook patiënten met een leverziekte of oudere patiënten moeten voorzichtig zijn met chronisch gebruik van Nasasinuspray Anti-allergie neusspray.

#### **Kinderen tot 3 jaar**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Nasasinuspray Anti-allergie neusspray bij kinderen jonger dan 3 jaar.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruik samen met Nasasinaspray Anti-allergie geen andere geneesmiddelen in de neus zonder eerst uw arts of apotheker te raadplegen.

Gebruikt u naast Nasasinaspray Anti-allergie nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Geen bijzonderheden.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Over de invloed van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap bij de mens zijn nog geen gegevens bekend. Uw arts of apotheker zal uitmaken of u de neusspray mag gebruiken tijdens uw zwangerschap.

U mag Nasasinaspray Anti-allergie neusspray niet gebruiken tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

Over de invloed van Nasasinaspray Anti-allergie neusspray op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen zijn geen gegevens bekend. Raadpleeg dus steeds uw arts als u Nasasinaspray Anti-allergie neusspray wil gebruiken in de periode dat u zwanger wil worden.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Nasasinaspray Anti-allergie neusspray heeft gewoonlijk geen invloed op de waakzaamheid, het concentratievermogen en de rijvaardigheid. Mocht u zich toch suf voelen, dan moet u voorzichtig zijn bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

### **Nasasinaspray Anti-allergie bevat benzalkoniumchloride en propyleenglycol.**

Dit middel bevat 0.01475 mg benzalkoniumchloride per verstuiving, overeenkomend met 0.01475 mg/0.1 ml. Benzalkoniumchloride kan irritatie of zwelling in de neus veroorzaken, vooral bij langdurig gebruik.

Dit middel bevat 5 mg propyleenglycol per verstuiving, overeenkomend met 5 mg/0.1 ml.


## **3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Door enkele keren op het pompje te drukken, komt het verstuivingsmechanisme op gang.

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Schud het flesje goed vóór u de dop verwijdert.
2. Als u het flesje voor de eerste keer gebruikt, verwijder dan de dop en duw 1 à 2 maal tot een fijne spray tevoorschijn komt.
3. Zuiver de neus goed.
4. Houd het flesje zoals op de afbeelding. Buig uw hoofd lichtjes voorwaarts. Houd 1 neusopening stevig dicht en breng het tuitje in de andere neusopening.
5. Verstuif tweemaal, terwijl u door dezelfde neusopening inademt.
6. Herhaal punt 4 en 5 voor de andere neusopening.



De aanbevolen dosering is:

*Kinderen van 3 tot 12 jaar:*

1 verstuiwing Nasasinaspray Anti-allergie neusspray per neusgat, 2 maal per dag.

*Volwassenen:*

2 verstuiwingen Nasasinaspray Anti-allergie neusspray per neusgat, 2 maal per dag.

Als de klachten ernstig zijn, kunt u 3 tot 4 maal per dag de nodige verstuiwingen toedienen. Volg nauwgezet het advies van uw arts.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Als u in de neus te veel Nasasinaspray Anti-allergie neusspray aanbrengt, treden geen vergiftigingsverschijnselen op.

Als u de inhoud van het flesje per ongeluk in de mond krijgt en inslikt, zou u zich slaperig kunnen voelen. In dat geval moet u veel niet-alcoholische dranken drinken, zodat het geneesmiddel sneller wordt uitgescheiden door de nieren.

Wanneer u te veel van Nasasinaspray Anti-allergie heeft gebruikt of het product hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

#### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

#### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Geen bijzonderheden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

De volgende neveneffecten kunnen bij gebruik van Nasasinaspray Anti-allergie neusspray ernstig worden: zwellen van de oogleden, een ernstige overgevoelighedsreactie die snel na de toediening kan optreden en te herkennen is aan netelroos, jeuk, warmteopwellingen, flauwvallen, moeizame ademhaling en nog andere mogelijke symptomen (anafylaxie), overgevoeligheid, vernauwing van de luchtwegen, moeilijk ademen en zwelling van de neus.

Als u één van deze bijwerkingen ervaart, is het aangeraden de behandeling te stoppen en uw arts of apotheker te raadplegen.

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 van de 10 gebruikers) zijn:

- hoofdpijn

Bijwerkingen die vaak voorkomen (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers) zijn:

- sinusitis ;
- duizeligheid ;
- slaperigheid ;
- keelpijn ;
- neusbloeding ;
- hoest ;
- misselijkheid ;
- vermoeidheid ;
- pijn.

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers) zijn:

- vervelend gevoel in de neus of een verstopte neus
- een onbehaaglijk gevoel, irritatie of pijn en droogte op de plaats van de toediening
- hartkloppingen

Bijwerkingen die zelden voorkomen (bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers) zijn:

- abnormale snelle hartslag
- een branderig gevoel en ongemak op de plaats van de toediening

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Afdeling Vigilantie:

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u dit middel?**

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is levocabastinehydrochloride. Elke ml bevat 0,5 mg levocabastine. 1 ml neusspray komt overeen met 10 verstuivingen, die elk 0,05 mg levocabastine bevatten.
- De andere stoffen in dit middel zijn: 0.295mg/ml benzalkoniumchloride 50%-ige oplossing als bewaarmiddel, propyleenglycol, polysorbaat 80, dinatrium monowaterstoffosfaat watervrij,

natrium diwaterstoffosfaat monohydraat, dinatriumedetaat, hypromellose 2910 5mPa.s, gezuiverd water. Zie ook rubriek 2: 'Nasasinspray Anti-allergie bevat benzalkoniumchloride en propyleenglycol'.

**Hoe ziet Nasasinspray Anti-allergie eruit en wat zit er in een verpakking?**

Flesje met spraypomp met 10 ml neusspray, suspensie, dat 86 verstuivingen bevat.

**Afleveringswijze**

Vrije aflevering.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Kenvue Belgium NV

Michel De Braeystraat 52

2000 Antwerpen

Fabrikant

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

of

Kenvue Belgium NV

Michel De Braeystraat 52

2000 Antwerpen

België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

BE154567

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2025.**

*v16.0\_b15.0*