

**SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B. V MEDICA VOLWASSENEN, 2,73 g, zetpillen**

**SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B. V MEDICA KINDEREN, 1,2 g, zetpillen**

**SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B. V MEDICA BABY'S, 0,82 g, zetpillen**

**Glycerol**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Waarvoor wordt Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica gebruikt?
2. Wanneer mag u Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

## **1. WAARVOOR WORDT SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B. V MEDICA GEBRUIKT?**

Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica is een geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van voorbijgaande verstopping van de darmen.

## **2. WANNEER MAG U SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B. V MEDICA NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

**Wanneer mag u Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Bij buikpijn waarvan de oorzaak ongekend is.
- Bij belemmering van de darmwerking (darmtransit).
- Bij symptomen van uitdroging.

- Bij misselijkheid en braken, ontsteking van de dikke darm (rectocolitis) en scheurtjes in de anus (anale fissuren).

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

- Langdurig gebruik is af te raden om gewenning te vermijden.
- Indien u bejaard bent.
- De bloedsuikerspiegel (glucosespiegel) van mensen met suikerziekte (diabetes) moet opgevolgd worden bij gebruik van dit geneesmiddel.
- Indien u last hebt van chronische verstopping. Het is dan aangewezen uw levensgewoonten te wijzigen en over te gaan naar een meer vezelrijke voeding.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Kinderen**

Gebruik enkel het overeenkomstig formaat van zetpil.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Door een snellere darmwerking (darmtransit) kan de opname van andere geneesmiddelen beïnvloed worden.

**Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Niet van toepassing.

**Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

*Zwangerschap*

Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica kan zonder problemen gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

*Borstvoeding*

Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica kan zonder problemen gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing

**Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica bevat geen hulpstoffen met gekend effect.**

**3. HOE GEBRUIKT U SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B. V MEDICA?**

Gebruik Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

*Volwassenen, kinderen en baby's:* telkens het overeenkomstig formaat van zetpillen gebruiken.

De zetpil in de endeldarm brengen; de zetpil smelt niet, maar lost op.

Het effect treedt binnen de 30 minuten op.

Gewoonlijk volstaan 1 à 2 zetpillen per dag.

Dit geneesmiddel gedurende een zo kort mogelijke periode gebruiken. Men moet proberen door middel van aanpassing van de voedingswijze en verandering van levensgewoonten, de chronische verstopping te overwinnen.

**Heeft u te veel van Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica gebruikt?**

Bij goed gebruik is de kans op een overdosering zeer klein, doordat er snel darmlediging optreedt. Door vergissing of onvoorzichtigheid kunnen de zetpillen echter via de mond ingenomen worden. Wanneer u te veel van Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

*Mogelijke symptomen* na orale inname van een zeer hoge dosis zijn: hoofdpijn, misselijkheid, diarree, dorst, duizeligheid en verwardheid.

*Behandeling:* behandeling van de symptomen.

**Bent u vergeten Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica te gebruiken?**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

**Als u stopt met het gebruik van Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica**

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.**

Zoals elk geneesmiddel kan ook Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In zeldzame gevallen kan een irriterend of brandend gevoel optreden ter hoogte van de endeldarm.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**5. HOE BEWAART U SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B. V MEDICA?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Die is te vinden op het etiket na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

**6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.**

**Welke stoffen zitten er in Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica?**

- De werkzame stof in Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica is glycerol 65 g.
- De andere stoffen in Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica zijn gelatine - gezuiverd water tot 100 g.

**Hoe ziet Suppositoria cum glycerolo et gelatina P.B. V Medica eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Zetpillen van 4,2 g voor volwassenen. Doosje met 10 zetpillen en doos met 100 zetpillen.

Zetpillen van 1,85 g voor kinderen. Doosje met 10 zetpillen.

Zetpillen van 1,26 g voor baby's. Doosje met 10 zetpillen.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. – Rijksweg 9 – 2880 Bornem – België

**Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:**

SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B.V MEDICA *baby's*: BE206507

SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B.V MEDICA *kinderen*: BE206516

SUPPOSITORIA CUM GLYCEROLO ET GELATINA P.B.V MEDICA *volwassenen*: BE206525

**Afleveringswijze**

Vrije aflevering.

**Deze bijsluiters is voor het laatst herzien in 10/2011.**

**Deze bijsluiters is voor het laatst goedgekeurd in 06/2012.**