

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

TIMOLOL FALCON 0,25%, Oogdruppels, oplossing TIMOLOL FALCON 0,5%, Oogdruppels, oplossing

Timolol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is TIMOLOL FALCON en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is TIMOLOL FALCON en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

TIMOLOL FALCON zijn oogdruppels tegen verhoogde oogdruk. Het bevat timolol, een zogenaamde bètablokker.

Het wordt gebruikt voor de behandeling van

- openhoekglaucoom, afakisch glaucoom of secundair glaucoom (oogziekten veroorzaakt door een verhoogde druk in het oog)
- verhoogde druk in het oog.

Het kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen verhoogde oogdruk gebruikt worden.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor bètablokkers.
- U lijdt aan ademhalingsproblemen zoals astma of ernstige chronische obstructieve bronchitis (een ernstige longaandoening die kan leiden tot een piepende of moeizame ademhaling en/of langdurig hoesten) of heeft hier in het verleden aan geleden.
- U lijdt aan een vertraagde hartslag, hartfalen of een hartritmestoornis (onregelmatige hartslag).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Gebruik TIMOLOL FALCON enkel om in uw **ogen** te druppelen.

- **Voor u TIMOLOL FALCON gebruikt, moet u uw arts inlichten als u nu of in het verleden volgende aandoeningen hebt vertoond:**
 - hartproblemen, zoals coronair hartlijden (de symptomen kunnen bestaan uit pijn of een beklemmend gevoel op de borst, kortademigheid of verstikking), hartfalen, lage bloeddruk.
 - hartritmestoornissen zoals trage hartslag.
 - een slechte bloeddoorstroming in de hersenen.
 - ademhalingsproblemen, astma of chronisch obstructief longlijden.
 - aandoening met een slechte bloedcirculatie (zoals de ziekte van Raynaud of het syndroom van Raynaud).
 - diabetes (suikerziekte), omdat timolol de tekenen en symptomen van een laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) kan maskeren, zoals beven en toegenomen hartslag. Controleer uw suikerspiegel daarom zorgvuldig.
 - te sterke werking van de schildklier omdat timolol de tekenen en symptomen ervan kan maskeren.
 - een bepaalde spierziekte, zoals myasthenia gravis (een bepaalde vorm van spierzwakte).
 - Als u een ernstige allergische reactie krijgt (huiduitslag, roodheid en jeuk van het oog) terwijl u TIMOLOL FALCON gebruikt, ongeacht de oorzaak ervan, is het mogelijk dat behandeling met adrenaline niet zo doeltreffend is. Wanneer u dus een andere behandeling krijgt, vertel dan de arts dat u TIMOLOL FALCON gebruikt.
 - Als u aandoeningen aan het hoornvlies heeft, neem dan contact op met uw arts, omdat TIMOLOL FALCON droge ogen kan veroorzaken.
- Als u verdoofd wordt voor een operatie, moet u uw arts vooraf vertellen dat u TIMOLOL FALCON gebruikt omdat timolol de effecten kan veranderen van sommige geneesmiddelen die tijdens anesthesie worden gebruikt.
- Als u een allergische reactie op dit geneesmiddel vermoedt (zoals huiduitslag, rode of jeukende ogen), stop dan onmiddellijk de behandeling en raadpleeg uw arts.
- **Als u contactlenzen draagt:**
 - Draag geen zachte contactlenzen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
 - Als u toch contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u TIMOLOL FALCON gebruikt en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.
- **Kinderen:**
 - Over het algemeen is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van TIMOLOL FALCON bij jonge patiënten. Bij pasgeborenen, zuigelingen en jongere kinderen is uiterste voorzichtigheid geboden bij gebruik van TIMOLOL FALCON. Bij optreden van hoesten, piepende ademhaling, abnormale ademhaling of abnormale adempauzes (apneu), moet het gebruik van het geneesmiddel onmiddellijk worden stopgezet. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Een draagbare apneumonitor kan ook nuttig zijn.
 - Timolol oogdruppels, oplossing werd onderzocht bij zuigelingen en kinderen van 12 dagen tot 5 jaar met een verhoogde druk in het oog (de ogen) of bij wie glaucoom werd vastgesteld. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ten minste 5 minuten wachten tussen elke toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.

TIMOLOL FALCON kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen die u gebruikt, waaronder andere oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Licht uw arts in als u geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen, als u geneesmiddelen gebruikt voor uw hart met inbegrip van kinidine (wordt gebruikt voor de behandeling van hartaandoeningen en sommige soorten van malaria), als u geneesmiddelen gebruikt om suikerziekte te behandelen of antidepressiva die fluoxetine en paroxetine worden genoemd of als de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst dergelijke geneesmiddelen gaat gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- andere geneesmiddelen voor glaucoom
- geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (zoals bètablokkers, reserpine, calciumblokkers)
- digitalis (geneesmiddel voor het hart)
- geneesmiddelen voor suikerziekte (diabetes)
- kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartziekten en bepaalde types van malaria)
- antidepressiva bekend als fluoxetine en paroxetine

Gebruikt u naast TIMOLOL FALCON nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Gebruik TIMOLOL FALCON niet als u zwanger bent, tenzij uw arts het noodzakelijk vindt.

Gebruik TIMOLOL FALCON niet als u borstvoeding geeft. Timolol kan overgaan in de moedermelk. Vraag advies aan uw arts voor u een geneesmiddel gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u na het gebruik van TIMOLOL FALCON een tijdje wazig ziet of andere visuele stoornissen ervaart, tijdelijk last heeft van duizeligheid, hallucinaties of vermoeidheid, rijd dan niet en gebruik geen machines totdat dergelijke symptomen zijn verdwenen.

TIMOLOL FALCON bevat benzalkoniumchloride

Dit middel bevat 0,1 mg benzalkoniumchloride in elke ml. Benzalkoniumchloride kan worden opgenomen door zachte contactlenzen en kan de kleur van de contactlenzen veranderen. U moet uw contactlenzen uit doen voordat u dit middel gebruikt en deze pas 15 minuten daarna weer indoen. Benzalkoniumchloride kan ook oogirritatie veroorzaken, vooral als u droge ogen heeft of een aandoening van het hoornvlies (de doorzichtige voorste laag van het oog). Als u last krijgt van een abnormaal gevoel, steken of pijn in het oog na gebruik van dit middel, neem dan contact op met uw arts.

TIMOLOL FALCON bevat fosfaten

TIMOLOL FALCON 0,25% en TIMOLOL FALCON 0,5% bevatten respectievelijk 12,7 mg en 11,8 mg fosfaten per ml.

Als u een ernstige beschadiging heeft aan de doorzichtige voorste laag van het oog (het hoornvlies), kunnen fosfaten in zeer zeldzame gevallen troebele vlekken op het hoornvlies veroorzaken door ophoping van calcium tijdens de behandeling.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik TIMOLOL FALCON uitsluitend om in uw oog (ogen) te druppelen.


Verwijder, nadat u de dop van het flesje heeft afgehaald, de beveiligingsring indien deze los zit, voordat u het geneesmiddel gebruikt.

De aanbevolen dosering is:

- 1 druppel in het aangedane oog, 2 maal per dag.

- In sommige gevallen zal uw arts de dosis aanpassen of moet u TIMOLOL FALCON gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen.
- Als u dit geneesmiddel meer of vaker gebruikt dan voorgeschreven door uw arts, kan er ook meer door het lichaam worden opgenomen. Hierdoor stijgt de kans op bijwerkingen.
- Kinderen:
 - Vóór gebruik van TIMOLOL FALCON moet een gedetailleerd medisch onderzoek worden uitgevoerd. Uw arts zal zorgvuldig de risico's en de voordelen evalueren als hij/zij een behandeling met TIMOLOL FALCON overweegt. Als de voordelen opwegen tegen de risico's, wordt aanbevolen eenmaal per dag de laagst beschikbare concentratie van de werkzame stof te gebruiken. Wat het gebruik bij kinderen betreft, kan een concentratie van 0,1% werkzame stof volstaan om de druk in het oog te controleren. Als de druk met die dosering niet voldoende onder controle gebracht wordt, kan een toediening tweemaal per dag met een interval van 12 uur noodzakelijk zijn. Patiënten, vooral pasgeborenen, moeten nauwgezet worden geobserveerd gedurende één tot twee uur na de eerste dosis en er moet een zorgvuldige monitoring op bijwerkingen worden uitgevoerd totdat er een operatie wordt uitgevoerd.
 - Per keer mag slechts één druppel TIMOLOL FALCON worden ingedruppeld.

Wijze van gebruik:



1. **Was uw handen** voordat u TIMOLOL FALCON gebruikt.
2. Ga voor een spiegel zitten zodat u ziet wat u doet.
3. Draai de dop van het flesje.
4. **Zorg ervoor dat de druppelteller niets anders aanraakt**, anders kan de inhoud ervan verontreinigd geraken.
5. Houd het flesje ondersteboven vast in één hand tussen uw duim en middelvinger.
6. Houd uw hoofd achterover.
7. Trek het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden met een vinger van uw andere hand (Afbeelding 1).
8. Breng de druppelteller dicht tegen uw oog zonder dit aan te raken en druk **zachtjes** op de onderkant van het flesje met uw wijsvinger (Afbeelding 2) zodat 1 druppel in de ruimte tussen uw oog en het onderste ooglid valt.
9. **Na gebruik van TIMOLOL FALCON, sluit uw oog en druk met een vinger in uw ooghoek tegen uw neus gedurende 2 minuten** (Afbeelding 3). Dat helpt om ervoor te zorgen dat timolol niet in de rest van het lichaam terechtkomt.
10. Herhaal indien nodig stap 5 tot en met 9 voor uw andere oog. Schroef de dop weer stevig op het flesje.

Als u andere oogdruppels of oogzalven gebruikt, laat dan minstens 5 minuten tussen twee geneesmiddelen. Oogzalven moeten als laatste worden toegediend.

Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.

Duur van de behandeling:

Uw arts zal u vertellen hoelang u TIMOLOL FALCON moet gebruiken. **Stop de behandeling niet** zonder eerst uw arts te raadplegen.

Kinderen: voor een tijdelijke behandeling bij kinderen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

- Als u meer TIMOLOL FALCON **in uw oog** heeft ingedruppeld dan nodig, spoel het er dan uit met warm water. Doe niet meer druppels in tot het tijd is voor uw volgende gebruikelijke dosis.
- Wanneer u teveel van TIMOLOL FALCON heeft gebruikt of het per ongeluk heeft **ingeslikt**, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (**070/245.245**).
- Mogelijke symptomen van overdosering: een ijl gevoel in het hoofd, vertraagde hartslag, te lage bloeddruk, hartfalen, ademhalingsproblemen, bronchospasme, braken, bewustzijnsstoornissen, algemene convulsies. Indien dit het geval is, raadpleeg uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Ga door met de volgende dosis, zoals gepland. **Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.** Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en schakel opnieuw over op het gewone doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop de behandeling niet zonder eerst uw arts te raadplegen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Gewoonlijk kunt u de druppels blijven gebruiken tenzij de effecten ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, moet u met een arts of apotheker spreken. Zet het gebruik van TIMOLOL FALCON niet stop zonder er met uw arts over te spreken.

De bijwerkingen werden gegroepeerd volgens de frequentie waarmee ze voorkomen: “**vaak**”: bij 1 tot 10 op 100 patiënten, “**soms**”: bij 1 tot 10 op 1000 patiënten, “**zelden**”: bij 1 tot 10 op 10000 patiënten en “**niet bekend**”: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Oogaandoeningen:

- **Vaak:** wazig zien – oogpijn – oogirritatie (bv. brandend, stekend, jeukend gevoel, tranen, roodheid) – roodheid van het oog – ongemak in het oog.
- **Soms:** erosie van het hoornvlies (beschadiging van de voorste oppervlakkige laag van de oogbal) – ontsteking van het oogoppervlak met of zonder beschadiging van het oppervlak – ontsteking van de iris (iritis) – ontsteking van het bindvlies (conjunctivitis) – ontsteking van het ooglid (blefaritis) – verminderd gezichtsvermogen – overgevoeligheid voor licht (fotofobie) – droog oog – verhoogde traanproductie – oogafscheiding – jeukend oog – korstvorming op het ooglid – aandoeningen van de voorste oogkamer (ontsteking) – zwelling van het ooglid – roodheid van het bindvlies – oogontsteking.
- **Zelden:** uveïtis (ontsteking van de uvea, een deel van het oog) – aandoening van het hoornvlies – dubbel zien (diplopie) – vermoeide ogen (asthenopie) – roodheid van het ooglid – aandoening van het ooglid – jeukend ooglid – zwelling van het bindvlies – pigmentatie van het hoornvlies – groei van de wimpers – eczeem van de oogleden – opgezwollen oog – kleurwijziging van het hoornvlies.
- **Bijkomende bijwerkingen op basis van post-marketing ervaring die gemeld zijn en waarvan de frequentie niet bekend is:**
afhankelijk van de ooglid waardoor het oog halfdicht blijft – verstoord zicht – loslating van de laag onder het netvlies, die bloedvaten bevat, na filtratiechirurgie, waardoor een verstoord gezichtsvermogen kan ontstaan.

Algemene bijwerkingen:

- **Soms:** bronchitis – astma - hoofdpijn – slechte smaak – trage hartslag (bradycardie) – vermoeidheid – kortademigheid – verlaagde bloeddruk.
- **Zelden:** infectie van de bovenste luchtwegen – depressie – onvoldoende doorbloeding van de hersenen (hersenischemie) – duizeligheid – migraine – hartinfarct – toegenomen bloeddruk - koude handen en voeten – chronisch obstructief longlijden (COPD) – vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme) (overwegend bij patiënten met een vooraf bestaande bronchospastische aandoening) – hoest – moeilijke ademhaling – piepende ademhaling – verstopte neus – dyspepsie (indigestie) – maagklachten – ongemak in de buik – droge mond – zwelling van het aangezicht – roodheid van de huid (erytheem) – toegenomen zweten – zwakte (asthenie) – ongemak in de borstkas – zwelling van weefsels (perifeer oedeem) – hartaanval.
- **Bijkomende bijwerkingen op basis van post-marketing ervaring die gemeld zijn en waarvan de frequentie niet bekend is:**
dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties) – toename van tekenen en symptomen van myasthenia gravis (spieraandoening) – tintelingen in handen en voeten (paresthesie) – flauwvallen (syncope) – onregelmatige hartslag (aritmie) – pijn in de borststreek (veroorzaakt door atrioventriculair blok, hartfalen, hartstilstand) – hartkloppingen – cerebrovasculair accident – falen van de ademhaling – misselijkheid – diarree – haaruitval (alopecia) – overgevoeligheid – huiduitslag – jeukende uitslag of netelroos (urticaria) – psoriasis – lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) inclusief verbergen van bepaalde tekens van een laag suikergehalte in het bloed – systemische lupus erythematosus (aandoening van het afweersysteem) – slaapproblemen (slapeloosheid) – geheugenverlies – nachtmerries – fenomeen van Raynaud – gewrichtsaandoening (of beschadiging van het gewricht) – seksuele disfunctie (zoals impotentie) – zwelling onder de huid die kan ontstaan in gebieden zoals het gezicht en de ledematen, en die de luchtwegen kan blokkeren, waardoor slik of ademhalingsproblemen kunnen worden veroorzaakt – verergering van congestief hartfalen (hartaandoening met kortademigheid en zwelling van de voeten en benen als gevolg van ophoping van vocht) – braken – beroerte – ongewone gewaarwordingen zoals spelden en naaldprikken – een soort hartritmestoornis – hartaanval – veranderingen in het ritme of de snelheid van de hartslag.

Zoals andere topisch in de ogen aangebrachte geneesmiddelen wordt timolol in het bloed geabsorbeerd. Dit kan soortgelijke bijwerkingen veroorzaken als intraveneuze en/of orale bètablokkers. De incidentie van bijwerkingen na topische toediening in de ogen is lager dan wanneer geneesmiddelen bijvoorbeeld via de mond worden ingenomen of worden geïnjecteerd. De opgesomde bijwerkingen omvatten reacties die worden gezien met de klasse van bètablokkers wanneer ze worden gebruikt voor de behandeling van oogaandoeningen:

Oogaandoeningen: verminderde gevoeligheid van het hoornvlies.

Reacties in andere delen van uw lichaam: systemische allergische reacties waaronder plaatselijke en veralgemeende uitslag – jeuk (pruritus) – ernstige plotselinge levensbedreigende allergische reactie (anafylactische reactie) – huiduitslag met wit, zilverachtig gekleurd uiterlijk (psoriasisachtige uitslag) of verergering van psoriasis – verminderd libido – spierpijn die niet door inspanning wordt veroorzaakt (myalgie).

In zeer zeldzame gevallen hebben enkele patiënten met zware schade ter hoogte van de transparante laag voor het oog (het hoornvlies) troebele vlekken ontwikkeld op het hoornvlies ten gevolge van de opeenstapeling van calcium tijdens de behandeling.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, Galileelaan 5/03, 1210 Brussel, Website: www.eenbijwerkingmelden.be, e-mail: adr@fagg.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

TIMOLOL FALCON 0,25%

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) en beschermen tegen licht.

TIMOLOL FALCON 0,5%

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik TIMOLOL FALCON niet langer dan 4 weken na eerste opening.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en het doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

TIMOLOL FALCON 0,25%

- De werkzame stof in dit middel is timolol 2,5 mg/ml (als maleaat).
- De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffsfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en gezuiverd water.

TIMOLOL FALCON 0,5%

- De werkzame stof in dit middel is timolol 5 mg/ml (als maleaat).
- De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffsfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumhydroxide en gezuiverd water.

Hoe ziet TIMOLOL FALCON eruit en wat zit er in een verpakking?

TIMOLOL FALCON 0,25% oogdruppels is een kleurloze tot lichtgele oplossing, geleverd in een plastic container met druppelpipet van 5 en 10 ml met een schroefdop. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

TIMOLOL FALCON 0,5% oogdruppels is een kleurloze tot lichtgele oplossing, geleverd in een plastic container met druppelpipet van 5 ml met een schroefdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Pharma NV
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde

Fabrikant

TIMOLOL FALCON 0,25%
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs

TIMOLOL FALCON 0,5%
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
B-2870 Puurs

Siegfried El Masnou, S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Spanje

Novartis Farmacéutica, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
Spanje

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Duitsland

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:

TIMOLOL FALCON 0,25%: BE179523

TIMOLOL FALCON 0,5%: BE179532

Wijze van aflevering: Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2022