

## Gebrauchsinformation: Information für Patienten

### Virgan 1,50 mg/g Augengel

Ganciclovir

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht.**

1. Was ist Virgan und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Virgan beachten?
3. Wie ist Virgan anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Virgan aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### **1. Was ist Virgan und wofür wird es angewendet?**

Virgan ist eine Augengel, die ein antivirales Arzneimittel enthält, das Ganciclovir genannt wird. Es ist in der Behandlung von bestimmten oberflächlichen und viralen Augeninfektionen (Hornhaut) angezeigt.

#### **2. Was sollten sie vor der Anwendung von Virgan beachten?**

**Virgan darf nicht angewendet werden,**

- Wenn Sie allergisch gegen Ganciclovir oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- während der Schwangerschaft und der Stillzeit, es sei denn, Ihr Arzt hat es anderweitig verordnet,
- bei Männern und Frauen im gebärfähigen Alter, die keine Verhütungsmethode anwenden. Außerdem wird Männern empfohlen, die mit Virgan behandelt werden, eine lokale Verhütungsmethode (wie ein Kondom) während der Behandlung und drei Monate lang nach Beendigung der Behandlung anzuwenden. Frauen, die mit VIRGAN behandelt werden, wird empfohlen, während der Behandlung und bis zu sechs Monate nach Ende der Behandlung Verhütungsmittel anzuwenden.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Virgan anwenden.

- Nicht schlucken.
- Der Kontakt mit Ihren Augen oder Ihren Augenlidern mit der Tropfenzählerspitze ist zu vermeiden.
- Bei Trägern von Kontaktlinsen: Vermeiden Sie den Kontakt mit weichen Kontaktlinsen (siehe Abschnitt **Virgan enthält Benzalkoniumchlorid**).

#### **Kinder**

Da spezifische Studien nicht verfügbar sind, wird von der Anwendung bei Kindern unter 18 Jahren abgeraten.

### **Anwendung von Virgan zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, die am Auge verabreicht werden, sollten Sie:

1. das andere Arzneimittel verabreichen,
2. 15 Minuten warten.
3. dann zuletzt Virgan verabreichen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Dieses Arzneimittel darf während der **Schwangerschaft** und der **Stillzeit** nicht angewendet werden, es sei denn, Ihr Arzt hat es anderweitig verordnet. Siehe Abschnitt 2: Virgan darf nicht angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Nach Verabreichung des Arzneimittels am Auge können vorübergehende Sehstörungen auftreten. Warten Sie, bis Sie wieder normal sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.

### **Virgan enthält Benzalkoniumchlorid**

Dieses Arzneimittel enthält 2,625 microgram Benzalkoniumchlorid pro Tropfen Gel entsprechend 0,075mg/g.

Benzalkoniumchlorid kann von weichen Kontaktlinsen aufgenommen werden und kann zur Verfärbung der Kontaktlinsen führen. Sie müssen die Kontaktlinsen vor der Anwendung dieses Arzneimittels entfernen und dürfen sie erst nach 15 Minuten wieder einsetzen. Benzalkoniumchlorid kann auch Reizungen am Auge hervorrufen, insbesondere, wenn Sie trockene Augen oder Erkrankungen der Hornhaut (durchsichtige Schicht an der Vorderseite des Auges) haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn nach der Anwendung dieses Arzneimittels ein ungewöhnliches Gefühl, Brennen oder Schmerz im Auge auftritt.

## **3. Wie ist Virgan anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt 1 Tropfen drei- bis fünfmal täglich.

### **Kinder**

Die Anwendung dieses Augengels ist bei Kindern unter 18 Jahren nicht empfohlen

### **Art der Anwendung**

Dieses Arzneimittel soll in das Auge verabreicht werden (Okulargebrauch).

1. Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie dieses Produkt anwenden.
2. Drücken Sie vorsichtig auf die Tube, damit ein Tropfen in das betroffene Auge gegeben werden kann. Schauen Sie während dessen nach oben, und ziehen Sie das untere Augenlid nach unten.
3. Schließen Sie die Tube nach Gebrauch wieder.

### **Dauer der Anwendung**

Die Behandlung sollte nicht 21 Tage überschreiten.

**Wenn Sie eine größere Menge von Virgan angewendet haben, als Sie sollten**

Setzen Sie Ihre Behandlung, wie von Ihrem Arzt empfohlen, fort.

Wenn Sie zuviel von Virgan gebraucht haben oder eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).

**Wenn Sie die Anwendung von Virgan vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Augenerkrankungen**

*Sehr häufig (mehr als 1 Person von 10)*

- vorübergehendes Brenngefühl oder stechendes Gefühl, Reizung des Auges, Verschwommen sehen.

*Häufig (weniger als 1 Person von 10)*

- Entzündung der Augenhornhaut (oberflächliche, punktförmige Hornhautentzündungen), rotes Auge.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Abteilung Vigilanz:

Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Virgan aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Tube nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Das Medikament nicht länger als 4 Wochen nach Öffnung der Tube verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was Virgan enthält**

- Der Wirkstoffe ist Ganciclovir. Jede g Augengel enthält 1,50 mg Ganciclovir.
- Die sonstigen Bestandteile sind Carbomer (Carbopol 974P), Sorbitol, Natriumhydroxyd, Benzalkoniumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.

**Wie Virgan aussieht und Inhalt der Packung**

Das Gel ist in einer Tube à 5 g Augengel erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

*Pharmazeutischer Unternehmer*

Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankreich

*Hersteller*

Farmila- Théa Farmaceutici S.p.A., Via Enrico Fermi, 50, 20 019 Settimo Milanese (MI), Italien

**Zulassungsnummer**

BE204145

**Abgabe**

Verschreibungspflichtig.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 03/2025.**