

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Gynoxin 2% Vaginalcreme Fenticonazolnitrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Gynoxin und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Gynoxin beachten?
3. Wie ist Gynoxin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gynoxin aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Gynoxin und wofür wird es angewendet?

Gynoxin ist ein Arzneimittel gegen Infektionen, die von bestimmten Pilzen, Hefen und Bakterien verursacht werden.

Gynoxin Creme tötet Pilze, die eine Infektion der Vagina (Scheide) verursachen können. Pilzinfektionen der Vagina gehen meistens mit Juckreiz und Ausfluss einher.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Gynoxin beachten?

Gynoxin darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Fenticonazolnitrat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Gynoxin anwenden,

- wenn Sie schwanger sind oder stillen (siehe Abschnitt „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit“).
- wenn Sie eine „Barrieremethode“ aus Latex zur Empfängnisverhütung verwenden (siehe Abschnitt „Anwendung von Gynoxin zusammen mit anderen Arzneimitteln“). Sie sollten während der Anwendung dieses Präparats andere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
- wenn Sie Spermizide, intravaginale Duschen oder andere vaginale Präparate anwenden (siehe Abschnitt „Anwendung von Gynoxin zusammen mit anderen Arzneimitteln“).
- wenn Sie Reizung oder Empfindlichkeit gegen das Präparat feststellen. Möglicherweise wird es nicht durch *Candida*-Arten verursacht. Längerer Gebrauch des Produkts kann eine Überempfindlichkeitsreaktion hervorrufen.
- wenn Ihre Symptome nicht innerhalb einer Woche abklingen oder bei schweren oder wiederholt auftretenden Symptomen.
- wenn auch Ihr Partner betroffen ist.
- wenn Sie in den letzten 6 Monaten schon mehr als zwei Infektionen hatten.
- wenn Sie oder Ihr Partner jemals eine sexuell übertragbare Erkrankung hatten.

- wenn Sie jemals Überempfindlichkeit gegen Imidazole oder andere Arzneimittel gegen Pilzkrankungen zur Anwendung in der Scheide feststellten.
- wenn Sie älter als 60 sind.
- wenn bei Ihnen irgendeines der folgenden Symptome vorliegt:
 - anormale oder unregelmäßige vaginale Blutung
 - blutiger Ausfluss aus der Scheide
 - schmerzhafte Stellen, Geschwüre oder Blasen an Vulva oder Vagina
 - Unterleibsschmerzen oder Dysurie
 - Nebenwirkungen wie Rötung, Juckreiz oder Ausschlag in Verbindung mit der Behandlung
 - Erhöhte Temperatur (38 °C oder mehr)
 - Rückenschmerzen
 - Übelkeit
 - Brennen beim Wasserlassen oder andere Harnprobleme im Zusammenhang mit Vaginalausfluss
 - Unangenehm riechender Vaginalausfluss.

Kontakt mit den Augen muss vermieden werden.

Kinder und Jugendliche

Gynoxin ist für Kinder unter 16 Jahren nicht empfohlen.

Anwendung von Gynoxin zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Die in der Vaginalcreme enthaltenen fettigen Hilfsstoffe und Öle können Verhütungsmittel aus Latex wie Kondome und Scheidendiaphragmen beschädigen (siehe Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“).

Es wird davon abgeraten, Spermizide zu verwenden (vaginal eingeführte Substanz, die Sperma abtötet und allein oder in Kombination mit z. B. Scheidendiaphragmen als Verhütungsmittel angewendet wird). Jede lokale vaginale Behandlung kann ein lokales kontrazeptives Spermizid inaktivieren.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Gynoxin muss während der Schwangerschaft und der Stillzeit unter Aufsicht eines Arztes angewendet werden. Während einer Schwangerschaft darf der Applikator nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Gynoxin hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Gynoxin enthält:

- Cetylalkohol und hydrogeniertes Lanolin, die örtlich begrenzte Hautreizungen hervorrufen können (z. B. Kontaktdermatitis).
- Dieses Arzneimittel enthält 50 mg Propylenglykol in 1 g Creme.

3. Wie ist Gynoxin anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Gynoxin Vaginalcreme ist nur zur vaginalen Anwendung bestimmt.


Der Inhalt des Applikators (ungefähr 5 g) muss vor dem Zubettgehen – und bei Bedarf auch morgens – tief in die Scheide eingebracht werden (siehe Hinweise zur Anwendung).

Gynoxin kann 3 Tage hintereinander ein- oder zweimal täglich angewendet werden.
Für Infektionen außerhalb der Scheide tragen Sie eine dünne Schicht Creme auf den betroffenen Hautbereich auf.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Die Dosisempfehlungen für Kinder ab 16 Jahren sind gleich wie für Erwachsene.

Gebrauchsanweisung:



1. Schrauben Sie den Applikator statt der Kappe auf die Tube.
2. Drücken Sie die Tube vorsichtig am Ende zusammen, um den Applikator zu füllen. Wenn sich der Kolben nicht flott bewegt, ziehen Sie vorsichtig daran. Ohne gegenteilige Verordnung von Ihrem Arzt muss der Applikator vollständig gefüllt sein.
3. Entfernen Sie den Applikator von der Tube, die sofort mit der Kappe verschlossen werden muss.
4. Bringen Sie den Applikator vorsichtig möglichst tief in die Vagina ein, während Sie in Rückenlage mit hochgezogenen und gespreizten Beinen liegen. Drücken Sie den Kolben vollständig ein. Entfernen Sie dann den Applikator, ohne den Kolben zu berühren.

Wenn Sie eine größere Menge von Gynoxin angewendet haben, als Sie sollten

Falls die Creme eingenommen oder geschluckt wird, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Antgiftzentrum (070/245.245) auf.

Wenn Sie die Anwendung von Gynoxin vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Gynoxin abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Ein leicht brennendes Gefühl kann auftreten, wenn das Arzneimittel in die Scheide eingeführt wird. Das wird schnell abklingen. Wenn angewendet wie empfohlen, wird Gynoxin nur in geringem Ausmaß resorbiert und werden keine Nebenwirkungen, die den gesamten Körper betreffen (systemische Wirkungen), berichtet.

Die Verwendung von Arzneimitteln zur topischen Anwendung, insbesondere bei einer Langzeitbehandlung, kann eine Sensibilisierung verursachen (siehe Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“).

Die folgenden Nebenwirkungen wurden unter Gynoxin berichtet:

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Personen betreffen):

- brennendes Gefühl an Vulva und Vagina
- Hauterythem, Pruritus und Ausschlag

Häufigkeit nicht bekannt:

- Überempfindlichkeit am Anwendungsort

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Gynoxin aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Blister nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nach Anbruch der Tube kann Gynoxin 30 Tage lang angewendet werden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Gynoxin enthält

- Der Wirkstoff ist: Fenticonazolnitrat. 1 g Vaginalcreme enthält 20 mg Fenticonazolnitrat. Der Applikator gibt etwa 5 g Vaginalcreme ab, die 100 mg Fenticonazolnitrat enthalten.
- Die sonstige Bestandteile sind: Propylenglykol, hydrogeniertes Lanolin, raffiniertes Mandelöl, Polyglykolester von Fettsäuren, Cetylalkohol, Glycerylmonostearat, Natriumedetat, gereinigtes Wasser.

Wie Gynoxin aussieht und Inhalt der Packung

Eine Tube enthält 35 g weiße homogene Creme mit 7 Wegwerfapplikatoren.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Mailand

Italien

Örtlicher Vertreter:

Recordati BV

Burg. E. Demunterlaan 5/4

1090 Jette

Belgien

Hersteller:

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Mailand

Italien

VAMFARMA S.R.L.

Via Kennedy, 5

26833 Comazzo (Lodi)

Italien

Verkaufsabgrenzung

Freie Abgabe.

Zulassungsnummer

BE: BE162504

LU: 2006048511

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 10/2025.