

B. NOTICE

NOTICE**COXI PLUS 250 mg/g poudre pour administration dans l'eau de boisson pour pigeons****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Oropharma n.v.
Kappellestraat 70
BE-9800 Deinze
Belgique.

Fabricant responsable la libération des lots:

Lelypharma BV
Zuiveringsweg 42
Lelystad, 8243 PZ
Pays-Bas

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Coxi Plus 250 mg/g, poudre pour administration dans l'eau de boisson pour pigeons
Sulfadiméthoxine sodium

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Par gramme :

Substance active :
Sulfadiméthoxine sodium 250 mg

Autres ingrédients :
Lactose

Le produit est une poudre fine et granuleuse inodore de couleur blanche à jaune pâle.

4. INDICATION(S)

Traitement de la coccidiose chez le pigeon non destiné à la consommation humaine causée par des coccidia sensibles à la sulfadiméthoxine.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez des pigeons souffrant d'insuffisance rénale.
Ne pas utiliser chez les des animaux destinés à la consommation humaine.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Pigeons

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

50 mg/kg

Dissoudre une cuillère doseuse rase de ce médicament vétérinaire dans 2 litres d'eau (dose journalière pour 40 pigeons). La durée du traitement est normalement de cinq jours. En cas d'infections graves, il est indispensable de prolonger le traitement pendant quelques jours après 2 semaines

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Administration dans l'eau de boisson. Dissoudre une cuillère doseuse rase de ce médicament vétérinaire dans 2 litres d'eau.

10. TEMPS D'ATTENTE

Ne pas utiliser chez les oiseaux qui sont destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les oiseaux pondeurs d'œufs destinés à la consommation humaine.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après EXP.
La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

Durée de conservation après dilution ou reconstitution conforme aux instructions : 24 heures.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible :
aucune.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

La solution doit être renouvelée chaque jour.

Il convient d'éviter toute consommation d'eau de boisson provenant d'autres sources pendant la durée du traitement.

Il importe de maintenir une bonne hygiène dans le pigeonnier afin d'éviter toute nouvelle contamination. Il est recommandé que les pigeons ne participent à aucun vol de compétition pendant le traitement.

Tout comme les produits anti-parasitaires, l'utilisation fréquente et répétée de produits anti-protozoaires de la même classe, peuvent conduire au développement de résistance.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la sulfadiméthoxine sodium devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Ponte :

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie pendant la période de reproduction (la période allant de l'accouplement à la fin du nourrissage de la progéniture). Utilisation non recommandée pendant cette période.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

Le médicament vétérinaire ne peut être administré en même temps que des coccidiostatiques ionophores.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Des lésions rénales peuvent survenir en cas de surdosage.

Il est alors recommandé d'arrêter la thérapie et de donner de l'eau à volonté. L'administration de carbonate de sodium favorisera l'excrétion de la sulfadiméthoxine.

Incompatibilités :

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments vétérinaires.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Mars 2022

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Récipient en plastique polypropylène avec couche extérieure en polyéthylène, sachet intérieur en polyéthylène contenant 120 g de poudre et une cuillère doseuse en polystyrène de 4 g.

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

BE-V201381

Nom et adresse du distributeur:

Oropharma nv
Kappellestraat 70
BE-9800 Deinze

Versele-Laga nv
Kappellestraat 70
BE-9800 Deinze