

B. BIJSLUITER

BIJSLUITER
COXI PLUS 250 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater voor duiven

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Oropharma nv
Kappellestraat 70
BE-9800 Deinze
België.

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Lelypharma BV
Zuiveringweg 42
Lelystad, 8243 PZ
Nederland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Coxi Plus 250 mg/g, poeder voor gebruik in drinkwater voor duiven
Natrium sulfadimethoxine

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E)> EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)>

Per zakje van 4 gram:

Werkzaam bestanddeel:
Natrium sulfadimethoxine 1000 mg

Overige bestanddelen:
Lactose

Het product is een fijn korrelig wit tot lichtgeel geurloos poeder.

4. INDICATIE(S)

Behandeling van coccidiosis bij duiven niet bestemd voor humane consumptie, veroorzaakt door coccidia gevoelig aan sulfadimethoxine.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij duiven met nierinsufficiëntie.
Niet gebruiken bij dieren die bestemd zijn voor humane consumptie.

6. BIJWERKINGEN

Geen

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Duiven.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.

50 mg/kg

Eén zakje van dit diergeneesmiddel oplossen in 2 liter drinkwater. Dit is de dagdosis voor ongeveer 40 duiven. De gemiddelde behandelingsduur bedraagt vijf dagen.

Bij zware besmetting is het noodzakelijk om na een tweetal weken nogmaals enkele dagen te behandelen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Toediening in het drinkwater. 1 zakje van dit diergeneesmiddel oplossen in 2 liter drinkwater.

10. WACHTTIJD(EN)

Niet goedgekeurd voor gebruik bij vogels die voor humane consumptie bestemd zijn.

Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 25 °C

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de buitenverpakking na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Houdbaarheid na verdunning of reconstitutie volgens instructies: 24 uur

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Geen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

De oplossing dient dagelijks te worden verversd.

Opname van drinkwater uit andere bronnen dient tijdens de behandeling te worden vermeden.

Een goede hygiëne van het hok is van belang om herinfecties te vermijden. Het is aan te raden om tijdens de behandeling niet deel te nemen aan wedstrijdvluchten.

Zoals met ieder antiparasitair middel, zou het frequent en herhaald gebruik van antiprotozoaire middelen van dezelfde klasse kunnen leiden tot ontwikkeling van resistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Personen met een bekende overgevoeligheid voor natrium sulfadimethoxine moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Leg:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de voortplantingsperiode (de periode vanaf paring tot het eind van het voeren van nageslacht). Tijdens deze periode wordt het gebruik van het diergeneesmiddel niet aangeraden.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Het diergeneesmiddel kan niet samen worden verstrekt met ionofore coccidiostatica.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Bij overdosering kan nierbeschadiging optreden. Stopzetten van therapie en verstrekken van water ad libitum zijn dan aangewezen.

Toediening van natriumcarbonaat zal de uitscheiding van sulfadimethoxine bevorderen.

Onverenigbaarheden:

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

**13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL**

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Maart 2022

15. OVERIGE INFORMATIE

Kartonnen doos met 8 Papier-PE-Alu-PE sachets met elk 4 gram poeder.

Op diergeneeskundig voorschrift

BE-V149956

Naam en adres van de verdeler:

Oropharma nv
Kappellestraat 70
BE-9800 Deinze

Versele-Laga nv
Kappellestraat 70
BE-9800 Deinze