

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n. 5 40133 Bologna (BO) Italië Delegation of Power: MPCA bvba, Vrijestraat 28, B-9960 Assenede IB C.I.z PRAC	Anafranil 10 mg omhulde tabletten Anafranil 25 mg omhulde tabletten Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte
	Pagina 3 van 13

- Als u veel alcohol drinkt. Het is belangrijk dat uw arts weet of u elke dag alcohol drinkt om de dosis overeenkomstig aan te passen.
- Als u vaak last heeft van verstopping (constipatie).
- Wanneer u tijdens de behandeling koorts en/of keelpijn heeft, vooral tijdens de eerste maanden van de therapie, raadpleeg dan uw arts.
- Vóór een heelkundige ingreep of een tandheelkundige behandeling moet u de anesthesist of tandarts op de hoogte brengen dat u behandeld wordt met Anafranil.
- Anafranil kan een droge mond geven wat het risico op tandbederf verhoogt. Daarom moet u tijdens een langdurige behandeling regelmatig uw tanden laten nakijken.
- Als u contactlenzen draagt.
- Anafranil kan uw huid gevoeliger maken voor zonlicht. Zelfs een korte blootstelling aan zonlicht kan huiduitslag, jeuk, roodheid en/of verkleuring veroorzaken. Ga niet in direct zonlicht en draag beschermende kledij en een zonnebril.
- Als u een gezwel van het bijniermerg heeft.
- Als u lijdt aan suikerziekte (diabetes).

Serotoninesyndroom

Volgende verschijnselen kunnen een teken zijn van serotoninesyndroom: zeer hoge koorts (hyperpyrexie), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus), opwinding, onrust (agitatie), toevallen, acute psychische stoornis met verschijnselen zoals verminderde aandacht, verwardheid, geheugenstoornissen, waanideeën (delirium) en diepe bewusteloosheid (coma) (zie ook de rubriek 4 “Mogelijke Bijwerkingen”). Raadpleeg onmiddellijk uw arts voor het verderzetten van de behandeling.

Controle

Het is belangrijk dat uw arts u regelmatig controleert. Ook kan dan de dosering aangepast worden zodat de kans op bijwerkingen wordt verkleind. Uw arts kan een bloedonderzoek en een bloeddrukmeting bij u uitvoeren. Ook kan de arts uw hartfunctie controleren voor en tijdens de behandeling.

Verergering van de klachten

Als u tijdens de behandeling met Anafranil veranderingen in uw geestelijk welzijn ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Dit geldt in het bijzonder aan het begin van de behandeling of bij aanpassing van de dosering. Veranderingen in uw geestelijk welzijn kunnen bijvoorbeeld zijn: ongebruikelijke nervositeit, rusteloosheid, slaapproblemen, geïrriteerdheid, agressiviteit, verergering van depressiviteit (neerslachtigheid) of denken aan zelfmoord. U moet deze veranderingen aan uw arts melden, zeker als de verandering sterk of abrupt zijn of voor het eerst optreden. In het begin van de behandeling met Anafranil kan een verergering van de klachten optreden, waaronder paniekaanvallen. Dit schijnbaar tegenstrijdige verschijnsel verdwijnt in de regel binnen twee weken bij voortzetting van de behandeling.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n. 5 40133 Bologna (BO) Italië Delegation of Power: MPCA bvba, Vrijestraat 28, B-9960 Assenede	Anafranil 10 mg omhulde tabletten Anafranil 25 mg omhulde tabletten Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte
IB C.I.z PRAC	Pagina 7 van 13

- Van zodra een duidelijke verbetering wordt vastgesteld, mag u overgaan naar een onderhoudsdosis, die gemiddeld 5 - 10 tabletten Anafranil 10 mg per dag, 2 - 4 tabletten Anafranil 25 mg per dag of 1 tablet Anafranil Retard bedraagt.

Bejaarde patiënten (vanaf 65 jaar)

- De behandeling starten met 1 tablet Anafranil 10 mg per dag.
- Vervolgens de dosis over een periode van 10 dagen geleidelijk verhogen tot de meest geschikte dosis bereikt is van 30 - 50 mg per dag. De optimale dosis ligt tussen 1 tablet Anafranil 10 mg 3 maal per dag en 1 tablet Anafranil 25 mg 2 maal per dag.
- Deze meest geschikte dosis wordt als onderhoudsdosis tot het einde van de behandeling gehandhaafd.

II. BEHANDELING VAN DWANGGEDACHTEN EN DWANGHANDELINGEN

Volwassenen

- De behandeling starten met een inname van 1 tablet Anafranil 10 mg per dag.
- Na 3 - 4 dagen 1 tablet Anafranil 25 mg 3 maal per dag innemen.
- De dosis kan daarna nog verhoogd worden, tot een maximum van 250 mg (10 tabletten Anafranil 25 mg per dag).
- Soms komt de therapeutische uitwerking slechts ten volle tot uiting 4 weken of langer na het starten van de behandeling. De uiteindelijke onderhoudsdosis moet individueel bepaald worden. Deze dient zo laag mogelijk te zijn.

Gebruik bij kinderen (vanaf de leeftijd van 10 jaar) en jongeren tot 18 jaar

- De behandeling starten met 1 tablet Anafranil 10 mg per dag.
- Deze dagdosis wordt progressief verhoogd (verdeeld over meerdere innamen), verspreid over twee weken, al naargelang de verdraagbaarheid, tot een maximum van 3 mg/kg lichaamsgewicht of 100 mg per dag, waarbij de laagste dosis voorrang krijgt.
- Indien nodig kan deze dosis de daaropvolgende weken verder progressief worden opgevoerd tot een maximum van 3 mg/kg lichaamsgewicht of 200 mg per dag, waarbij de laagste dosis voorrang krijgt.
- Zoals bij volwassenen, moet de uiteindelijke onderhoudsdosis individueel worden aangepast en zo laag mogelijk worden gehouden. De onderhoudsdosis wordt toegediend vóór de nachtrust, om het kalmerend effect overdag te beperken.

Opmerking

De retardvorm van Anafranil (Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte) komt niet in aanmerking voor de behandeling van dwanggedachten en dwanghandelingen.

Toedieningsweg en -wijze

- Oraal gebruik.
- De Anafranil omhulde tabletten moeten in hun geheel ingeslikt worden.
- De tabletten Anafranil Retard Divitabs moeten eveneens ingeslikt worden zonder kauwen, maar mogen vooraf in 2 helften worden verdeeld.

Heeft u te veel van Anafranil gebruikt?

Wanneer u te veel van Anafranil heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n. 5 40133 Bologna (BO) Italië Delegation of Power: MPCA bvba, Vrijestraat 28, B-9960 Assenede IB C.I.z PRAC	Anafranil 10 mg omhulde tabletten Anafranil 25 mg omhulde tabletten Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte
	Pagina 10 van 13

- gewichtstoename

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

- gebrek aan eetlust
- oriëntatiestoornissen
- angst
- opwinding
- slaapstoornissen
- (lichte vorm van) overdreven opgewektheid, waarbij men veel energie heeft ((hypo)manie)
- agressiviteit
- verergering van de ziekelijke neerslachtigheid (depressie)
- slapeloosheid
- nachtmerries
- tintelingen
- verstoring van de smaakzin
- geheugenstoornissen
- concentratiestoornissen
- pupilverwijding (mydriasis)
- oorsuizingen (tinnitus)
- bloeddrukverlaging bij rechtstaan
- versnelling van de hartslag
- gewijzigd elektrocardiogram
- hartkloppingen
- warmteopstoten
- geeuwen
- braken
- buikpijn
- buikloop (diarree)
- gevoeligheid aan licht
- jeuk
- melksecretie (melkafscheiding)
- vergroten van de borsten
- verhoging van bepaalde enzymen (transaminasen)

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

- verhoogde bloeddruk

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 000 mensen):

- toename van het aantal eosinofiele witte bloedcellen (eosinofilie)
- vermindering van de bloedplaatjes (thrombocytopenie)
- kleine, puntvormige bloeditstoringen in huid of slijmvliezen (purpura)
- syndroom van abnormale secretie van antidiuretisch hormoon
- gedragsstoornissen
- allergische reacties ter hoogte van de longen
- ophouden van urine
- waterzucht (oedeem plaatselijk of veralgemeend)
- haaruitval (alopecia)

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n. 5 40133 Bologna (BO) Italië Delegation of Power: MPCA bvba, Vrijestraat 28, B-9960 Assenede IB C.I.z PRAC	Anafranil 10 mg omhulde tabletten Anafranil 25 mg omhulde tabletten Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte
	Pagina 12 van 13

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Anafranil?

- De werkzame stof in dit middel is clomipraminehydrochloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Anafranil 10 mg omhulde tabletten: lactose, glycerol, maïszetmeel, magnesiumstearaat, gelatine, talk, hypromellose, titaandioxide (E 171), copolyvidon, microkristallijne cellulose, macrogol, polyvidon, ijzeroxide (E 172), sucrose.
Anafranil 25 mg omhulde tabletten: colloïdaal siliciumdioxide, stearinezuur, lactose, glycerol, zetmeel, magnesiumstearaat, talk, hypromellose, titaandioxide (E 171), copolyvidon, microkristallijne cellulose, macrogol, polyvidon, ijzeroxide (E 172), sucrose.
Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte: colloïdaal siliciumdioxide, calciumhydrogeenfosfaat, calciumstearaat, polyacrylaat, hypromellose, ijzeroxide (E 172), gehydrogeneerd ricinus macrogol, talk, titaandioxide (E 171).

Hoe ziet Anafranil eruit en wat zit er in een verpakking?

- *Anafranil 10 mg omhulde tabletten* is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 30, 120 en 150 omhulde tabletten.
 - *Anafranil 25 mg omhulde tabletten* is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 30, 120 en 150 (+ Unit Doses) omhulde tabletten.
 - *Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte* is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 42 gleuftabletten met verlengde afgifte (+ Unit Doses).
 - Anafranil is ook verkrijgbaar onder de vorm van een oplossing voor injectie.
- Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, n. 5
40133 Bologna (BO)
Italië

Fabrikant

Alfasigma S.p.A.
Via Pontina km 30, 400
00071 Pomezia (Rome)
Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Alfasigma Belgium bvba
Tour & Taxis
Havenlaan 86C bus 204
B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 420 93 16

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Alfasigma S.p.A. Via Ragazzi del '99, n. 5 40133 Bologna (BO) Italië Delegation of Power: MPCA bvba, Vrijestraat 28, B-9960 Assenede IB C.I.z PRAC	Anafranil 10 mg omhulde tabletten Anafranil 25 mg omhulde tabletten Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte
	Pagina 13 van 13

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

- *Anafranil 10 mg omhulde tabletten*: BE056007.
- *Anafranil 25 mg omhulde tabletten*: BE056016.
- *Anafranil Retard Divitabs 75 mg tabletten met verlengde afgifte*: BE153027.

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2021

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Behandeling overdosering:

Er bestaat geen specifiek antidotum; de behandeling is symptomatisch en ondersteunend.

Elke persoon waarbij een overdosis Anafranil vermoed wordt, moet gehospitaliseerd en gedurende tenminste 72 uur van nabij gevolgd worden. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Na toediening per os moet men zo snel mogelijk trachten het geneesmiddel uit het lichaam te verwijderen door braakinductie en/of door maagspoeling, dit indien de patiënt bewust is.

Als de patiënt bewusteloos is, moeten de luchtwegen vrijgehouden worden met een endotracheale tube alvorens tot maagspoeling over te gaan. Nogmaals geen braken uitlokken bij de niet-bewuste patiënt. Deze maatregelen worden aanbevolen tot 12 uur of zelfs langer na inname van een overdosis, aangezien het anticholinergisch effect van het geneesmiddel de maaglediging kan vertragen. De toediening van actieve kool kan helpen om de resorptie van het geneesmiddel tegen te gaan.

De symptomatische behandeling is gebaseerd op moderne technieken van intensieve zorgen, met continue bepaling van de hartfunctie, de bloedgassen, de elektrolyten en indien nodig spoedmaatregelen zoals anticonvulsieve therapie, kunstmatige beademing en reanimatie.

Aangezien geobserveerd werd dat fysostigmine bradycardie, asystolie en aanvallen kan veroorzaken is het gebruik ervan tegenaangewezen bij de behandeling van een overdosis Anafranil.

Hemodialyse of peritoneale dialyse zijn niet doeltreffend gezien de lage plasmaconcentraties van clomipramine.