

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Inderm Lotion 10 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut Erythromycin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Inderm Lotion und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Inderm Lotion beachten?
3. Wie ist Inderm Lotion anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Inderm Lotion aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Inderm Lotion und wofür wird es angewendet?

Inderm Lotion ist eine Desinfektionslotion zur äußerlichen Behandlung der (Jugend)Pusteln (Akne). Es handelt sich um ein Arzneimittel, das das Antibiotikum Erythromycin enthält. Erythromycin hemmt das Wachstum der Bakterien, die beim Auftreten von (Jugend)Pusteln eine Rolle spielen.

Inderm Lotion ist angezeigt für die lokale Behandlung der Akne, insbesondere der entzündlichen Formen von Akne, die mit Papeln (Knötchen) und Pusteln (Eiterbläschen) einhergehen.

Wenn Sie sich nach 14 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Inderm Lotion beachten?

Inderm Lotion darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Erythromycin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Inderm Lotion anwenden.

- Inderm Lotion ist alkoholhaltig. Vermeiden Sie deshalb den Kontakt mit offenen Wunden, der Schleimhaut oder den Augen.
- Inderm Lotion ist brennbar.

- Wenn Sie wissen, dass Sie allergisch gegen die verwandten Makroliden (bestimmte Gruppe von Antibiotika) sind. Wenn dies der Fall ist, sind Sie möglicherweise auch allergisch gegen Erythromycin und ist von einer Kreuzallergie die Rede (eine durch eine bestehende Überempfindlichkeit ausgelöste Überempfindlichkeit).
- Wenn Sie wissen, dass Sie resistent (immun) gegen andere Antibiotika der Makrolidgruppe oder gegen die Antibiotika Lincomycin und Clindamycin sind. Wenn dies der Fall ist, sind Sie möglicherweise auch unempfindlich (immun) gegen Erythromycin und ist von einer Kreuzresistenz die Rede.
- Möglicherweise entwickeln Sie im Laufe der Behandlung eine bakterielle Resistenz. Dies bedeutet, dass die Bakterien gegen Erythromycin immun werden. Wenn keine oder eine unzureichende Besserung eintritt, brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Er wird die geeigneten Maßnahmen treffen.

Anwendung von Inderm Lotion zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Wenn Sie gleichzeitig Schälmittel (Präparate, die die oberflächliche Hautschicht ablösen) verwenden, kann es zu einem gehäuften Auftreten von Hautreizungen kommen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Inderm Lotion darf in der empfohlenen Dosierung während der Schwangerschaft angewendet werden. Inderm Lotion darf in der empfohlenen Dosierung in der Stillzeit angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Inderm Lotion hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Inderm Lotion enthält Alkohol (Isopropylalkohol)

Vermeiden Sie deshalb den Kontakt mit offenen Wunden, der Schleimhaut oder den Augen. Die Lotion ist brennbar.

3. Wie ist Inderm Lotion anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Wenn nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Art der Anwendung:

Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, wird Inderm Lotion morgens und abends nach dem Reinigen der Haut verwendet.

Die Lotion wird mit Hilfe eines Wattebausches, Zellstofftupfers o.ä. auf das erkrankte Gebiet aufgetragen.

Dauer der Behandlung:

Die Behandlung mit Inderm Lotion sollte über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen erfolgen. In der Regel ist die Anwendung über 8 Wochen zur Erzielung eines guten Ergebnisses ausreichend. In Einzelfällen kann die Behandlungszeit auf Anweisung des Arztes überschritten werden.

Dieses Arzneimittel darf ohne ärztliche Anweisung nicht länger als 8 Wochen angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Inderm Lotion angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Inderm Lotion angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Bisher wurde nicht über einen Fall von Überdosierung mit Inderm Lotion berichtet. Eine Überdosierung ist wegen der äußerlichen Anwendungsweise übrigens unwahrscheinlich.

Wenn Inderm Lotion versehentlich verschluckt wurde, wird empfohlen, eine große Menge Wasser zur Verdünnung der Lotion zu trinken.

Wenn Sie die Anwendung von Inderm Lotion vergessen haben

Die Behandlung möglichst schnell fortsetzen.

Verwenden Sie nicht die doppelte Menge Inderm Lotion, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Inderm Lotion abbrechen

Ein vorzeitiger Abbruch der Behandlung kann zu bakterieller Resistenz gegen Inderm Lotion führen (= bakterielle Resistenz. Siehe auch „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“). Eine Behandlungsdauer von mindestens 6 Wochen ist notwendig.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Inderm Lotion Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Der Alkohol in der Lotion kann vor allem zu Beginn der Behandlung vorübergehendes Brennen, leichte Rötung oder Schuppung der Haut, oder Juckreiz verursachen.

In diesen Fällen ist die Lotion weniger häufig anzuwenden. Bei starker Ausprägung der Reaktion sollten Sie die Behandlung abbrechen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über die Website: www.fagg-afmps.be anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Inderm Lotion aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Bei Zimmertemperatur lagern (15°C - 25°C).

Sie dürfen Inderm Lotion nach dem auf dem Etikett oder dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Inderm Lotion enthält

- Der Wirkstoff ist Erythromycin. Ein g Lotion enthält 10 mg Erythromycin (entsprechend 1%).
- Die sonstigen Bestandteile sind Isopropylalkohol, Isopropylmyristat und Dibutyladipat.

Wie Inderm Lotion aussieht und Inhalt der Packung

Lösung zur Anwendung auf der Haut.
Flasche mit 50 ml Lotion.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

EG (Eurogenerics) NV - Heizel Esplanade b22 – 1020 Brüssel

Vertreter für die Korrespondenz und Information

WILL PHARMA SA - Rue du Manil 80 - 1301 WAVER

Hersteller

MOBILAT PRODUKTIONS GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85 276 Pfaffenhofen – Deutschland

STADA ARZNEIMITTEL AG – Stadastrasse 2-18 – 61 118 Bad Vilbel - Deutschland

Zulassungsnummer: BE149913

Abgabeform: freie Abgabe

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt/überarbeitet im 12/2018 / 10/2018.