Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Dakin Cooper 0,5 g/100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut

Konzentrierte Natriumhypochloritlösung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einigen Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. Was ist Dakin Cooper und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dakin Cooper beachten?
3. Wie ist Dakin Cooper anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dakin Cooper aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Dakin Cooper und wofür wird es angewendet?

Es ist ein lokales Desinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut, das zur Gruppe der Chlorverbindungen gehört.

Dakin Cooper ist geeignet:
- zur Pflege und Desinfektion der Haut und der Schleimhäute (beispielsweise in der Gynäkologie, Pädiatrie und Dermatologie);
- zur lokalen Behandlung von Wunden und oberflächlichen Hautinfektionen.

Dakin Cooper wird zudem auch zur Wunddesinfektion in der Chirurgie verwendet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Dakin Cooper beachten?

Dakin Cooper darf nicht angewendet werden
- Wenn Sie allergisch gegen konzentrierte Natriumhypochloritlösung oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Brandwunden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Dakin Cooper anwenden.

- Dakin Cooper kann manche Kleidungsstücke ausbleichen.
- Nicht austrinken.
- Falls Sie noch andere Arzneimittel anwenden, lesen Sie bitte auch den Abschnitt „Anwendung von Dakin Cooper zusammen mit anderen Arzneimitteln".

Kinder
Dakin Cooper kann bei Kindern angewendet werden.

Anwendung von Dakin Cooper zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

- Nicht zusammen mit anderen Desinfektionsmitteln verwenden.
- Nicht zusammen mit Seife verwenden.

Anwendung von Dakin Cooper zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol
Nicht zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Keine Kontraindikationen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Nicht zutreffend.

3. Wie ist Dakin Cooper anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:
Dakin Cooper sollte unverdünnt eingesetzt werden:
- zur Spülung: Auswaschen von Wunden;
- für getränkte Kompressen;
- für Bäder: Fingerbad, Fußbad, Sitzbad.

Die Behandlung je nach Bedarf wiederholen.

Anwendung bei Kindern
Dakin Cooper kann bei Kindern angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Dakin Cooper angewendet haben, als Sie sollten
Wenn Sie zuviel Dakin Cooper angewendet haben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antigiftzentrum **(070/245.245)** in Verbindung.

Wenn die Lösung unbeabsichtigterweise ausgetrunken wird, kann sie Reizungen und Schäden an den Schleimhäuten auslösen die mit Schmerzen und Brechreiz einhergehen. Der behandelnde Arzt muss umgehend informiert werden, um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können (Gegengift: Bicarbonat (2 bis 5 g) oder Natriumthiosulfat (in Form einer 1 %igen bis 2,5 %igen Lösung).

Wenn Sie die Anwendung von Dakin Cooper vergessen haben
Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von Dakin Cooper abbrechen
Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Ein brennendes oder prickelndes Gefühl kann auftreten (bei schweren Verletzungen oder in der gynäkologischen Chirurgie). Dies hat jedoch keine weiteren Folgen und die Behandlung kann wie geplant fortgesetzt werden.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien
Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
www.afmps.be
Abteilung Vigilanz:
Website: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg
Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Dakin Cooper aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Packung nach ‚EXP' angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Dakin Cooper enthält
- Der Wirkstoff ist konzentrierte Natriumhypochloritlösung (wobei 0,5 g/100 ml als aktives Chlor vorliegen).
- Die sonstigen Bestandteile sind Kaliumpermanganat – Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat für einem pH-Wert von 10,5 – gereinigtes Wasser für 100 ml.

Wie Dakin Cooper aussieht und Inhalt der Packung
Dakin Cooper ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut; es ist erhältlich in einer Flasche mit 60 ml, 250 ml, 500 ml und im Karton zu 24 Flaschen mit 250 ml (Klinikverpackung).
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Niederlande

Örtlichen Vertreter:
Cooper Consumer Health BE NV
Gaston Crommenlaan 8
B-9050 Gent
Tel: +32 9 296 2149
E-mail: contactbe@cooperconsumerhealth.com

Hersteller
Cooperation Pharmaceutique Française
2, rue de la Saussaie
F-77310 Saint Fargeau Ponthierry
Frankreich

Zulassungsnummer
BE: BE156195
LU: 1996080349

Art der Abgabe
Nicht verschreibungspflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 08/2025.