

A. NOTICE

NOTICE**DOXYBACTIN VET 10 mg/ml, gouttes orales, suspension****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Alfasan Nederland
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland

Fabricant responsable de la libération des lots:

Beltapharm
Via Stelvio 66
I-20095 Cusano Milanino (MI)
Italie

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonkveer
Pays-Bas

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

DOXYBACTIN VET 10 mg/ml, gouttes orales, suspension.

Doxycycline.

3. LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRES INGRÉDIENTS

Doxycyclini hyclas (= doxycyclinum 10 mg) 11,547 mg - Calcii chloridum hexahydricum - Sorbitolum liquid cristallisabile - Aluminium magnesii silicas - Povidonum - Glycerolum - Butylis parahydroxybenzoas - Propylis hydroxybenzoas - Saccharinum natricum - Natrii metabisulfis - Raspberry flavor - Appeline - Natrii hydroxydum - Simeticonum emulsio - Aqua purificata ad 1 ml - Nitrogen q.s.

4. INDICATIONS

Le Doxybactin Vet est indiqué chez le chien et le chat pour le traitement des maladies à germes sensibles à la doxycycline.

5. CONTRE-INDICATIONS

Le Doxybactin Vet est contre-indiqué chez les animaux ayant manifesté, dans le passé, une hypersensibilité aux tétracyclines.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des vomissements peuvent être observés chez le chien et le chat après administration de fortes doses à un animal à jeun.

Les effets secondaires gastro-intestinaux sont rares. Des réactions indésirables telles que nausée, vomissements et diarrhée sont cependant possibles.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCES CIBLES

Chien et chat.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Doxybactin Vet est destiné à l'administration orale chez le chien et le chat.

Doxybactin Vet s'administre aux chiens et aux chats à raison de :
5 mg/kg de poids vif (ou 0,5 ml/kg) durant 5 jours.

Pour garder et garantir des concentrations plasmatiques plus stables, une administration fractionnée (deux fois par jour) est nécessaire.

Lors de l'administration, il y a lieu de secouer le flacon avant prélèvement de la dose à administrer.

L'absorption de la doxycycline n'est guère modifiée par l'ingestion simultanée de lait ou d'aliments. Elle peut donc être administrée sans tenir compte des repas.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**10. TEMPS D'ATTENTE****11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conservées à température ambiante, les gouttes orales gardent leur activité jusqu'à la date indiquée sur le conditionnement.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage après EXP.

12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

L'administration d'antibiotiques peut occasionnellement favoriser la multiplication de micro-organismes non sensibles. Il importe donc de maintenir l'animal en observation constante.

En cas d'irritation gastrique, on recommande la prise de Doxybactin Vet au moment du repas.

L'administration de médicaments du groupe des tétracyclines durant la période de formation des dents pourrait, en cas d'administration au long cours, provoquer une modification de la teinte des dents (jaunissement).

UTILISATION EN CAS DE GESTATION

La doxycycline n'a pas été étudiée chez la chienne et la chatte gestantes, à qui elle ne doit donc être administrée que si, du jugement du vétérinaire, elle se révèle indispensable pour sauvegarder la santé de l'animal.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Les anti-acides contenant des sels d'aluminium, de calcium ou de magnésium diminuent l'absorption de la doxycycline et sont de ce fait contre-indiqués chez les animaux traités à l'aide de Doxybactin Vet.

TRAITEMENT EN CAS D'URGENCE

Si des modifications de nature allergique dues à une hypersensibilité aux tétracyclines venaient à se manifester, il faudrait interrompre immédiatement le traitement en cours et instaurer une thérapie symptomatique adéquate.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Août 2021

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PRÉSENTATIONS

Flacons de 10 ml et de 30 ml avec compte-gouttes gradué à 0,25 ml, 0,5 ml et 1 ml ; Ceci permet d'administrer la dose requise en fonction du poids de l'animal à traiter.

Flacons de 60 ml avec une seringue graduée à 2,5 ml.

MODE DE DELIVRANCE

Sur prescription vétérinaire.

NUMERO DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

BE-V136394

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.