

**NOTICE**

---

**Notice : information du patient****LACTEOL 170 mg, gélule**

*Lactobacillus LB* inactivés et milieu de culture fermenté

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que LACTEOL 170 mg, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LACTEOL 170 mg, gélule ?
3. Comment prendre LACTEOL 170 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LACTEOL 170 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. Qu'est-ce que LACTEOL 170 mg, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?****Qu'est-ce que LACTEOL 170 mg, gélule ?**

LACTEOL 170 mg, gélule contient des *lactobacillus* qui sont des bactéries normalement présentes dans le tube digestif.

**Dans quel cas LACTEOL 170 mg, gélule est-il utilisé ?**

LACTEOL 170 mg, gélule est utilisé pour traiter la diarrhée chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte en complément d'une réhydratation et/ou de mesures diététiques.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LACTEOL 170 mg, gélule ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais LACTEOL 170 mg, gélule :**

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous souffrez d'une intolérance au lactose.
- si vous avez une salmonellose, infection causée par des bactéries appelées salmonelles.
- si vous avez des antécédents d'allergies aux protéines de lait de vache.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre LACTEOL 170 mg, gélule.

**Vous devez consulter votre médecin dans le cas suivant :**

Si vous ne constatez aucune amélioration de la diarrhée au bout de 2 jours de traitement.

**Vous devez consulter rapidement votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes :**

- en cas de fièvre et de vomissements,
- en cas de présence de sang dans les selles ou de selles visqueuses (présence de glaires),
- en cas de soif intense ou de sensation de bouche sèche. Ces signes montrent un début de déshydratation causée par une perte importante de liquide.

**Autres médicaments et LACTEOL 170 mg, gélule**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris tout autre médicament.

**LACTEOL 170 mg, gélule avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

**Grossesse, allaitement et fertilité**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**LACTEOL 170 mg, gélule contient du lactose.**

Ce médicament contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au lactose, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**3. Comment prendre LACTEOL 170 mg, gélule ?****Posologie**

La dose recommandée est de 2 à 4 gélules par jour, en fonction de l'intensité de vos troubles.

Chez les nourrissons, la dose recommandée est de 2 gélules par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de LACTEOL 170 mg, gélule est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Mode d'administration**

Ce médicament est utilisé par voie orale.

Avalez la gélule avec un demi-verre d'eau.

Pour les nourrissons et les enfants incapables d'avaler la gélule, la gélule peut être ouverte et le contenu mélangé dans un peu d'eau.

**Si vous avez pris plus de LACTEOL 170 mg, gélule que vous n'auriez dû :**

Si vous avez utilisé ou pris trop de LACTEOL 170 mg, gélule, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

**Si vous oubliez de prendre LACTEOL 170 mg, gélule :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre LACTEOL 170 mg, gélule**

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Déclaration des effets indésirables**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

[www.afmps.be](http://www.afmps.be)

Division Vigilance:

Site internet: [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Luxembourg:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver LACTEOL 170 mg, gélule**

- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.
- Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. Contenu de l'emballage et autres informations****Ce que contient LACTEOL 170 mg, gélule**

- **Les substances actives sont :**
  - *Lactobacillus LB\** inactivés (5 milliards)
  - Milieu de culture fermenté (neutralisé) (80 mg)soit 170 mg de substances actives pour une gélule.

\**Lactobacillus fermentum* et *Lactobacillus delbrueckii*

- **Les autres composants sont :** acide silicique, talc, stéarate de magnésium, lactose anhydre, lactose monohydraté, carbonate de calcium.  
Composition de l'enveloppe de la gélule : gélatine, eau, dioxyde de titane.

**Qu'est ce que LACTEOL 170 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme d'une gélule. Chaque boîte contient 20 gélules.

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

DSM-Firmenich Houdan SAS  
Lieu-Dit «la Prévôté»  
Route de Bû  
78550 Houdan  
France

**Représentant local**

Truvion Healthcare N.V.  
Walgoedstraat 12A  
9140 Temse  
Belgique

**Numéro d'Autorisation de mise sur le marché**

BE: BE134294  
LU: 1995020893

**Mode de délivrance**

Médicament non soumis à prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 06/2024.**