

BIJSLUITER**COLLIER PROPOXUR HALSBAND voor kleine hondenrassen en katten
COLLIER PROPOXUR HALSBAND voor grote en middelgrote hondenrassen****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Duitsland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**COLLIER PROPOXUR HALSBAND voor kleine hondenrassen en katten
COLLIER PROPOXUR HALSBAND voor grote en middelgrote hondenrassen**

Een halsband voor kleine hondenrassen en katten meet ongeveer 36 cm en weegt ongeveer 12,15 g.
Hij is gemaakt op basis van polyvinylchloride en bevat 9,4% propoxur.

Een halsband voor grote en middelgrote hondenrassen meet ongeveer 66 cm en weegt ongeveer 41 g.

Hij is eveneens gemaakt op basis van polyvinylchloride en bevat 9,4% propoxur als actief bestanddeel.

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN**Actieve stof:**

Propoxur hetzij 3,854 g hetzij 1,145 g

Excipiëntia:

Di-isobutyladipaat
Propyleenglycol-octanoaatdecanoat
Geëpoxydeerde soja-olie
Stearinezuur
Ijzeroxyde (E172)
Polyvinylchloride

4. INDICATIES

Ter bestrijding van teken en vlooien bij honden en katten:

- *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ctenocephalides felis* bij honden.
- *Demacantor variabilis*, *Ixodes ricinus*, *Ctenocephalides felis* bij katten.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Niet aanbrengen bij zieke of herstellende dieren of bij honden of katten met huidlesies.

6. BIJWERKINGEN

In geval van intolerantieverschijnselen of huidirritatie (bv. bij te strak zittende band), moet men de halsband afdoen.

Propoxur is een carbamaat met cholinesteraseremmende werking.

Bij accidentele inname kunnen carbamaatintoxicatieverschijnselen optreden, waaronder excessieve salivatie, braken, diarree, spiertremoren, miosis of dyspnee.

Jonge dieren zijn gevoeliger voor carbamaatintoxicatie.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

De collier propoxur halsband 36 cm is bestemd voor kleine hondenrassen en katten.

De collier propoxur halsband 66 cm is bestemd voor grote en middelgrote hondenrassen.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

DOSERING

Eén collier propoxur halsband 36 cm voor kleine hondenrassen en katten.

Eén collier propoxur halsband 66 cm voor grote en middelgrote hondenrassen.

BEHANDELINGSDUUR

Door wrijving tegen de hals van het dier komt een microfijn poeder uit de halsband vrij. Dit microfijn poeder verdeelt zich voortdurend over het ganse lichaam van het dier. Het onzichtbaar microfijn poeder doodt aldus de insecten. De werking tegen vlooien geschiedt binnen enkele uren; teken worden gedood na ongeveer één dag. De afgestorven teken blijven echter nog enkele dagen vastgehecht aan de vacht waarna zij gemakkelijk met een borstel verwijderd kunnen worden of reeds van het dier gevallen zijn.

Tijdelijk kunnen nieuwe insecten het dier besmetten, doch het hierboven beschreven proces herhaalt zich voortdurend.

De halsband blijft actief gedurende 4 maanden tegen vlooien en 8 weken tegen teken. Na deze periode dient de halsband door een nieuwe te worden vervangen. Alhoewel de halsband waterbestendig is, is het aan te bevelen de band af te nemen bij het wassen en weer om te doen als de hond of kat droog is. Veelvuldig significant bevochtigen van de vacht (regen, zwemmen, bad) kan de doeltreffendheid van de halsband verminderen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De verpakking pas openen bij het aanbrengen van de halsband.

De halsband dient losjes om de hals van de hond of de kat bevestigd te worden, zodat er steeds een ruimte van twee vingers tussen hals en halsband blijft.

Het overbodige stuk afknippen en wegwerpen.

Behoudens tegenadvies mag deze halsband door het dier blijven gedragen worden.

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren bij kamertemperatuur in goed gesloten verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden, verwijderen van eet- en drinkwaren.

Het preparaat is houdbaar tot de vervaldatum vermeld op de verpakking. De vervaldatum bestaat uit de letters “EXP” (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als algemene voorzorgsmaatregel worden er beter geen andere insecticiden gebruikt op het dier zelf tijdens het dragen van de halsband.

De omgeving van het dier, die een bijna onuitputtelijke bron voor vlooiënbesmettingen vertegenwoordigt (eieren, larven en poppen), dient gelijktijdig op een afdoende wijze behandeld te worden, teneinde een goede vlooiëncontrole te bekomen bij de dieren.

Indien er binnen het huishouden meerdere honden of katten zijn, dan dienen alle dieren behandeld te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

De verpakking goed gesloten bewaren tot het moment van het gebruik.

Vermijd dat kinderen met de halsband spelen.

Vermijd overmatig contact met de halsband gedurende en ook na het aanbrengen. Na het aanbrengen en na elk contact de handen zorgvuldig wassen.

Gezien de aard van het diergeneesmiddel is overdosering niet erg waarschijnlijk.

Bij accidentele inname kunnen carbamaatintoxicatieverschijnselen optreden, waaronder excessieve salivatie, braken, diarree, spiertremoren, miosis of dyspnee.

In dergelijke gevallen dient men onmiddellijk medische verzorging te laten verstrekken.

Informatie voor de arts/dierenarts:

Antidotum: atropinesulfaat.

De behandeling is functie van de ernst van de intoxicatie. Een vast behandelingsschema bestaat niet.

De aanbevolen dosering is:

- 2 tot 5 mg voor de mens (kinderen: 0,5 - 3,0 mg) I.V., desnoods I.M.

- 0,3 mg/kg voor honden en katten waarvan 1/3 I.V., de rest S.C.

Te herhalen zo nodig, indien zich geen verbetering in de toestand van de patiënt voordoet.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden opdat het product niet in het milieu terecht zou komen.

Extreem gevaarlijk voor bijen, vissen en waterorganismen. Oppervlaktewateren of grachten niet bezoedelen met dit product of zijn verpakking.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

November 2020

15. OVERIGE INFORMATIE

Uit de resultaten van laboratoriumtesten uitgevoerd op verschillende diersoorten blijkt dat er geen ongewenste effecten te verwachten zijn tijdens de dracht.

Het gebruik bij lacterende honden of katten wordt niet aanbevolen.

Het poeder dat door de band wordt vrijgesteld is een cholinesteraseremmer.

BE-V132002

BE-V131993

Vrije aflevering