

**Notice : information de l'utilisateur****Vermox 500 mg comprimés**

mébendazole

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que Vermox et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Vermox ?
3. Comment utiliser Vermox ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Vermox ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations ?

**1. Qu'est-ce que Vermox et dans quel cas est-il utilisé ?**

Vermox 500 mg est un médicament contre l'échinococcose, une maladie causée par des vers.

Vermox 500 mg ne peut être utilisé que dans le traitement d'une maladie vermineuse appelée échinococcose. Dans cette maladie, des cavités (kystes) en formes de vésicules peuvent se former, surtout dans le foie et les poumons. Le traitement normal consiste à éliminer ces kystes par une opération. Vermox 500 mg n'est prescrit que si une opération est impossible ou si les kystes ne peuvent être entièrement retirés.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Vermox ?****N'utilisez jamais Vermox**

- Si vous êtes allergique au mébendazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Cette hypersensibilité peut être reconnue à une éruption de la peau, des démangeaisons, un essoufflement et/ou un gonflement du visage. Arrêtez alors le traitement et consultez votre médecin.
- Chez les enfants de moins de 2 ans. Vermox n'a pas fait l'objet d'études approfondies chez les enfants de moins de 2 ans. En raison de l'absence de données de sécurité suffisantes, Vermox ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 1 an.

**Avertissements et précautions**

- Si vous souffrez d'une affection du foie ou des reins. Dans la mesure où il est recommandé d'administrer des doses plus élevées et de prolonger le traitement chez les patients atteints d'échinococcose, il convient de faire preuve de prudence lors du traitement de patients souffrant de maladies hépatiques chroniques graves et/ou de dépression de la moelle osseuse. En cas

d'utilisation prolongée de grandes quantités, la fonction du foie peut être perturbée. Ces patients doivent être étroitement surveillés au moyen d'examens hématologiques, hépatiques et rénaux.

- Lorsque les comprimés sont pris avec un repas riche en graisses, cela favorise l'absorption du médicament dans le sang.
- Chez des enfants de moins de 2 ans : Des convulsions chez les enfants, y compris chez les nourrissons de moins de 1 an, ont été très rarement signalées après la mise sur le marché. Vermox n'a pas fait l'objet d'études approfondies chez les enfants de moins de 2 ans. Par conséquent, Vermox ne doit être utilisé chez les enfants âgés de 1 à 2 ans que si le bénéfice potentiel justifie le risque potentiel. En raison de l'absence de données de sécurité suffisantes, Vermox ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 1 an.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Vermox.

### **Autres médicaments et Vermox**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent influencer l'activité de Vermox. Ils ne doivent donc pas être utilisés ensemble. Votre médecin ou votre pharmacien peut vous dire de quels médicaments il s'agit.

- Si vous devez prendre en même temps de la cimétidine (médicament utilisé en cas de brûlures d'estomac [acidité gastrique]), vous devez en avertir votre médecin. Il prendra les mesures nécessaires et adaptera éventuellement la dose.
- Il faut éviter d'utiliser Vermox en même temps que du métronidazole (un médicament contre des infections bactériennes et protozoaires).
- Il est possible que l'activité de Vermox 500 mg diminue en cas de prise simultanée de phénytoïne ou de carbamazépine (des médicaments contre l'épilepsie). C'est pourquoi Vermox 500 mg ne peut pas être utilisé en même temps que ces médicaments.
- Si une personne diabétique doit utiliser Vermox 500 mg et est habituée à s'injecter une certaine quantité d'insuline, elle doit faire contrôler régulièrement son taux de glucose (glycémie) pendant le traitement. Vermox 500 mg peut en effet réduire les besoins en insuline.

### **Vermox avec des aliments et boissons**

Si vous prenez Vermox 500 mg au cours d'un repas riche en graisses, cela favorise l'absorption du médicament dans le sang.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Grossesse

L'utilisation de Vermox doit être évitée pendant les trois premiers mois de la grossesse. Vermox peut être utilisé au cours du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse si cela s'avère nécessaire sur le plan clinique.

#### Allaitement

Pendant la période d'allaitement, vous devez faire preuve de prudence si vous utilisez Vermox.

#### Fertilité

Il n'existe pas de données concernant l'effet du mébendazole sur la fertilité.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Vermox n'exerce aucune influence sur la capacité de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines

### **Vermox 500 mg comprimés contient du lactose et du sodium**

- Lactose : si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Sodium : ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

### 3. Comment utiliser Vermox ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Vermox 500 mg se présente sous la forme de comprimés à prendre par la bouche. Pour les jeunes enfants ou d'autres patients incapables d'avaler les comprimés, Vermox suspension buvable peut être plus adaptée. Dans ce cas, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose recommandée est :

Le nombre de comprimés que vous devez prendre dépend de la formule sanguine et de la fonction du foie. Dans la plupart des cas, au cours de la première semaine, on prescrira 1 comprimé, à prendre 3 fois par jour. Ensuite, la dose est augmentée progressivement. Votre médecin peut adapter à tout moment la dose à votre situation personnelle.

Il est préférable de prendre les comprimés avec un repas contenant suffisamment de graisses, ce qui facilite l'absorption du médicament dans l'intestin.

Votre médecin déterminera pendant combien de temps vous devez poursuivre le traitement. La durée du traitement est généralement d'au moins 6 mois.

#### *Population pédiatrique :*

Vermox suspension buvable ne doit être envisagée que pour les patients tels que les jeunes enfants qui ne peuvent pas avaler le comprimé.

#### **Si vous avez utilisé plus de Vermox que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé ou ingéré trop de Vermox 500 mg, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Si de grandes quantités de Vermox 500 mg sont pris tous les jours pendant une longue période, une chute de cheveux ainsi que des troubles sanguins, rénaux et hépatiques peuvent survenir. Par conséquent, un traitement à long terme ne doit avoir lieu que sous stricte surveillance médicale.

Des trop grandes quantités de Vermox 500 mg peuvent provoquer des crampes intestinales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des étourdissements ou des maux de tête.

Il est recommandé d'informer votre médecin si l'un de ces signes apparaît chez vous. Il prendra les mesures nécessaires.

#### **Si vous oubliez d'utiliser Vermox**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Arrêtez le traitement par Vermox et contactez immédiatement votre médecin** si vous ressentez l'un des symptômes suivants.

**Rare** (peut affecter 1 à 10 utilisateurs sur 10 000) :

- Une réaction qui survient immédiatement après l'administration et se caractérise par une éruption cutanée, des démangeaisons, une difficulté respiratoire et un gonflement du visage.
- Une réaction d'hypersensibilité grave qui survient peu de temps après l'administration et se caractérise par de l'urticaire, des démangeaisons, des bouffées de chaleur, un évanouissement et des difficultés respiratoires, entre autres symptômes.
- Convulsions
- Étourdissements

**Très rare** (peut affecter jusqu'à 1 utilisateur sur 10 000) :

- Une affection grave de la peau se manifestant par une éruption cutanée, des cloques sur la peau et des lésions douloureuses au niveau de la bouche et des yeux ainsi que dans la zone de l'anus et des parties génitales, en association avec de la fièvre.

D'autres effets indésirables peuvent survenir après un traitement par Vermox 500 mg, à savoir :

**Fréquent** (peut affecter 1 à 10 utilisateurs sur 100) :

- Maux de ventre
- Nausées
- Vomissements

**Peu fréquent** (peut affecter 1 à 10 utilisateurs sur 1 000) :

- Troubles gastro-intestinaux, diarrhée, flatulences (gaz)

**Rare** (peut affecter 1 à 10 utilisateurs sur 10 000) :

- Inflammation du foie, anomalies dans les tests de la fonction hépatique
- Chute de cheveux

**Très rare** (peut affecter jusqu'à 1 utilisateur sur 10 000) :

- Inflammation du rein
- Déficit en globules blancs

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

#### **Belgique :**

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Boîte postale 97, B-1000 Bruxelles Madou ([www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be) ; [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)).

#### **Luxembourg :**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé. Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Vermox ?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après « EXP ». Les chiffres indiquent un mois et une année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Vermox

- La substance active est le mébendazole. Chaque comprimé contient 500 mg de mébendazole.
- Les autres composants sont : lactose monohydraté, méthylcellulose (E461), glycolate d'amidon sodique de type A, cellulose microcristalline (E460), amidon de maïs, stéarate de magnésium (E470b), dioxyde de silice colloïdal anhydre (E551) (voir également rubrique 2).

### Aspect de Vermox 500 mg et contenu de l'emballage extérieur

Emballage de 50 et 200 comprimés.

Il est possible que les différents conditionnements et formulations ne soient pas tous commercialisés.

### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Johnson & Johnson Consumer NV/SA  
Michel de Braeystraat 52  
2000 Antwerpen

### Fabricant

Johnson & Johnson Consumer NV/SA  
Michel de Braeystraat 52  
2000 Antwerpen  
België

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.  
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B Queluz  
2730-055 Barcarena, Portugal

### Numéro d'autorisation de mise sur le marché

BE : BE134407  
LU : [2004088367](#)

### Mode de délivrance

Sur prescription médicale.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2023.**

v17.0\_b16.0&15.0