

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml,
Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

Erythromycin
Zinkacetatdihydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Zineryt und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Zineryt beachten?
3. Wie ist Zineryt anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zineryt aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Zineryt und wofür wird es angewendet?

Zineryt enthält das Antibiotikum Erythromycin in der Form eines Komplexes mit Zink in einem Lösungsmittel, das aus Alkohol besteht und aus einem Stoff, der eine mildernde Auswirkung auf die Haut hat.

Indiziert zur lokalen Behandlung von Akne, insbesondere der gängigen Form von entzündeten Geschwüren.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Zineryt beachten?

Zineryt darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Erythromycin oder andere Antibiotika derselben Gruppe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Zineryt darf nicht ins Auge gelangen und nicht in Berührung mit Schleimhäuten gebracht werden. Sollte dies jedoch passieren, dann bitte sofort mit kaltem oder lauwarmen Wasser einige Minuten lang spülen.
- Der Inhalt der Flasche Zineryt kann beim Kleckern Flecken auf Textilien oder Mobiliar verursachen.
- Wenn Sie noch andere Arzneimittel nehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt "Anwendung von Zineryt mit anderen Arzneimitteln".

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn einer der oben erwähnten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zutreffen hat.

Anwendung von Zineryt zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Zineryt darf auf der Haut nicht mit Säuren oder Laugen in Berührung kommen.

Jedoch kann Zineryt mit einer Lokalbehandlung mit Vitamin-A-Säure oder Benzoylperoxid oder einer Oralbehandlung mit Tetracyclin kombiniert werden.

Man soll vorsichtig sein bei gleichzeitiger Anwendung von anderen lokalen Anti-Akne Mitteln, da die Irritation sich verschlechtern kann, insbesondere mit Produkten, die die Abschuppung stimulieren.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Zineryt darf während der Schwangerschaft und der Stillzeit verwendet werden.

3. Wie ist Zineryt anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Man trägt Zineryt zweimal täglich auf die gesamte Gesichtshaut oder auf andere erkrankte Gewebebezirke (auch auf die Umgebung der erkrankten Stellen) auf, vorzugsweise nach dem Waschen.

Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen wie lange Sie Zineryt verwenden müssen. Die übliche Behandlungsdauer ist 10 bis 12 Wochen. In den meisten Fällen wird dann eine zufriedenstellende Besserung festgestellt. Sie müssen die Behandlung zu Ende führen.

Wenn Sie eine größere Menge von Zineryt angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zuviel Zineryt verwendet haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Giftnotruf (070/245.245) auf.

Der Gebrauch zu großer Mengen Zineryts während längerer Zeit wird vermutlich eine Rötung und Austrocknung der Haut zur Folge haben.

Bei oraler Einnahme des gesamten Inhalts einer Packung Zineryt werden hauptsächlich Vergiftungserscheinungen nach Alkoholgenuß auftreten.

Wenn Sie die Anwendung von Zineryt vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Durch die Alkoholbasis von Zineryt kann manchmal ein brennendes oder juckendes Gefühl, Abschuppung, oder eine leichte Rötung der Haut festgestellt werden. Diese ist temporär.

Eine Überempfindlichkeit und eine allergische Reaktion auf einen Bestandteil von Zineryt sind nicht ausgeschlossen.

Zineryt, das mit dem Applikator auf die Haut aufgetragen und getrocknet ist, verursacht keine Flecken auf der Haut oder auf der Kleidung, die mit den behandelten Hautpartien in Berührung gekommen ist.

Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, wenn bei Ihnen eine schwerwiegende Hautreaktion auftritt: ein roter, schuppiger Ausschlag mit Erhebungen unter der Haut und Blasen (exanthematische Pustulose). Die Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist nicht bekannt (auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Belgien

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz

Avenue Galilée - Galileelaan 5/03	Postfach 97 1000 BRÜSSEL
--------------------------------------	-----------------------------

1210 BRÜSSEL	Madou
--------------	-------

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg

Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél.: (+352) 2478 5592
e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Zineryt aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche (Pulver und Lösungsmittel) nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach der Mischung ist die Lösung 8 Wochen haltbar bei einer Temperatur nicht über 25°C.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Zineryt enthält

- Die Wirkstoffe sind: Erythromycin und Zinkacetatdihydrat
- Die sonstigen Bestandteile sind: Diisopropylsebacat und Ethanol

Wie Zineryt aussieht und Inhalt der Packung

Die Verpackung enthält eine Flasche Pulver, eine Flasche Lösungsmittel und einen Applikator in einer Plastikhalterung. Die Zubereitung der Lotion wird in der Beilage beschrieben.
Nach der Mischung enthält die Flasche mit Applikator 30 ml Zineryt.

Pharmazeutischer Unternehmer

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Deutschland

Hersteller

Astellas Pharma Europe BV
Hogemaat 2
7942 JG Meppel
Niederlande

oder

LEO Pharma A/S

Packungsbeilage

Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Dänemark

Verkaufsabgrenzung
Apothekenpflichtig


Zulassungsnummer
BE126734

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 03/2021.


Zubereitung von Zineryt lotion

1. Die Zinerytverpackung enthält:


- Eine Flasche mit breitem Hals, welches das Pulver enthält (A)
- Eine Flasche mit schmalen Hals, das die Lösungsmittel enthält (B)
- Einen Applikator in einer Plastikhalterung (C)




2. Gießen Sie die Lösungsmittel (B) in die Flasche mit Zineryt-Pulver (A) und schrauben Sie den Deckel wieder auf.




3. Schütteln Sie diese Flasche (A) 1 Minute lang gut durch.



4. Nehmen Sie den Deckel von der Flasche (A) ab und öffnen Sie die Plastikhalterung des Applikators (C). Legen Sie die Halterung mit dem Applicator darin auf den Hals der Flasche (A) und **DRÜCKEN SIE GUT AN.**



5. Entfernen Sie die Plastikhalterung und kontrollieren Sie, ob der Applikator gut und fest sitzt. Drücken Sie nötigenfalls gut an.



6. Die Lösung ist nach der Zubereitung 8 Wochen lang haltbar. Schreiben Sie das Verfalldatum auf das Etikett.

