

Notice : information de l'utilisateur

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml, poudre et solvant pour solution pour application cutanée

érythromycine
acétate de zinc dihydraté

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Zineryt et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Zineryt
3. Comment utiliser Zineryt
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Zineryt
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Zineryt et dans quel cas est-il utilisé ?

Zineryt contient un antibiotique, de l'érythromycine complexé à du zinc dans un solvant composé d'alcool et d'une substance à action émolliente sur la peau.

Indiqué dans le traitement local de l'acné, en particulier, la forme courante des follicules infectés. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Zineryt ?

N'utilisez jamais Zineryt

- si vous êtes allergique à l'érythromycine ou à un autre antibiotique du même groupe, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

- Evitez de mettre Zineryt au contact des yeux ou des muqueuses.
Si tel est cependant le cas, rincer immédiatement avec de l'eau froide ou tiède durant quelques minutes.
- Lorsque vous renversez le contenu du flacon Zineryt, celui-ci peut provoquer des taches sur du textile ou du mobilier.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Autres médicaments et Zineryt ».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Autres médicaments et Zineryt

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Zineryt ne peut être mis en contact sur la peau avec des acides ou des alcalis.

Cependant, Zineryt peut être combiné avec un traitement local de vitamine A-acide ou de benzoylperoxyde ou avec un traitement à la tétracycline par voie orale.

La prudence s'impose lors de l'administration locale simultanée avec des autres produits anti-acné. L'irritation peut s'aggraver, en particulier avec des produits exfoliants.

Zineryt avec des aliments, boissons et de l'alcool

Aucune donnée fournie.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Grossesse

Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez utiliser Zineryt pendant votre grossesse.

Allaitement

L'érythromycine passe en très faibles quantités dans le lait maternel, mais aux doses thérapeutiques de Zineryt, aucun effet sur les bébés allaités n'est attendu. Votre médecin décidera si vous pouvez utiliser Zineryt pendant l'allaitement.

En cas d'utilisation pendant l'allaitement, Zineryt ne doit pas être appliqué sur la poitrine afin d'éviter toute ingestion accidentelle par l'enfant.

Fertilité

Il n'existe aucune donnée connue concernant l'effet de l'utilisation topique (locale) de l'érythromycine sur la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Zinerit n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines.

Zineryt contient de l'éthanol

Ce médicament contient 0,55 mg d'alcool (éthanol) par ml.

Ce médicament peut provoquer une sensation de brûlure sur votre peau si celle-ci est abîmée.

Des concentrations élevées d'éthanol peuvent provoquer des réactions locales graves et une toxicité systémique chez les nouveau-nés prématurés et à terme en raison d'une absorption importante par la peau immature, en particulier sous occlusion.

La solution est inflammable. Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue, de cigarettes allumées, de certains appareils (p. ex. un sèche-cheveux) ou d'autres sources d'inflammation jusqu'à ce que la peau soit complètement sèche.

3. Comment utiliser Zineryt ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

On applique Zineryt 2 x par jour, sur tout le visage ou sur les autres régions affectées (également l'entourage des lésions), de préférence après la toilette.

Zineryt s'administre en tenant le flacon à l'envers, l'applicateur contre la peau, et en le pressant doucement d'avant en arrière. Le débit de Zineryt peut être réglé en augmentant ou en diminuant la pression de l'applicateur contre la peau. Laisser sécher. Une fois sec, Zineryt est invisible et ne laisse aucune trace sur la peau ou tache sur les vêtements qui ont été en contact avec la peau traitée. Après utilisation, ne pas transmettre le flacon à d'autres patients afin d'éviter toute contamination.

Votre médecin vous informera de la durée nécessaire du traitement. La durée habituelle d'un traitement est de 10 à 12 semaines. Dans la plupart des cas, on observe alors une amélioration satisfaisante.

Il faut terminer entièrement le traitement.

Si vous avez utilisé plus de Zineryt que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Zineryt, prenez contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Anti-Poison (070.245.245).

Un surdosage prolongé de Zineryt provoquera probablement des rougeurs et un dessèchement de la peau.

L'absorption de tout le contenu d'un flacon de Zineryt, se traduira surtout par des effets toxiques dus à l'alcool.

Si vous avez oublié d'utiliser Zineryt

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, arrêtez d'utiliser Zineryt et contactez immédiatement votre médecin :

- Hypersensibilité et réaction allergique à l'un des composants de Zineryt. Cela peut survenir chez 1 personne sur 10 000.
- Réaction cutanée grave : éruption cutanée avec vésicules remplies de pus et peau rouge autour (PEAG ou pustulose exanthématique). La fréquence de cet effet indésirable ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

Les autres effets indésirables comprennent :

Effets indésirables peu fréquents (peuvent survenir chez 1 personne sur 100) :

- Prurit (démangeaisons)
- Erythème
- Irritation cutanée
- Sensation de brûlure
- Peau sèche
- Desquamation

Suite à la présence d'alcool dans le Zineryt, on peut parfois ressentir de l'échauffement ou des picotements, ou noter une desquamation ou une légère rougeur de la peau. Ceci est de nature temporaire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance

Site Web : www.notifieruneffetindesirable.be

E-mail : adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Zineryt

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon (poudre et solvant) après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Après mélange, la solution se conserve 8 semaines à une température inférieure à 25 °C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Que contient Zineryt

- Les substances actives sont : l'érythromycine et l'acétate de zinc dihydraté
- Les autres composants sont : le sébacate de diisopropyle et l'éthanol

Aspect de Zineryt et contenu de l'emballage extérieur

Un emballage de Zineryt contient un flacon de poudre, un flacon de solvant et un applicateur dans un étui en plastique. La préparation de la lotion est décrite en annexe.

Après mélange, le flacon avec applicateur contient 30 ml de Zineryt.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Allemagne

Fabricant

Astellas Pharma Europe BV
Hogemaat 2
7942 JG Meppel
Pays-Bas

ou

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danemark

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale

Numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché


BE126734

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2025.


Préparation de la lotion Zineryt

1. L'emballage de Zineryt contient :


- un flacon à large goulot contenant de la poudre (A)
- un flacon à goulot étroit contenant le solvant (B)
- un applicateur dans un étui en plastique (C)




2. Versez le solvant (B) dans le flacon de Zineryt poudre (A) et revissez le bouchon.




3. Agitez immédiatement et soigneusement ce flacon (A) durant 1 minute.



4. Enlevez le bouchon du flacon (A) et ouvrez l'étui en plastique de l'applicateur (C). Apportez l'étui contenant l'applicateur sur le col du flacon (A) et APPUYEZ FERMEMENT.



5. Enlevez l'étui en plastique et contrôlez si l'applicateur est bien enfoncé. Appuyez si nécessaire.



6. La solution ainsi préparée se conserve 8 semaines. Inscrire la date de péremption sur l'étiquette.