

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor cutaan gebruik

erythromycine
zinkacetaat dihydraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Zineryt en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Zineryt en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Zineryt bevat het antibioticum erythromycine in de vorm van een complex met zink in een vloeistof bestaande uit alcohol en een stof met verzachtende werking op de huid.

Aangewezen bij lokale behandeling van acne, meer bepaald de courante vorm van ontstoken puistknobbeltjes.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- u bent allergisch voor erythromycine of andere antibiotica van dezelfde groep of voor een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Zineryt niet in aanraking brengen met de ogen of de slijmvliezen. Indien dit toch gebeurt, dan direkt met koud of lauw water gedurende enkele minuten spoelen.
- de inhoud van de fles Zineryt kan bij morsen vlekken veroorzaken op textiel of meubilair.
- als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere medicijnen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden geweest is.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Zineryt nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zineryt mag op de huid niet in aanraking komen met zuren of alkali.

Zineryt kan wel in combinatie met een lokale toepassing van Vitamine A-zuur, benzoylperoxide of orale toediening van tetracycline worden aangebracht.

Bij gelijktijdige toepassing van andere lokale anti-acneproducten, moet men voorzichtig zijn, aangezien de irritatie kan verergeren, in het bijzonder bij producten die afschilfering bevorderen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Geen gegevens bezorgd

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u zwanger bent. Uw arts beslist of u Zineryt kan gebruiken gedurende de zwangerschap.

Borstvoeding

Erythromycine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, maar bij therapeutische doses van Zineryt worden geen effecten op de baby's die borstvoeding krijgen verwacht. Uw arts beslist of u Zineryt kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Indien gebruikt tijdens de periode van borstvoeding, dan dient Zineryt niet op de borst aangebracht te worden om accidentele inname bij het kind te vermijden.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van topisch erythromycine gebruik op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zineryt heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Zineryt bevat ethanol

Dit middel bevat 0.55 mg alcohol (ethanol) per ml.

Dit middel kan een brandend gevoel geven op uw huid als uw huid beschadigd is.

Hoge concentraties ethanol kunnen bij preterme en à terme neonaten ernstige lokale reacties en systemische toxiciteit veroorzaken door significante absorptie via de immature huid in het bijzonder onder occlusie.

De oplossing is ontvlambaar. Niet gebruiken in de buurt van open vuur, brandende sigaretten, bepaalde apparaten (bijv. een föhn) of andere ontstekingsbronnen totdat de huid volledig droog is.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zineryt 2 x per dag aanbrengen op de huid van het gehele gezicht of op andere aangedane delen (ook op de omgeving van de aangedane plaatsen), bij voorkeur na het wassen.

Zineryt wordt toegediend door het flesje schuin ondersteboven met de applicator tegen de huid te houden en het zachtjes drukkend heen en weer te bewegen. De uitvloeijing van Zineryt kan worden geregeld door vermeerdering of vermindering van de druk van de applicator tegen de huid. Laten drogen. Na opdrogen is Zineryt onzichtbaar en laat het geen vlekken achter op de huid of op kleding die in contact is gekomen met de behandelde huid.

Na gebruik, de fles niet aan andere patiënten doorgeven om besmetting te voorkomen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zineryt moet gebruiken. De gebruikelijke behandelingsduur is 10 à 12 weken. In de meeste gevallen wordt dan een bevredigende verbetering waargenomen. Stop de behandeling niet voortijdig.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Wanneer u te veel van Zineryt heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Een langdurig gebruik van te grote hoeveelheden Zineryt zal vermoedelijk roodheid en uitdroging van de huid tot gevolg hebben.

Bij orale inname van de gehele inhoud van één verpakking Zineryt zullen voornamelijk de toxische verschijnselen na alcohol-inname optreden.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Zineryt en neem meteen contact op met uw arts:

- Overgevoeligheid en allergische reactie op een bestanddeel van Zineryt. Dit kan voorkomen bij 1 op de 10.000 personen.
- Een ernstige huidreactie: een uitslag met blaasjes gevuld met pus met een rode omringende huid (AGEP of exanthemateuze pustulose). De frequentie van deze bijwerking kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Overige bijwerkingen zijn onder andere:

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 personen):

- Pruritus
- Erytheem
- Huid irritatie
- Branderig gevoel
- Droge huid
- Desquamatie

Soms kan, door de alcoholbasis in Zineryt, een branderig of prikkelend gevoel, afschilfering of een lichte roodheid op de huid worden waargenomen. Dit is van tijdelijke aard.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiters staan. U kunt bijwerkingen ook melden via

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaren beneden 25 °C.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles (poeder en oplosmiddel) na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na menging is de oplossing 8 weken houdbaar beneden 25 °C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn erythromycine en zinkacetaat dihydraat
- De andere stoffen in dit medicijn zijn diisopropylsebacaat en ethanol

Hoe ziet Zineryt eruit en wat zit er in een verpakking?

De verpakking bevat een fles poeder, een fles oplosmiddel en een applicator in een plastic houder. De bereiding van de oplossing wordt in bijlage beschreven.

Na bereiding bevat een fles gereed product met applicator, 30 ml Zineryt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Duitsland

Fabrikant

Astellas Pharma Europe BV
Hogemaat 2
7942 JG Meppel
Nederland

of

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Denemarken

Afleveringswijze: Vrij verkrijgbaar.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

BE126734

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 12/2025.

Bereiden van Zineryt lotion

1. De Zineryt verpakking bevat :

- een fles met brede hals die het poeder bevat (A)
- een fles met smalle hals die de oplosmiddel bevat (B)
- een applicator in een plastic houder (C)

-

2. Giet de oplosmiddel (B) in de fles met Zineryt poeder (A) en schroef de dop er opnieuw op.

3. Schud deze fles (A) onmiddellijk goed gedurende 1 minuut.

4. Verwijder de dop van de fles (A) en open de plastic houder van de applicator (C). Breng de houder met de applicator erin op de hals van het flesje (A) en **DRUK GOED AAN**.

5. Verwijder de plastic houder en controleer of de applicator goed vast zit. Druk zo nodig nog aan.

6. De oplossing is na bereiding 8 weken houdbaar. Schrijf de vervaldatum op het etiket.

