

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Pangel 50 mg/g Gel Pangel 100 mg/g Gel

Benzoylperoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Pangel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Pangel beachten?
3. Wie ist Pangel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pangel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST PANGEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Pangel ist ein wässriges Gel zur Behandlung von (Jugend)Pusteln (Akne). Pangel ist ausschließlich zur Anwendung auf der Haut bestimmt und enthält Benzoylperoxid als Wirkstoff.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON PANGEL BEACHTEN?

Pangel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Benzoylperoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Pangel anwenden.

- Kontakt des Produkts mit Augen und Schleimhäuten (beispielsweise in Nase und Mund) vermeiden. Wenn dies versehentlich trotzdem passiert, müssen Sie unmittelbar mit viel Wasser spülen.
- Auf beschädigten Teilen der Haut, beispielsweise auf offenen Wunden, Hautabschürfungen, darf Pangel nicht angewendet werden.
- Gerade vor, während oder kurz nach dem Sonnenbaden darf Pangel nicht angewendet werden.
Während der Behandlung auch keine UV-Lampen benutzen (Sonnenliegen).
- Es ist möglich, dass Sie zu Anfang der Behandlung eine leichte Hautirritation wahrnehmen. Solange diese Irritation mäßig bleibt, deutet diese nicht auf eine Unverträglichkeit oder eine erworbene Überempfindlichkeit gegen das Produkt. Eventuell

können Sie an einer kleinen Fläche der Haut eine Probebehandlung ausführen, um die Reaktion der Haut auf das Produkt auszutesten.

- Wenn im Laufe der Behandlung Nebenwirkungen auftreten, müssen Sie auf eine niedrigere Konzentration umschalten oder die Behandlung abbrechen. Letzteres ist unter anderem erforderlich, wenn Juckreiz und Schwellung auftreten, ob mit Flüssigkeitsabsonderung oder nicht. Siehe auch Punkt 4 „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.
- Ohne ärztlichen Rat darf Pangel nicht zusammen mit anderen lokalen Akneprodukten angewendet werden.
- Ohne ärztlichen Rat nicht während längerer Zeit anwenden.
- Nicht mit gefärbten Geweben oder Haaren in Kontakt bringen, weil Pangel diese entfärben kann.

Kinder

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Wenden Sie bei Babys unter 4 Wochen mit offenen Wunden oder großflächigen Hautverletzungen oder -schäden (wie Verbrennungen) dieses Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an.

Anwendung von Pangel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Momentan liegen über den Einfluss der Anwendung von Pangel während der Schwangerschaft keine Daten vor. Es ist auch nicht bekannt, ob der Stoff Benzoylperoxid in die Muttermilch kommt. Deswegen darf Pangel während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Pangel enthält 50 mg Propylenglycol pro Gramm. Dieser Stoff kann Hautreizungen hervorrufen. Wenden Sie dieses Arzneimittel auf offenen Wunden oder großflächigen Hautverletzungen oder -schäden (wie Verbrennungen) nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an.

3. WIE IST PANGEL ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Im Allgemeinen beginnen Sie die Behandlung mit Pangel 50 mg/g. Später, wenn Sie das Produkt gut vertragen, können Sie auf Pangel 100 mg/g umschalten.

Wenden Sie vorzugsweise Pangel 50 mg/g an:

- bei beginnender Akne von Jugendlichen
- bei Patienten mit einer zarten Haut wie bei Frauen, Kindern, blond- oder rothaarigen Patienten.

Die Haut im Voraus mit reinem Wasser waschen, spülen und sorgfältig abtrocknen. Danach Pangel vorsichtig auf die Haut auftragen (nicht einmassieren). Lassen Sie das Produkt trocknen und waschen Sie sich sorgfältig die Hände.

Zu Anfang der Behandlung tragen Sie das Produkt nur einmal pro Tag auf. Nach einigen Tagen können Sie das Produkt zweimal pro Tag auftragen.

Die Dosierung ist an die Wirkung und Ihre persönliche Verträglichkeit anzupassen. Bei beispielsweise schwerer Irritation, sollen Sie das Produkt weniger häufig anbringen und/oder auf die am wenigsten konzentrierte Form (Pangel 50 mg/g) umschalten.

Wenn Sie eine größere Menge von Pangel angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel von Pangel verwendet oder eingenommen haben, sollen Sie sofort mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antgiftzentrum (070/245.245) Kontakt aufnehmen.

Wenn Sie die Anwendung von Pangel vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Pangel abbrechen

Sie brauchen keine besonderen Maßnahmen zu treffen, wenn Sie die Anwendung von Pangel plötzlich abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen können auftreten:

- Hautröte, brennendes Gefühl, trockene Haut, Juckreiz, Schwellung (ob mit Flüssigkeitsabsonderung oder nicht), Abschuppung und Risse.
- Überempfindlichkeit (Sensibilisierung) und perivaskuläre Lymphozyteninfiltrationen (lokale Anhäufung von Lymphozyten, einem weißen Blutzelltyp, um die Blutgefäße).

Wenn bei Ihnen im Laufe der Behandlung Nebenwirkungen auftreten, müssen Sie auf eine niedrigere Konzentration von Pangel umschalten oder müssen Sie die Behandlung abbrechen. Letzteres ist unter anderem erforderlich, wenn bei Ihnen Juckreiz und Schwellung auftreten, ob mit Flüssigkeitsabsonderung oder nicht.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

1000 BRÜSSEL

Madou

Website: www.notifierunefetindesirable.be

E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden .

5. WIE IST PANGEL AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Pangel enthält

- Der Wirkstoff ist Benzoylperoxid.
Pangel 50 mg/g : 1 g Gel enthält 50 mg Benzoylperoxid.
Pangel 100 mg/g : 1 g Gel enthält 100 mg Benzoylperoxid.
- Die sonstigen Bestandteile sind Carbomer, Lauromacrogol, Propylenglycol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Wie Pangel aussieht und Inhalt der Packung

Wässriges Gel zur äußerlichen Anwendung.

Pangel 50 mg/g: Tube zu 30 g Gel, Tube zu 60 g Gel und Tube zu 100 g Gel

Pangel 100 mg/g: Tube zu 30 g Gel, Tube zu 60 g Gel und Tube zu 100 g Gel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pannoc Chemie NV/SA
Lammerdries 23
B-2250 Olen

Zulassungsnummer

Pangel 50 mg/g: BE121807

Pangel 100 mg/g: BE121816

Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 10/2021.