
Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Minims Natriumfluorescein 20 mg/ml Augentropfen

Natriumfluorescein

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was enthält diese Anleitung?

1. Was ist Minims Natriumfluorescein und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minims Natriumfluorescein beachten?
3. Wie ist Minims Natriumfluorescein anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Minims Natriumfluorescein aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Minims Natriumfluorescein und wofür wird es angewendet?

Minims Natriumfluorescein enthält Fluorescein, eine Substanz die die Oberfläche des Auges färbt. Dieses Arzneimittel wird verwendet um Fremdkörper und Geschwüre der Hornhaut zu erkennen und um zu überprüfen, ob harte Kontaktlinsen richtig positioniert sind.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minims Natriumfluorescein beachten?

Minims Natriumfluorescein darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Natriumfluorescein oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- zum Einsetzen von weichen Kontaktlinsen (Absorption von Natriumfluorescein in der Linse).

Anwendung von Minims Natriumfluorescein zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden. Bei gleichzeitiger Behandlung mit Augentropfen, die einen anderen Wirkstoff enthalten, die Instillationen mindestens 15 Minuten zu beabstanden

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Es gibt nur wenige Daten über die Verwendung von Fluorescein während der Schwangerschaft. Minims Natriumfluorescein sollte nicht während der Schwangerschaft verwendet werden, es sei denn, es ist wirklich notwendig.

Natriumfluorescein wird in der Milch ausgeschieden. Stillen kann als 8 bis 12 Stunden nach der Instillation dieses Arzneimittels angesehen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Nach der Instillation kann dieses Arzneimittel vorübergehend verschwommene Sicht verursachen. Führen Sie keine Fahrzeuge oder bedienen Sie keine Maschinen, bis die Sicht normal ist.

3. Wie ist Minims Natriumfluorescein anzuwenden?

Dieses Arzneimittel ist nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Der Arzt wird Ihnen dieses Arzneimittel in die Augen verabreichen.

Die empfohlene Dosis beträgt ein Tropfen vor dem diagnostischen Test.

Minims sind zur einmaligen Verabreichung bestimmt und sollten sofort nach Gebrauch entsorgt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Minims Natriumfluorescein angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich zu viel von diesen Arzneimitte verabreicht wird, sollte das Auge gründlich mit physiologischer Kochsalzlösung oder, falls nicht vorhanden, mit sauberem Wasser gespült werden. Eine mögliche Gelbfärbung der Bindehaut ist nur vorübergehend. Wenn Sie zu viel Minims Natriumfluorescein gebraucht haben, nehmen Sie sich sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245)

Wenn Sie die Anwendung von Minims Natriumfluorescein vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Lokale Reizung und selten schwere allergische Reaktionen (Schwellung der Zunge, Hypotonie).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über die

BE:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Avenue Galilée - Galileelaan 5/03

1210 BRÜSSEL

Website: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

LU:

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

E-mail: crpv@chru-nancy.fr

Tel.: (+33) 3 83 65 60 85 / 87

oder

Direction de la santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tel.: (+352) 2478 5592

E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link zum Formular:

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Minims Natriumfluorescein aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Nicht über 25°C lagern und in der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Minims Natriumfluorescein enthält

- Der Wirkstoff ist Natriumfluorescein: 20 mg/ml.
- Die sonstige Bestandteile sind gereinigtes Wasser.

Wie Minims Natriumfluorescein aussieht und Inhalt der Packung

Minims und Kappe aus Polypropylen, einzeln in einem Polypropylenbeutel verpackt. Schachtel mit 20 Minims von 0,50 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irland

Hersteller

Laboratoire Chauvin

ZI Ripotier Haut

007200 Aubenas

Frankreich

Zulassungsnummer

BE097045

Abgabe

Verschreibungspflichtig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 04/2022