

## **B. BIJSLUITER**

**BIJSLUITER**  
**Parpumag 30%**  
**Oplossing voor injectie**

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

**HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN:**

Dechra Veterinary Products NV  
Achterstenhoek 48  
2275 Lille  
België

**FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE:**

Eurovet Animal Health BV  
Handelsweg 25  
5531 AE Bladel  
Nederland

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Parpumag 30% oplossing voor injectie  
Calcii gluconas / magnesii chloridum

**3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN**

1 ml bevat:

Werkzame bestanddelen:

Calcii gluconas	298 mg
Magnesii chloridum	33,3 mg

**4. INDICATIE**

Hypocalcemie bij paard, rund, schaap en varken.

**5. CONTRA-INDICATIES**

Calcium niet gebruiken bij dieren met ventriculaire fibrillatie of bij hypercalcemie.

**6. BIJWERKINGEN**

Geen bekend.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**7. DOELDIERSOORTEN**

Paard, rund, schaap en varken.

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEGEN EN WIJZE VAN GEBRUIK**

Merrie: 5 ml per 10 kg lichaamsgewicht, intraveneus.  
Koe, ooi: 10 ml per 10 kg lichaamsgewicht, intraveneus.  
Zeug: 10 ml per 10 kg lichaamsgewicht, intraveneus.

De dosering mag, indien nodig, herhaald worden na 6 tot 8 uur.  
Bij het rund en het schaap kan het diergeneesmiddel ook subcutaan, verdeeld over verschillende plaatsen, worden toegediend.

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

**Geen.**

## **10. WACHTTIJDEN**

Vlees en slachtafval: nul dagen.  
Melk: nul dagen.

## **11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.  
Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen licht.  
Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken.  
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)**

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:  
Gezien de hoge concentratie dient het diergeneesmiddel langzaam intraveneus en op lichaamstemperatuur te worden toegediend.

Dracht:  
Kan tijdens de dracht worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:  
Verhoging van de bloedcalciumspiegel versterkt de werking van digitalisglycosiden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):  
Te snelle injectie van calciumborogluconaat kan aanleiding geven tot acute toxiciteit, gekenmerkt door cardiale aritmie, apathie met laterale decubitus. Milde hypercalcemie is reversiebel zonder verdere interventie. Ernstige hypercalcemie wordt behandeld met een intraveneuze fysiologische zoutoplossing en furosemide om de renale calciumexcretie te bevorderen.

Onverenigbaarheden:  
Niet vermengen met oxytetracycline om wille van de vorming van chelaten.

## **13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

**14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

Oktober 2019

**15. OVERIGE INFORMATIE**

Verpakkingsgrootten: 450 ml, 500 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Op diergeneeskundig voorschrift.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

BE-V108141