

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### Daktarin 20 mg/g Gel zum Einnehmen

Miconazol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Daktarin und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Daktarin beachten?
3. Wie ist Daktarin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Daktarin aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Daktarin und wofür wird es angewendet?

Daktarin Gel zum Einnehmen enthält Miconazol. Das ist die Substanz, die das Daktarin Gel wirksam macht. Miconazol tötet Pilze.

Daktarin Gel wird zur Behandlung von Pilzinfektionen in Mund, Rachen, Speiseröhre, Magen oder Darm bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Monaten angewendet. Bevor Sie Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Monaten mit Daktarin Gel zum Einnehmen behandeln, müssen Sie sicher sein, dass sie keine Probleme beim Schlucken haben (siehe „2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Daktarin beachten?“).

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Daktarin beachten?

##### **Daktarin darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Miconazol, verwandte pilzabtötende Medikamente oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Diese Überempfindlichkeit ist an Hautausschlag, Juckreiz, Kurzatmigkeit und/oder einem geschwollenen Gesicht zu erkennen. In diesem Fall brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wegen der Erstickungsgefahr darf Daktarin bei Säuglingen unter 4 Monaten sowie bei Säuglingen unter 5 - 6 Monaten nicht angewendet werden, wenn der Säugling zu früh geboren wurde oder Schluckprobleme aufweist (siehe auch Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“).
- wenn Sie an einer Lebererkrankung leiden.
- wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, es sei denn, Ihr Arzt oder Apotheker hat Sie darüber beraten.

Die Wirkungen und/oder Nebenwirkungen vieler Arzneimittel können verstärkt oder abgeschwächt werden, wenn sie gleichzeitig mit Daktarin eingenommen werden.

Beispiele von Arzneimittel, die niemals eingenommen werden dürfen, wenn Sie Daktarin Gel zum Einnehmen anwenden:

- bestimmte Arzneimittel gegen Allergie, insbesondere Terfenadin, Astemizol und Mizolastin;
- Cisaprid, ein Arzneimittel bei bestimmten Verdauungsstörungen;
- bestimmte Arzneimittel, die den Cholesterinspiegel senken, wie zum Beispiel Simvastatin und Lovastatin;
- die Schlafmittel Midazolam (oral verabreicht) und Triazolam sowie Arzneimittel gegen Angstzustände (Tranquilizer);
- Pimozid und Sertindol, Arzneimittel bei bestimmten psychotischen Störungen;
- Halofantrin, ein Arzneimittel gegen Malaria;
- bestimmte Arzneimittel zur Behandlung von Migräne, wie Mutterkornalkaloide (Cafergot®);
- bestimmte Arzneimittel zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, und zwar Bepridil, Chinidin und Dofetilid.

Wenn Sie andere Arzneimittel anwenden oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie mit der Anwendung von Daktarin beginnen. Siehe unter „Anwendung von Daktarin zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Daktarin anwenden.

Daktarin kann schwere allergische Reaktionen verursachen. Sie müssen die Anzeichen einer allergischen Reaktion erkennen können, wenn Sie Daktarin anwenden. Siehe auch Abschnitt „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.

Wenn Sie orale gerinnungshemmende Mittel wie Warfarin einnehmen, beenden Sie die Anwendung von Daktarin unverzüglich und holen Sie den Rat Ihres Arztes oder Apothekers ein, wenn bei Ihnen während der Behandlung mit Daktarin unerwartete Blutungen oder Blutergüsse, Nasenbluten, Bluthusten, Blut im Urin, schwarzer teerartiger Stuhl oder kaffeesatzartiges Erbrechen auftreten. Während der Behandlung mit Daktarin ist eine engmaschige Überwachung der International Normalized Ratio (INR)-Werte unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal erforderlich.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Daktarin Säuglingen und Kleinkindern verabreicht wird. Daktarin Gel zum Einnehmen ist klebrig. Dadurch wird dafür gesorgt, dass das Mittel so lange wie möglich im Mund bleibt. Insbesondere Säuglinge und Kleinkinder (im Alter von 4 Monaten bis 2 Jahren) können sich jedoch verschlucken, wenn das Gel nicht richtig verabreicht wird. Achten Sie daher gut auf eine korrekte Verabreichung und vermeiden Sie durch folgende Maßnahmen, dass das Gel den Rachen verschließt:

- Verteilen Sie jede Dosis in kleinere Portionen: Tragen Sie nie die ganze Dosis auf einmal im Mund des Kindes auf;
- Tragen Sie das Gel nach Empfehlung Ihres Arztes oder Apothekers mit einem sauberen Finger in den betroffenen Bereichen im Mund (weiße Flecken) auf;
- Tragen Sie aufgrund der möglichen Erstickengefahr nie eine große Portion Gel hinten im Rachen auf;
- Wenn Sie stillen, dürfen Sie das Gel nicht auf die Brustwarze auftragen, um das Baby zu behandeln.

Nach Verabreichung des Gels halten Sie das Kind am besten in aufrechter Haltung. Beobachten Sie das Kind im Hinblick auf ein mögliches Ersticken.

Die untere Altersgrenze muss bei Säuglingen, die zu früh geboren wurden (Frühgeborene), oder bei Säuglingen mit einer langsamen Entwicklung des Nervensystems auf ein Alter von 5 - 6 Monaten erhöht werden.

#### **Anwendung von Daktarin zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Dies gilt auch für nicht rezeptpflichtige Medikamente.

Einige Arzneimittel dürfen nämlich nicht zusammen mit Daktarin eingenommen werden und wenn bestimmte Arzneimittel gleichzeitig eingenommen werden, können Anpassungen notwendig sein (beispielsweise Anpassungen der Dosis) (siehe auch „Daktarin darf nicht angewendet werden“).

Die Kombination mit bestimmten anderen Arzneimitteln kann zusätzliche Überwachung bezüglich der Wirkung des Arzneimittels und der Nebenwirkungen erfordern, oder eine Veränderung der Dosis von Daktarin oder des anderen Arzneimittels erforderlich machen.

Beispiele:

- Orale Antikoagulanzen (Arzneimittel, die zur Blutverdünnung angewendet werden), wie z. B. Warfarin, können von Daktarin gel beeinflusst werden.
- bestimmte Arzneimittel, die zur Behandlung von Diabetes über den Mund eingenommen werden wie Sulfonylharnstoff-Derivate;
- bestimmte Arzneimittel gegen AIDS, wie HIV-Proteasehemmer, wie Saquinavir;
- Phenytoin und Carbamazepin, Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie;
- bestimmte Arzneimittel, die bei der Behandlung von Krebs angewendet werden, wie Vinca-Alkaloide, Busulfan und Docetaxel;
- bestimmte Arzneimittel für das Herz und die Blutgefäße (Calciumantagonisten wie Disopyramid, Dihydropyridine und Verapamil);
- Ciclosporin A, Tacrolimus und Sirolimus (auch bekannt als Rapamycin), die normalerweise nach einer Organtransplantation verabreicht werden;
- bestimmte Anästhetika, die in Krankenhäusern angewendet werden, wie Alfentanil;
- Sildenafil, ein Arzneimittel gegen Erektionsstörungen;
- bestimmte Schlafmittel und Arzneimittel gegen Angstzustände (Tranquilizer) wie Alprazolam, Brotizolam, Midazolam (in Form der Injektion) und Buspiron;
- Arzneimittel zur Behandlung von Tuberkulose wie Rifabutin;
- Methylprednisolon, ein Arzneimittel gegen Entzündungen, das über den Mund oder als Injektion verabreicht wird;
- Trimetrexat, ein Arzneimittel zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenentzündung;
- Ebastin, ein Arzneimittel gegen Allergie;
- Reboxetin, ein Arzneimittel zur Behandlung von Depression.

#### **Anwendung von Daktarin zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Nicht zutreffend.

#### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### *Schwangerschaft*

Wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Ihr Arzt entscheidet, ob Daktarin während der Schwangerschaft angewendet werden darf.

### *Stillzeit*

Es sind keine Angaben über den möglichen Übergang des Arzneimittels in die Muttermilch bekannt. Auch für die Anwendung während der Stillzeit müssen Sie vorab Ihren Arzt um Rat fragen. Ihr Arzt entscheidet, ob Daktarin während der Stillzeit angewendet werden darf. Wenn Sie stillen, dürfen Sie das Gel nicht auf die Brustwarze auftragen, um Ihr Baby zu behandeln.

### *Fortpflanzungsfähigkeit*

Es ist nicht bekannt, ob Daktarin die Fortpflanzungsfähigkeit von Menschen beeinflusst.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Daktarin hat keinen Einfluss auf die Wachsamkeit und die Verkehrstüchtigkeit.

### **Daktarin Gel zum Einnehmen enthält Natrium**

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosiereinheit, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

### **Daktarin Gel zum Einnehmen enthält Ethanol**

Dieses Arzneimittel enthält 7,85 mg Alkohol (Ethanol) pro 1000 mg, entsprechend 0,00785 mg/mg (0,785 % w/w). Die Menge in 1000 mg dieses Arzneimittels entspricht weniger als 1 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

### **Daktarin Gel zum Einnehmen enthält Orangengeschmack und Kakao-Aroma**

Dieses Arzneimittel enthält Orangengeschmack (beinhaltet: Citral, Citronellol, Linalool, Geraniol, D-Limonen) und Kakao-Aroma (beinhaltet: Benzylalkohol, Benzylbenzoat) die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Dieses Arzneimittel enthält 17 Pikogramm Benzylbenzoat pro Höchstdosis für einen Erwachsenen (10 ml Gel zum Einnehmen). Benzylbenzoat kann leichte lokale Reizungen hervorrufen.

## **3. Wie ist Daktarin anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Daktarin Gel zum Einnehmen kann bei Säuglingen und Kleinkindern ab 4 Monaten sowie Kindern und Erwachsenen, die Schwierigkeiten mit dem Schlucken von Tabletten haben, angewendet werden.

### **Die empfohlene Dosis zur Behandlung von Infektionen im Mund oder Rachen beträgt:**

*Säuglinge und Kleinkinder* (von 4 Monaten bis 2 Jahre): ¼ Messlöffel (= 1,25 ml) Gel, 4 Mal täglich nach den Mahlzeiten.

Tragen Sie das Gel jeweils mit einem sauberen Finger in kleinen Portionen auf. Aufgrund der möglichen Erstickungsgefahr darf das Gel nicht hinten im Rachen aufgetragen werden (siehe auch Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“).

*Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren und älter*: ½ Messlöffel (= 2,5 ml) Gel, 4 Mal täglich nach den Mahlzeiten.

### **Die empfohlene Dosis zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Trakts mit oder ohne Infektionen des Mundes oder Rachens beträgt:**

Die Dosis hängt vom Körpergewicht ab. Wenden Sie nicht mehr als 2 Messlöffel (10 ml) Gel 4 Mal täglich an.

- Körpergewicht bis 11,9 Kilogramm: ¼ Messlöffel (1,25 ml) Gel, 4 Mal täglich;
- Körpergewicht von 12 bis 24,9 Kilogramm: ½ Messlöffel (2,5 ml) Gel, 4 Mal täglich;
- Körpergewicht von 25 bis 36,9 Kilogramm: 1 Messlöffel (5 ml) Gel, 4 Mal täglich;

- Körpergewicht von 37 bis 49,9 Kilogramm: 1 ½ Messlöffel (7,5 ml) Gel, 4 Mal täglich;
- Körpergewicht 50 Kilogramm und mehr: 2 Messlöffel (10 ml) Gel, 4 Mal täglich.

Die Behandlung muss nach Abklingen aller Symptome noch mindestens eine Woche fortgesetzt werden.

Wenden Sie das Gel zum Einnehmen nach den Mahlzeiten an.

Das Gel zum Einnehmen wird so lange wie möglich im Mund behalten und dann geschluckt. Das Arzneimittel bleibt dadurch länger mit dem Mund in Kontakt. Bei Säuglingen wird der Kontakt dadurch gewährleistet, dass das Gel von selbst innen an den Wangen haftet.

Wenn Sie ein Gebiss tragen, nehmen Sie dieses beim Schlafengehen am besten heraus und putzen es mit dem Gel. So vermeiden Sie, dass Ihr Gebiss auch infiziert wird.

#### ÖFFNEN DER TUBE

- Schrauben Sie die Verschlusskappe ab;
- Drücken Sie die Verschlusskappe umgekehrt wieder auf die Tube, bis die scharfe Spitze die Tube durchsticht;
- Die Tube ist nun gebrauchsfertig.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Daktarin angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Daktarin angewendet oder eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245 245).

Wenn Sie zu viel Daktarin eingenommen haben, können Sie an Erbrechen und Durchfall leiden. Um sicherzustellen, dass es keine Probleme gibt, müssen Sie sich an Ihren Arzt wenden.

#### **Informationen für den Arzt bei Überdosierung**

- Die Behandlung ist symptomatisch und unterstützend.
- Es gibt kein spezifisches Antidot.
- Bei versehentlichem Verschlucken kann eine geeignete Methode zur Magenspülung in Erwägung gezogen werden, falls das für notwendig gehalten wird.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Daktarin vergessen haben**

Nicht zutreffend.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Daktarin abbrechen**

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Nebenwirkungen sind wie folgt unterteilt:

- Sehr häufig (bei mehr als 1 von 10 Anwendern)
- Häufig (bei 1 bis 10 von 100 Anwendern)
- Gelegentlich (bei 1 bis 10 von 1 000 Anwendern)
- Selten (bei 1 bis 10 von 10 000 Anwendern)
- Sehr selten (bei weniger als 1 von 10 000 Anwendern)
- Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Die häufigsten Nebenwirkungen (Häufigkeit: Häufig) beim Erwachsenen sind:

- Übelkeit
- unangenehmer Geschmack des Produkts
- Brennen im Mund
- Mundtrockenheit
- Geschmacksverlust oder Geschmacksveränderungen
- Erbrechen.

Die häufigsten Nebenwirkungen bei Kindern sind:

- Übelkeit
- Erbrechen
- Aufstoßen.

Folgende Nebenwirkungen wurden mit nicht bekannter Häufigkeit nach der Markteinführung festgestellt:

- Überempfindlichkeit (Allergie), erkennbar an Juckreiz, Hautausschlag, Nesselsucht, Kurzatmigkeit und/oder Schwellung des Gesichts. Schwere allergische Reaktionen: wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, beenden Sie die Anwendung von Daktarin und kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt: Schwellungen von Gesicht, Zunge oder Rachen; Schwierigkeiten beim Schlucken; Nesselsucht und Atembeschwerden (Angioödem, anaphylaktische Reaktionen).
- In allen Fällen, wo eine Allergie vermutet wird, müssen Sie die Einnahme von Daktarin abbrechen und Ihren Arzt oder Apotheker um Rat fragen.
- Erstickung: wenn Daktarin den Rachen verstopft, können Säuglinge und Kleinkinder daran ersticken.
- Durchfall
- Mundentzündung
- Zungenverfärbung
- Leberentzündung, die eines oder mehrere dieser Symptome verursachen kann: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Bauchschmerzen, Gelbsucht, sehr dunkler Urin und bleicher Stuhlgang. Brechen Sie die Einnahme von Daktarin ab und kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt.
- Schwere Hautreaktion mit ausgebreitetem Ausschlag mit sich schälender Haut und Blasen im Mund, Augen und Genitalien (Lyell-Syndrom oder Stevens-Johnson Syndrom).
- Lebensbedrohlicher Hautausschlag mit Blasenbildung und Abschälen der Haut in einem großen Bereich des Körpers (toxische epidermale Nekrolyse).
- Hautausschlag
- Plötzliches Auftreten von mit Eiter gefüllten Bläschen am Körper.
- Schwerer Hautausschlag, der mit Fieber, Müdigkeit, Schwellung von Gesicht oder Lymphknoten, Zunahme der Anzahl von eosinophilen Zellen (eine bestimmte Art von weißen Blutzellen), Auswirkungen auf Leber, Nieren oder Lunge (eine Reaktion, die DRESS genannt wird) einhergehen kann.
- Hautausschlag mit Eiter gefüllten Blasen/Pusteln (Akute generalisierte exanthematöse Pustulose).
- Eine allergische Hautreaktion, die runde oder ovale rote Flecken und Schwellung der Haut, Blasenbildung und Juckreiz umfassen kann (fixes Arzneiexanthem). Es kann zu einer Dunkelfärbung der Haut in den betroffenen Bereichen kommen, die auch nach der Abheilung bestehen bleiben kann. Ein fixes Arzneiexanthem tritt in der Regel wieder an derselben Stelle bzw. denselben Stellen auf, wenn das Arzneimittel erneut eingenommen wird.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen:

### **Belgien**

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be  
Abteilung Vigilanz:  
Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)  
e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

### **Luxemburg**

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : [www.guichet.lu/pharmakovigilanz](http://www.guichet.lu/pharmakovigilanz)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Daktarin aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden (Monat / Jahr). Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Daktarin enthält**

- Der Wirkstoff in diesem Arzneimittel ist: Miconazol. Jedes Gramm enthält 20 mg Miconazol.
- Die sonstigen Bestandteile in diesem Arzneimittel sind: gereinigtes Wasser, Kartoffelstärke vorverkleistert, Ethanol 96%, Polysorbat 20 (E432), Saccharin-Natrium (E954), Kakao-Aroma (enthält Ethanol), Orangengeschmack und Glycerol (E422) (Siehe auch Abschnitt 2: „Daktarin Gel zum Einnehmen enthält...“)

### **Wie Daktarin aussieht und Inhalt der Packung**

Tube mit 40 g oder 80 g Gel zum Einnehmen (mit Messlöffel von 5 ml = 124 mg Miconazol).

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer:  
Kenvue Belgium NV  
Michel De Braeystraat 52  
2000 Antwerpen

Hersteller:  
Janssen Pharmaceutica NV  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse

Kenvue Belgium NV  
Michel De Braeystraat 52

2000 Antwerpen  
Belgien

**Zulassungsnummer**

BE: BE108087

LU: 2002116950

**Verkaufsabgrenzung**

Verschreibungspflichtig.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 02/2026.**

V7.0\_b5.0