

B. BIJSLUITER

BIJSLUITER**Dog-Eczema, emulsie voor cutaan gebruik bij de hond****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

BASE | Base Pharmaceuticals B.V.
Pharmaceuticals | Harderwijkerweg 459
8077RH Hulshorst
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KELA N.V.
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
België

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

DOG-ECZEMA, emulsie voor cutaan gebruik bij de hond
Prednisolonum - Neomycini sulfas - Sulfur precipitatum - Zinci oxydum

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

1 g bevat: Prednisolonum 1 mg - Neomycini sulfas 5000 I.U. - Sulfur precipitatum 5 mg - Zinci oxydum 30 mg - Methylis parahydroxybenzoas – Excipiens q.s.

4. INDICATIES

Dit diergeneesmiddel is aangewezen bij de behandeling van lokale dermatitis geassocieerd met bacteriële infecties, gevoelig aan neomycine.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij dieren jonger dan 6 maanden.
Niet gebruiken in geval van neomycine resistentie.

6. BIJWERKINGEN

Het diergeneesmiddel bevat prednisolone. Langdurig gebruik kan huidatrofie veroorzaken. Overgevoelighedsreacties kunnen uitzonderlijk voorkomen.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORTEN

Hond

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.

De flacon goed schudden vóór gebruik.
Vooraf dient de aangetaste huid te worden geschoren en met vloeibare zeep gereinigd.
Vervolgens tweemaal per dag het diergeneesmiddel op de letsels aanbrengen.
De behandeling voortzetten gedurende 7 opeenvolgende dagen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Het is aangeraden om voor gebruik de neomycine-gevoeligheid van de kiemen te testen.
Het diergeneesmiddel niet gebruiken in geval van extensieve letsels.

10. WACHTTIJDEN

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in een koelkast (2°C-8°C).
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De flacon goed schudden vóór gebruik.
Vooraf dient de aangetaste huid te worden geschoren en met vloeibare zeep gereinigd.
De aanwezigheid van een onderliggende oorzaak moet onderzocht en behandeld worden.
Het is aangeraden om voor gebruik de neomycinegevoeligheid van de kiemen te testen.
Het diergeneesmiddel niet gebruiken in geval van extensieve letsels.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen, moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Na gebruik van het diergeneesmiddel, de handen wassen.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Dracht en lactatie:

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelende dierenarts, daar absorptie van het diergeneesmiddel, voornamelijk in geval van grote oppervlakten en langdurig gebruik, kan optreden.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Geen bekend.

Onverenigbaarheden:

Geen bekend.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Juli 2020

15. OVERIGE INFORMATIE

Op diergeneeskundig voorschrift.

BE-V097377