

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Noscafex 15 mg Tabletten

Noscapin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 oder 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Noscafex 15 mg Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Noscafex 15 mg Tabletten beachten?
3. Wie ist Noscafex 15 mg Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Noscafex 15 mg Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Noscafex 15 mg Tabletten und wofür wird es angewendet?

Noscafex wird eingenommen für die symptomatische Behandlung von einem trockenen Reizhusten ohne Schleim (nicht-produktiven Husten).

Wenn Sie sich nach 4 oder 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Noscafex 15 mg Tabletten beachten?

Noscafex darf nicht eingenommen werden

- Wenn Sie allergisch gegen Noscapin oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Ateminsuffizienz jeden Grades.
- Asthmatischer Husten.
- Kinder unter 6 Jahre.
- Bei Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Noscafex einnehmen.

- Der produktive Husten, ein fundamentaler Faktor der bronchopulmonalen Verteidigung, soll nicht unterdrückt werden. Vor der Anwendung muss man sich der Ursachen vergewissern und sich davon überzeugen, dass keine entsprechende Behandlung erforderlich ist.
- Betagte Personen können empfindlicher sein. Dosisabbau kann erforderlich sein. Kontaktieren Sie Ihren Arzt für diese.

Wenn Sie noch andere Arzneimittel einnehmen, bitte lesen Sie auch die Rubrik "Einnahme von Noscafex zusammen mit anderen Arzneimitteln".

Kinder

Noscafex nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahre.

Einnahme von Noscafex zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

- Nicht zusammen gebrauchen mit Beruhigungsmitteln (Sedativa).
- Nicht zusammen gebrauchen mit Warfarine, ein Arzneimittel zur Hemmung der Blutgerinnung.

Einnahme von Noscafex zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Noscafex nicht zusammen gebrauchen mit Alkohol.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wie Vorsichtsmaßnahme sollte Noscafex nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit eingenommen werden weil Risiken für die Entwicklung der Frucht bestehen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

- Dieses Arzneimittel ist schlafferregend. Es ist nicht angewiesen Fahrzeuge zu lenken oder Maschinen zu bedienen, wo erhöhte Wachsamkeit gefordert ist.
- Sedativa und Alkohol können die Schläfrigkeit verstärken. Es ist dann nicht angewiesen Fahrzeuge zu lenken oder Maschinen zu bedienen, wo erhöhte Wachsamkeit gefordert ist.
- Selten können leichte Schwindel und Stumpfsinn auftreten, siehe auch Rubrik "4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?".

Noscafex enthält Aspartam (E951) als Quelle für Phenylalanin und kann schädlich sein wenn Sie eine Phenylketonurie haben.

3. Wie ist Noscafex 15 mg Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene: 1 Tablette pro Einnahme, 5 bis 6 mal pro Tag (max. 6 Tabl. pro Tag).

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Kinder 6 bis 12 Jahre: 1 Tablette pro Einnahme, 3 bis 4 mal pro Tag (max. 4 Tabl. pro Tag).

Kinder ab 12 Jahre: 1 Tablette pro Einnahme, 4 bis 5 mal pro Tag (max. 5 Tabl. pro Tag).

- Die Anfangsdosis so niedrig wie möglich halten und nachher erhöhen.
- Falls den Husten nicht verbessert, den Arzt befragen.
- Die Tabletten werden am besten vor der Einnahme gekaut.
- Wenn keine Besserung eintritt nach vier oder fünf Tagen, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Noscafex eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Noscafex eingenommen haben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antigiftzentrum (**070/245.245**) in Verbindung.

- Nach Einnahme und Absorption einer massiven Dosis: Atemunterdrückung (Atemdepression), Krämpfe (Konvulsionen), Koma.

Behandlung:

- Möglichst den Magen aufpumpen, der Gebrauch von Aktivkohle ist zu empfehlen.
- Bei Bestätigung von Vergiftung (Intoxikation) ist eine Hospitalaufnahme erforderlich.
- Im Falle von Atemdepression ist es empfohlen das Gegengift (Antidot) Naloxone in eine Vene (i.v.), in einen Muskel (i.m.) oder unter die Haut (s.c.) zu verabreichen.
 - Bei Erwachsenen: Anfangsdosis 0,4 mg: falls nicht ausreichend die Dosis jede zwei bis drei Minuten wiederholen bis zu drei Injektionen.
 - Bei Kindern: 0,01 mg/kg Körpergewicht genau so verfahren wie Erwachsenen.
- Im Falle von Konvulsionen: Benzodiazepine (i.v. für Erwachsene und grösse Kinder, rektal für kleine Kinder).

Wenn Sie die Einnahme von Noscafex vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Noscafex abbrechen

Nur anzuwenden im Falle von Symptomen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Eine erhöhte Dosis kann Blutdrucksenkung hervorrufen.

Verwendung von Noscapin bei Tieren kann Histamin freisetzen. Allergische Nasenschleimhautentzündung und allergische Hautreaktionen mit Eruption und Jucken können auftreten.

Dämlichkeit, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Schläfrigkeit.

Eine erhöhte Dosis kann das zusammenziehen von Lungenbläschen hervorrufen.

Akute Brustschmerzen wurden festgestellt.

Es können Fälle von Brechreiz und Erbrechen auftreten.

Konstipation kann auftreten.

Allergische Hautreaktionen mit Eruption und Jucken können auftreten.

Akute Bauchschmerzen wurden festgestellt.

Konjunktivitis.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, Avenue Galilée – Galileelaan 5/03, 1210 Brüssel, Website: www.notifierunefetindesirable.be, E-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Noscafex 15 mg Tabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Bei Raumtemperatur (15°C - 25°C) in der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach EXP. angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Noscafex enthält

- Der Wirkstoff ist: Noscapin 15 mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Mannitol (E421), Aspartam (E951), Minzöl, Mikrokristalline Zellulose (E460), Anhydriisch Kolloidal Siliziumdioxid, Anisöl und Magnesiumstearat (Siehe Abschnitt 2 "Noscafex enthält Aspartam (E951)").

Wie Noscafex aussieht und Inhalt der Packung

Weisse, runde Tabletten zum Einnehmen.

20 Tabletten in Blisterpackung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Kela Pharma nv
Sint Lenaartseweg 48
B-2320 Hoogstraten

Hersteller

KELA Laboratoria NV
Sint Lenaartseweg 48
B-2320 Hoogstraten

Zulassungsnummer

BE072825

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 08/2021.