

Module 1.3.1.3 – BE – FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinx bvba	Page 1 de 4

Notice: information de l'utilisateur

Trihistalex crème

Chlorhydrate de diphenhydramine - Chlorhydrate de cinchocaïne - Nicotinamide

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Trihistalex crème et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Trihistalex crème?
3. Comment utiliser Trihistalex crème?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Trihistalex crème?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Trihistalex crème et dans quel cas est-il utilisé?

Crème pour l'usage externe possédant des propriétés antiallergiques, analgésiques et antiprurigineuses.

Trihistalex peut être utile dans le traitement de:

- Calmer localement une douleur.
- Traitement symptomatique des affections de nature allergique tels que les démangeaisons, l'urticaire, les réactions solaires, le prurit dans la région anogénitale.
- Réactions cutanées provoquées par des piqûres d'insectes ou par contact avec des animaux p.ex. les méduses.

Si les démangeaisons ne sont pas d'origine allergique, il se peut que la préparation ne soit pas efficace.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Trihistalex crème?

N'utilisez jamais Trihistalex crème

- si vous êtes allergique aux principes actifs ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Trihistalex crème.

Module 1.3.1.3 – BE – FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinx bvba	Page 2 de 4

- Si les symptômes sont causés par une allergie ou une hypersensibilité qui se produit à la suite d'un contact avec une substance, le contact avec cette substance doit être évitée.

Autres médicaments et Trihistalex crème

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Trihistalex crème avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Pas de données fournies.

Trihistalex crème contient du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle. Ceci peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Trihistalex crème contient de l'alcool cétylique et de la graisse de laine. Ceci peut provoquer des réactions cutanées locales (p.ex. dermatite de contact).

3. Comment utiliser Trihistalex crème?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Appliquer la crème en couche mince sur la partie affectée. Ce traitement peut être répété plusieurs fois par jour.

Si vous avez utilisé plus de Trihistalex crème que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Trihistalex crème, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (**070/245.245**).

Si vous oubliez d'utiliser Trihistalex crème

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Trihistalex crème

Pas de données fournies.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Une hypersensibilité à l'un des constituants de la préparation peut survenir.

Module 1.3.1.3 – BE – FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinx bvba	Page 3 de 4

- Une réaction d'hypersensibilité peut se produire, si, après application de la préparation, l'on expose au soleil la surface cutanée traitée. Il s'agit d'une réaction appelée "photosensibilité" ou "photosensibilisation". Dans ce cas, il y a lieu de protéger du soleil, la surface traitée.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Trihistalex crème?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à température ambiante (15°C-25°C) dans l'emballage original.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Trihistalex crème

- Les substances actives sont: chlorhydrate de diphenhydramine 2 g - cinchocaïne chlorhydrate 1 g - nicotinamide 2 g.
- Les autres composants sont parahydroxybenzoate de méthyle - parahydroxybenzoate de propyle - dioxyde de titane - menthol - cetaceum - alcool cétylique - glycérol - polysorbate 20 - sorbitane mono-oléate - onguent d'alcools de graisse de laine - eau purifiée pour 100 g.

Qu'est-ce que Trihistalex crème et contenu de l'emballage extérieur

Trihistalex est une crème, huile dans l'eau. Chaque tube contient 20 g.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Pharinex bvba

Hoge Haar 24

B-2970 Schilde

Fabricant

Module 1.3.1.3 – BE – FR	NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Pharinex bvba Hoge Haar 24 2970 Schilde	Trihistalex crème
IAin A.1: Wijziging adres Pharinx bvba	Page 4 de 4

KELA Laboratoria NV
Sint-Lenaertseweg 48
B-2320 HOOGST RATEN

Numéro d'Autorisation de mise sur le marché
BE034212

Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2018.