

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Terra-Cortril 30 mg/g + 10 mg/g
Salbe

(Oxytetracyclin-Hydrocortison)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Terra-Cortril und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Terra-Cortril beachten?
3. Wie ist Terra-Cortril anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Terra-Cortril aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Terra-Cortril und wofür wird es angewendet?

- Terra-Cortril ist eine Salbe zur Anwendung auf der Haut.
- Terra-Cortril Salbe ist eine Zusammensetzung aus einem Antibiotikum der Gruppe der Tetracycline und aus Hydrocortison.
- Terra-Cortril ist bei folgenden Erkrankungen angezeigt:
 - Infektionen der Haut mit starker Entzündung, einschließlich Verbrennungen und infizierter Wunden
 - Infektionen als Komplikation verschiedener allergischer Reaktionen
 - Infektionen als Komplikation von Kontaktekzemen durch den Kontakt mit Pflanzen, Arzneimitteln, Kosmetikprodukten, Kleidung usw.

Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Terra-Cortril beachten?**Terra-Cortril darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Oxytetracyclin, Hydrocortison oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- wenn Sie an akutem Herpes leiden, Windpocken haben oder auf eine Pockenimpfung reagieren,
- wenn Sie an einer Hauttuberkulose leiden,
- bei Pilzinfektionen der Haut,
- bei purulenten (eitrigen), bakteriellen Infektionen,
- bei Jugendakne oder Rosazea,
- bei Hautschwund, Wunden oder Hautgeschwüren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Terra-Cortril anwenden.

- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Sie das Arzneimittel nicht gut vertragen, zum Beispiel bei Hautreizungen oder Sekundärinfektionen (siehe „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“) und benachrichtigen Sie Ihren Arzt.
- Terra-Cortril Salbe darf nicht zur Behandlung einer Augenerkrankung angewendet werden.
- Terra-Cortril Salbe darf nicht grossflächig oder auf verletzter Haut angewendet werden. Um Vorsicht wird vor allem bei Kindern gebeten.
- Wenn bei Ihnen verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Terra-Cortril beenden, kann es zu Entzugserscheinungen kommen, insbesondere wenn Sie das Arzneimittel über einen längeren Zeitraum angewendet haben. Wenn Ihre Hauterkrankung entweder im ursprünglich behandelten Bereich oder darüber hinaus wieder auftritt oder wenn Sie innerhalb weniger Tage bis Wochen nach Beendigung der Behandlung eine andere Hautreaktion bemerken, könnte dies ein Anzeichen für eine Entzugsreaktion sein. Diese Art von Reaktion tritt eher auf, wenn Terra-Cortril an empfindlichen Hautstellen wie dem Gesicht oder den Genitalien angewendet wurde.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Terra-Cortril erneut anwenden, wenn Sie eines dieser Symptome bemerken.

Kinder

Bei der Behandlung von Kindern mit Terra-Cortril ist während der Zahnbildungsphase (2. Schwangerschaftshälfte, Kleinkinder und Kinder bis zu 8 Jahre) erhöhte Vorsicht geboten, um eine Störung der Zahnentwicklung zu vermeiden.

Anwendung von Terra-Cortril zusammen mit anderen Arzneimitteln

Derzeit sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Bei der Anwendung von Terra-Cortril während der Schwangerschaft oder Stillzeit ist erhöhte Vorsicht geboten, weil ein potentielles Risiko für Nebenwirkungen beim Baby besteht.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Derzeit sind keine Auswirkungen von Terra-Cortril Salbe auf die Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen bekannt.

3. Wie ist Terra-Cortril anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

- Reinigen Sie die zu behandelnde Haut und tragen Sie zweimal täglich behutsam eine geringe Menge Terra-Cortril auf.
- Bei einer schweren Infektion kann die behandelte Haut mit einem sterilen Gazeverband abgedeckt werden.

- Ein Abbruch der Behandlung ist zu vermeiden, bevor eine zufriedenstellende Verbesserung eingetreten ist.

Ihr Arzt oder Apotheker wird bestimmen, wie lange Terra-Cortril anzuwenden ist. Wenn Sie keine Besserung bemerken, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker erneut um Rat.

Wenn Sie eine größere Menge von Terra-Cortril angewendet haben, als Sie sollten

Bei einer Überdosierung gibt es kein spezifisches Gegenmittel.

Wenn Sie eine größere Menge von Terra-Cortril angewendet haben, brechen Sie die Behandlung ab und kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Terra-Cortril vergessen haben

Wenn Sie die Anwendung von Terra-Cortril vergessen haben, holen Sie diese so schnell wie möglich nach, es sei denn, Sie bemerken es erst zum Zeitpunkt der folgenden Anwendung.

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Terra-Cortril abbrechen

Die Behandlung muss so lange fortgesetzt werden, bis eine zufriedenstellende Verbesserung erzielt ist. Informieren Sie immer Ihren Arzt, wenn Sie beabsichtigen, die Behandlung vorzeitig abzubrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Häufige Nebenwirkungen (können bis zu 1 von 10 Patienten betreffen)

- Brennen, Hautirritation

Nebenwirkungen mit unbekannter Häufigkeit (die Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

- Auftreten einer Sekundärinfektion mit Bakterien oder Pilzen durch die Anwendung von Kortikosteroiden zusammen mit Antibiotika
- Juckreiz, Trockenheit der Haut, Lichtempfindlichkeit, Haarwurzelerntzündung, übermäßiger Haarwuchs, akneartiger Ausschlag, Verfärbung der Haut, Hautentzündung, Kontaktekzem, Hautmazeration, Hautinfektion, Hautschwund, Dehnungsstreifen, kleine Bläschen (Miliar)
- Verschommenes Sehen

Bei Auftreten dieser Nebenwirkungen ist die Behandlung mit Terra-Cortril Salbe abzubrechen und der Arzt zu konsultieren.

Oxytetracyclin gehört zur Tetracyclin-Gruppe der Antibiotika und kann ähnliche Nebenwirkungen haben. Zu diesen Nebenwirkungen können gehören: Fixes Exanthem (kann wie runde oder ovale rote Flecken und Schwellungen der Haut, Blasenbildung (Nesselsucht) oder Juckreiz aussehen).

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Belgien: die Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be - Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifierunefetindesirable.be

E-Mail: adr@fagg-afmps.be

Luxemburg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy oder Abteilung Pharmazie und Medikamente (Division de la pharmacie et des médicaments) der Gesundheitsbehörde in Luxemburg

Website : www.guichet.lu/pharmakovigilanz

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Terra-Cortril aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
Nicht über 25 °C lagern.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Terra-Cortril enthält

- Die Wirkstoffe sind: Oxytetracyclin und Hydrocortison.
1 g Salbe enthält 10 mg Hydrocortison und 30 mg Oxytetracyclin in Form von Oxytetracyclinhydrochlorid.
- Die sonstigen Bestandteile sind: dünnflüssiges Paraffin, Vaseline.

Wie Terra-Cortril aussieht und Inhalt der Packung

Terra-Cortril ist eine Salbe zur Anwendung auf der Haut. Die Salbe ist in Tuben mit 5 g und 15 g erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

Pfizer NV/SA
Boulevard de la Plaine 17
1050 Brüssel
Belgien

Hersteller

Farmasierra Manufacturing, S.L.
Carretera de Irún, Km. 26, 200
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Spanien

Zulassungsnummer: BE056612; LU 2001106543

Verkaufsabgrenzung: Verschreibungspflichtig.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im: 10/2025
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im: 10/2025

BEL 25J06