

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dihydergot Forte 2,5 mg, comprimés Dihydroergotamine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent quelques jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que Dihydergot Forte et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dihydergot Forte
3. Comment prendre Dihydergot Forte
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Dihydergot Forte
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE DIHYDERGOT FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

La dihydroergotamine appartient au groupe des médicaments connus sous le nom d'alcaloïdes de l'ergot de seigle. Ces médicaments provoquent une constriction des vaisseaux sanguins (les vaisseaux deviennent plus étroits).

Dihydergot agit contre l'hypotension (tension sanguine trop faible).

Dihydergot Forte est proposé dans :

- le traitement de l'hypotension qui se manifeste par des vertiges lors du passage en position debout
- le traitement de l'hypotension provoquée par des médicaments

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIHYDERGOT FORTE

Ne prenez jamais Dihydergot Forte

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la dihydroergotamine, à un autre dérivé de l'ergot de seigle ou à l'un des autres composants de Dihydergot Forte
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
- Si vous avez une mauvaise circulation sanguine, avec tendance aux spasmes ou à l'obstruction des artères, ou une maladie des artères coronaires (p. ex. angine de poitrine)
- Si vous avez une infection grave
- Si vous avez eu récemment un choc sévère ou un traumatisme important
- Si vous avez une maladie grave du foie
- Si vous prenez certains médicaments (voir "Prise d'autres médicaments").

Faites attention avec Dihydergot Forte

- Si vous avez une maladie grave des reins

- Si vous souffrez d'une déficience hépatique légère à modérée, en particulier en cas d'hépatite cholestatique.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Prise d'autres médicaments »

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Suivez scrupuleusement les doses recommandées. L'usage prolongé de Dihydergot Forte est déconseillé en raison des risques de spasmes des vaisseaux sanguins.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les médicaments suivants, ainsi qu'un tabagisme important, peuvent provoquer des interactions (principalement des spasmes des vaisseaux sanguins) et leur utilisation simultanée doit être évitée:

- Antibiotiques : troléandomycine, érythromycine, clarithromycine
- Antiviraux : ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdine
- Antimycosiques : kétoconazole, itraconazole, voriconazole
- Antimigraineux : préparations contenant des alcaloïdes de l'ergot ou des triptanes tels que le sumatriptan.

La prudence est requise chez les patients présentant des troubles circulatoires au niveau des bras et des jambes, lorsque des β -bloquants (p.ex. propranolol, médicament contre une tension sanguine élevée et également utilisé pour la prévention de la migraine) sont utilisés en même temps.

Aliments et boissons

Données non fournies.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Dihydergot Forte est contre-indiqué durant la grossesse.

Allaitement

Dihydergot Forte est contre-indiqué durant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Si vous avez des sensations vertigineuses, évitez de conduire ou d'utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants de Dihydergot Forte

Si votre médecin vous a dit que vous êtes hypersensible à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament qui contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE DIHYDERGOT FORTE

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

- *Hypotension en position debout*

Pendant une semaine, prenez 1 comprimé, 3 à 4 fois par jour. Ensuite, pendant 5 à 6 semaines, prenez 1 comprimé le matin et le soir.

- *Hypotension provoquée par des médicaments*

Prenez 1 comprimé, 2 à 5 fois par jour.

Voie et mode d'administration

Avaler les comprimés avec un peu de liquide.

Si vous avez pris plus de Dihydergot Forte que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Dihydergot Forte, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

Les signes d'un surdosage aigu sont : fourmillements ou d'engourdissement dans les doigts et les orteils, douleurs dans la poitrine; nausées, vomissements; céphalées, battements accélérés du cœur; coma.

Si vous oubliez de prendre Dihydergot Forte

Prenez-le dès que vous vous en souvenez, mais ne le prenez pas s'il est moins de 4 heures avant la prochaine prise. Dans ce cas, prenez la prise suivante au moment habituel.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Dihydergot Forte

Aucun à notre connaissance.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Dihydergot Forte peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Réactions d'hypersensibilité: rougeur de la peau, gonflement du visage, urticaire
- Augmentation de la tension sanguine
- Etourdissements
- Douleurs dans le ventre, diarrhées
- Parfois: nausées et vomissements
- Exceptionnellement: douleurs dans la poitrine, sensations de chatouillement ou de fourmillements dans les doigts et les orteils, douleur et faiblesse au niveau des bras et des jambes, mains et pieds froids (non liés à des basses températures): si un de ces symptômes apparaît, prévenez immédiatement le médecin et ne prenez plus le médicament.

Il est très important de suivre les recommandations posologiques étant donné que des changements fibrotiques (accumulation de tissus fibreux) au niveau de la plèvre (membrane qui recouvre les poumons), du péritoine (membrane qui recouvre les organes et l'intérieur des parois abdominales) et des valves cardiaques peuvent se développer lors d'une utilisation excessive durant des années.

Des cas de spasmes musculaires, de diminution du flux sanguin périphérique et de gangrène ont été signalés.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DIHYDERGOT FORTE

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser Dihydergot Forte après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Dihydergot Forte

- La substance active est le mésilate de dihydroergotamine : 2,5 mg dans un comprimé.
- Les autres composants (excipients) sont : acide tartrique, gélatine, stéarate de magnésium, acide stéarique, talc, amidon de maïs et lactose.

Qu'est ce que Dihydergot Forte et contenu de l'emballage extérieur

Dihydergot Forte est disponible en plaquettes en PVC/aluminium de 30 et de 100 comprimés sécables.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché

Amdipharm Limited

Temple Chambers – 3 Burlington Road,

Dublin 4

Irlande

Fabricant

Amdipharm Plc, Regency House, Miles Gray Road, Basildon, Essex, SS14 3AF, RoyaumeUni
Cenexi, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, France

Numéro d'enregistrement: BE032033

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2012