

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Effortil 7,5 mg/1 ml
solution buvable en gouttes
chlorhydrate d'étiléfrine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que EFFORTIL et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EFFORTIL
3. Comment prendre EFFORTIL
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver EFFORTIL
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE EFFORTIL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

EFFORTIL contient comme substance active du chlorhydrate d'étiléfrine, une substance qui augmente la tension artérielle.

EFFORTIL est utilisé pour traiter une tension artérielle trop basse.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE EFFORTIL?

Ne prenez jamais EFFORTIL

- si vous êtes allergique au chlorhydrate d'étiléfrine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6 (voir aussi rubrique «*Avertissements et précautions*»)
- si vous souffrez
 - d'une tension artérielle élevée
 - d'une tension artérielle trop basse avec des réactions de tension élevée en position debout
 - d'artériosclérose
 - d'une certaine tumeur des glandes surrénales (phéochromocytome)
 - de certaines maladies du coeur, de la thyroïde, de l'oeil et de la prostate
- pendant les 3 premiers mois de la grossesse et pendant l'allaitement (voir rubrique «*Grossesse, allaitement et fertilité*»).

Avertissements et précautions

- si vous souffrez de troubles du rythme cardiaque, de diabète sucré (voir rubrique «*Autres médicaments et EFFORTIL*») ou d'hyperthyroïdie. Vous devez être contrôlé par votre médecin.

- si vous faites du sport de compétition. EFFORTIL peut donner des résultats positifs au test de dopage et améliorer les performances athlétiques.
- si vous prenez déjà d'autres médicaments. Veuillez lire également la rubrique «*Autres médicaments et EFFORTIL*».

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre EFFORTIL.

Enfants et adolescents

Indiqué chez les adolescents de plus de 12 ans.

Autres médicaments et EFFORTIL

Les médicaments suivants peuvent influencer les effets d'EFFORTIL:

- les médicaments contre l'allergie
- les hormones de la thyroïde
- les sympathomimétiques (médicaments stimulant le système nerveux)
- certains médicaments contre la dépression (les tricycliques, les inhibiteurs de l'enzyme MAO)
- certains anesthésiques par inhalation (hydrocarbures aliphatiques halogénés)
- certains médicaments pour le cœur (les alpha- et bêta-bloquants, les glycosides cardiaques)
- la guanéthidine et la réserpine (contre une tension artérielle élevée)
- les minéralocorticoïdes (pour réguler la pression artérielle)
- la bromocriptine et le pergolide (contre la maladie de Parkinson)
- la dihydroergotamine (contre la migraine)
- l'atropine (substance active de certaines gouttes pour les yeux et de certains médicaments injectables).

EFFORTIL diminue l'effet des médicaments contre le diabète.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

EFFORTIL avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet

Grossesse, allaitement et fertilité

N'utilisez pas ce médicament pendant les 3 premiers mois de la grossesse ni pendant la période d'allaitement. A partir du 4^{ème} mois de la grossesse, n'utilisez pas ce médicament sauf sur avis médical.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Si vous ressentez des étourdissements pendant le traitement avec ce médicament, ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines.

EFFORTIL contient

- des conservateurs (parahydroxybenzoate de méthyle et le parahydroxybenzoate de propyle,) pouvant provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).
- du métabisulfite de sodium qui peut, dans de rares cas, provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères et des bronchospasmes.
- moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ml de solution, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE EFFORTIL

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Dose recommandée

Adultes et adolescents de plus de 12 ans : 10 à 20 gouttes, 3 fois par jour.

Ne dépassez pas 6 prises par jour.

Utilisation chez les enfants

Enfants de moins de 12 ans : ne pas utiliser.

Comment prendre EFFORTIL

Avalez les gouttes pures ou diluées dans un peu d'eau, de préférence avant les repas.

Si vous avez pris plus de EFFORTIL que vous n'auriez dû

- Si vous avez pris trop d'EFFORTIL, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).
- Symptômes : aggravation des effets indésirables (voir rubrique 4) et vomissement. Chez les petits enfants : une dépression respiratoire et un coma.

Si vous oubliez de prendre EFFORTIL

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- **Fréquent** (chez 1 à 10 sur 100 patients)
 - maux de tête
- **Peu fréquent** (chez 1 à 10 sur 1.000 patients)
 - rythme cardiaque accéléré ou irrégulier
 - contractions cardiaques anormales
 - tremblements
 - agitation
 - vertiges
 - nausées
 - anxiété
 - insomnie
- **Fréquence indéterminée** (ne pouvant être estimée sur base des données disponibles)
 - angine de poitrine
 - tension artérielle élevée
 - transpiration anormalement abondante (hyperhidrose)
 - hypersensibilité (allergie)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé – Division Vigilance

Avenue Galilée 5/03 1210 BRUXELLES	Boîte Postale 97 1000 BRUXELLES Madou
---------------------------------------	---

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be – E-mail: adr@afmps.be

Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EFFORTIL

A conserver entre 15°C et 25°C, dans l'emballage d'origine.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après «EXP».

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient EFFORTIL

- La substance active est: chlorhydrate d'étiléfrine 7,5 mg/1 ml
- Les autres composants sont: parahydroxybenzoate de méthyle - parahydroxybenzoate de propyle - métabisulfite de sodium - eau purifiée

Aspect de EFFORTIL et contenu de l'emballage extérieur

Solution buvable en gouttes à 7,5 mg/1 ml. Flacon de 50 ml. Existe aussi en comprimés à 5 mg.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

SERB SA, Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique

Fabricant

Istituto De Angeli S.r.l., Loc. Prulli n. 103/C, 50066 Reggello (FI), Italie

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché:

Belgique : BE020946

Luxembourg : 2009060505

Délivrance: médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2023