

BIJLAGE III

BIJSLUITER

BIJSLUITER
Calphone, inspuitbare oplossing

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN VERSCHILLEND**

Registratiehouder:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Duitsland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Provet S.A.
Aspropyrgos
193 00 Attica
Griekenland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Calphone, inspuitbare oplossing

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per 500 ml:

95,0 g calciumgluconaat - 22,5 g calciumgluceptaat - calciumsaccharaat - 30,0 g magnesiumchloride -
2,0 g butafosfan - boorzuur - methylparahydroxybenzoaat - natriumhydroxide oplossing - water voor
injectie.

4. INDICATIE(S)

Compenseren van tekort aan mineralen, zoals in geval van:

- hypocalcemie voor, tijdens of na het kalveren of werpen, of tijdens de lactatie (melkziekte, lactatie, tetanie, eclampsie)
- andere acute stoornissen van het calciummetabolisme
- hypomagnesemie.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Indien er reeds een ernstige ontaarding van het circulatiesysteem aanwezig is, dient er principieel van een intraveneuze calciumtherapie worden afgezien.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund en hond.

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)**

DOSERING

De aanbevolen dosering is 0,5 - 1 ml/kg lichaamsgewicht.

Als algemene richtlijn kunnen de volgende doseringen gehanteerd worden:

- Rund met een gewicht van ongeveer 500 kg: 250 ml.
- Kalf met een gewicht van 50 à 100 kg: 30-50 ml.
- Hond: 2,5-10 ml.

De dosis voor lichtere dieren proportioneel lager en voor zwaardere dieren proportioneel hoger nemen.

WIJZE VAN TOEDIENING

- Rund: trage intraveneuze injectie.
- Hond: trage intraveneuze, intramusculaire of subcutane injectie.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

-

10. WACHTTIJD

Rund: (Orgaan) Vlees: 0 dagen.
Melk: 0 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25°.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 7 dagen.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Het product dient langzaam intraveneus te worden ingediend om bijwerkingen zoals bradycardie en mogelijke hartstilstand te vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Bij overdosering bestaat het gevaar voor hypercalcemie.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Januari 2021

15. OVERIGE INFORMATIE

Op diergeneeskundig voorschrift.

BE-V040993