

B. BIJSLUITER

BIJSLUITER**Catosal**, 100 mg/ml / 0,05 mg/ml, oplossing voor injectie**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Duitsland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Duitsland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Catosal, 100 mg/ml / 0,05 mg/ml, oplossing voor injectie voor rund, kalf, hond, kat en pelsdieren
Butafosfan / Cyanocobalamine

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzame bestanddelen:

Butafosfan	100	mg
Cyanocobalamine (vitamine B ₁₂)	50	µg

Hulpstoffen:

n-Butanol	30	mg
-----------	----	----

4. INDICATIES

Aandoeningen en chronische en acute stoornissen van de fosforstofwisseling en als hulp bij een calciumtherapie.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund, kalf, hond, kat en pelsdieren.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

DOSERING

Acute aandoeningen:

- rund: 5-25 ml Catosal per dier;
- kalf: 5-12 ml Catosal per dier;
- hond: 0,5-5 ml Catosal per dier;
- kat, pelsdieren: 0,5-2,5 ml Catosal per dier.

Herhaling van de toediening zo nodig dagelijks.

Chronische aandoeningen:

De helft van de hierboven opgegeven doses. Zo nodig herhalen met tussenpozen van 1-2 weken, of korter interval.

WIJZE VAN TOEDIENING

Intraveneus en intramusculair bij rund en kalf.

Intraveneus, intramusculair of subcutaan bij hond, kat en pelsdieren.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

-

10. WACHTTIJD

Rund, kalf:

(Orgaan)vlees

Melk: 0 dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 4 weken.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Geen.

Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Januari 2024

15. OVERIGE INFORMATIE

Glazen flacon met 50 ml, 100 ml of 250 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

Op diergeneeskundig voorschrift.

BE-V040975