

BIJSLUITER

BENAMING EN GROEP

BOORZUURVASELINE STEROP 10%
(Lichte) ontsmettingsmiddel van de huid.

AANGEWEZEN BIJ

Desinfectie : - van lichte brandwonden, vries letsels, kloven
 - van oppervlakkige en lichte huid letsels

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL?

Eénmaal per dag aanbrengen.

De huid wassen met lauw gekookt water, drogen door licht deppen en de boorzuurvaseline zalf aanbrengen. Bedekken met een verband.

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEDEN

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

ONGEWENSTE EFFECTEN

Verweking van de huid ter hoogte van de letsels.

BIJZONDERE VOORZORGEN

- Niet gebruiken op grote geschaafde of beschadigde huidzones.
- Contact met de ogen of met slijmvliezen vermijden.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN

- Een intoxicatie kan zich voordoen na een accidentele inname van boorzuurvaseline zalf. Waarschuw uw arts die de noodzakelijke maatregelen zal nemen.
- Een intoxicatie kan zich voordoen na een te langdurig gebruik, leidend tot een absorptie.

- De intoxicatie kan zich voordoen in de vorm van braken en diarree, roodheid van de huid en convulsies.

VORMEN, TOEDIENINGSWIJZEN EN VERPAKKING

Vaseline voor lokaal gebruik. Tube met 20 g.

BEWARING

Temperatuur $\leq 25^{\circ}$ C

STABILITEIT

Zie vervaldatum op de verpakking.

(EXP: maand-jaar = uiterste gebruiksdatum. De vervaldatum is de laatste dag van de aangegeven maand).

SAMENSTELLING

Acid. Boric. 100 mg – Vaseline. q.s. ad 1 g

FABRIKANT

LABORATOIRES STEROP N.V. - Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel - België.

HOUDER VAN DE REGISTRATIE EN VERDELER

LABORATOIRES STEROP N.V. - Scheutlaan 46-50 - 1070 Brussel - België.

Datum van goedkeuring: 04/2015