

PACKUNGSBEILAGE
Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Fagron Glycerinzäpfchen für Erwachsene 2,63 g
Fagron Glycerinzäpfchen für Kinder 1,95 g
Fagron Glycerinzäpfchen für Babys 0,87 g

Glycerol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind Glycerinzäpfchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Glycerinzäpfchen beachten?
3. Wie sind Glycerinzäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Glycerinzäpfchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Glycerinzäpfchen und wofür werden sie angewendet?

Arzneimittel zur symptomatischen Behandlung von vorübergehender Darmverstopfung.
Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Glycerinzäpfchen beachten?

Glycerinzäpfchen dürfen nicht angewendet werden:

- Wenn Sie allergisch gegen Glycerol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile der Zäpfchen sind.
- Bei Bauchschmerzen unklarer Herkunft.
- Bei behinderter Darmfunktion (Darmtransit): Lähmung oder Darmverschluss.
- Bei Anzeichen von Dehydrierung.
- Bei Übelkeit und Erbrechen, Darmentzündung (Rektokolitis) und Rissen im After (Analfissuren).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Glycerinzäpfchen anwenden.

Seien Sie vorsichtig mit diesem Arzneimittel:

- Bei längerem Gebrauch. Eine länger dauernde Anwendung von Abführmitteln wird nicht empfohlen, um das Risiko einer Abhängigkeit zu vermeiden.
- Wenn Sie älter sind.

- Wenn Sie Diabetiker sind. Die Blutzuckerwerte (Glucosewerte) von Menschen mit Diabetes müssen überwacht werden, wenn dieses Arzneimittel verwendet wird.
- Bei chronischer Verstopfung. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten ändern und auf ballaststoffreichere Lebensmittel umstellen.
- Wenn Sie andere Arzneimittel verwenden. Bitte lesen Sie auch den Abschnitt „Anwendung von Glycerinzäpfchen zusammen mit anderen Arzneimitteln“.

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn einer der oben genannten Warnhinweise auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zutraf.

Kinder und Babys

Verwenden Sie stets die Zäpfchen der entsprechenden Größe.

Anwendung von Glycerinzäpfchen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Eine beschleunigte Darmfunktion (Darmtransit) kann die Absorption anderer Arzneimittel beeinträchtigen.

Anwendung von Glycerinzäpfchen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Glycerinzäpfchen können ohne Probleme während der Schwangerschaft angewendet werden.

Stillzeit

Glycerinzäpfchen können ohne Probleme während der Stillzeit angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Glycerinzäpfchen haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie sind Glycerinzäpfchen anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene

Zäpfchen immer in der richtigen Größe verwenden.

Führen Sie das Zäpfchen tief in den Anus ein; das Zäpfchen schmilzt nicht, sondern löst sich auf. Die Wirkung tritt innerhalb von 30 Minuten ein.

Im Allgemeinen ist es ausreichend, 1 bis 2 Zäpfchen pro Tag zu verwenden.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel so kurz wie möglich. Versuchen Sie, chronische Verstopfung zu verhindern, indem Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten und Ihren Lebensstil anpassen.

Kinder und Babys

Zäpfchen immer in der richtigen Größe verwenden.

Führen Sie das Zäpfchen tief in den Anus ein; das Zäpfchen schmilzt nicht, sondern löst sich auf. Die Wirkung tritt innerhalb von 30 Minuten ein.

Im Allgemeinen ist es ausreichend, 1 bis 2 Zäpfchen pro Tag zu verwenden.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel so kurz wie möglich. Versuchen Sie, chronische Verstopfung zu verhindern, indem Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten und Ihren Lebensstil anpassen.

Wenn Sie eine größere Menge von Glycerinzäpfchen angewendet haben, als Sie sollten

Bei richtiger Anwendung ist das Risiko einer Überdosierung angesichts der schnellen Entleerung durch den Stuhlgang sehr gering. Bei Irrtum oder Unaufmerksamkeit ist es möglich, die Zäpfchen durch den Mund aufzunehmen.

Wenn Sie zu viele Glycerinzäpfchen verwendet oder eingenommen haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, Apotheker oder die Giftnotrufzentrale (070/245.245).

Mögliche Symptome nach Einnahme einer sehr hohen oralen Dosis sind: Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Durst, Schwindel und Verwirrung.

Behandlung: Behandlung der Symptome.

Wenn Sie die Anwendung von Glycerinzäpfchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Glycerinzäpfchen abbrechen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können auch Glycerinzäpfchen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In einigen seltenen Fällen kann es zu Irritationen oder Brennen im Rektalbereich kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt melden bei

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

www.afmps.be

Abteilung Vigilanz:

Website: www.notifierunefetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Glycerinzäpfchen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Nicht einfrieren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach verwendbar bis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Glycerinzäpfchen enthalten

- Der Wirkstoff ist: Glycerol
- Die sonstigen Bestandteile sind: gereinigtes Wasser und Gelatine

Wie Glycerinzäpfchen aussehen und Inhalt der Packung

Transparente Schachtel aus Polypropylen-Copolymer mit 10 Zäpfchen.

Transparente Schachtel aus Polystyrol mit 50 oder 100 Zäpfchen.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoires Sopreli sprl
Rue de la Pastorale 57
1070 Brüssel
02/411 37 04
sopreli.belgium@skynet.be

Zulassungsnummer

Fagron Glycerinzäpfchen für Erwachsene 2,63 g: BE103966

Fagron Glycerinzäpfchen für Kinder 1,95 g: BE103941

Fagron Glycerinzäpfchen für Babys 0,87 g: BE103923

Art der Abgabe

Rezeptfrei.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 08/2022.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 12/2025.