

Notice : information de l'utilisateur

Glycérine Fagron adultes 2,63 g suppositoires

Glycérine Fagron enfants 1,95 g suppositoires

Glycérine Fagron bébés 0,87 g suppositoires

Glycérol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que glycérine suppositoires et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser glycérine suppositoires
3. Comment utiliser glycérine suppositoires
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver glycérine suppositoires
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que glycérine suppositoires et dans quel cas est-il utilisé ?

Médicament pour le traitement symptomatique de la constipation passagère des intestins.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser glycérine suppositoires?

N'utilisez jamais Glycérine suppositoires :

- si vous êtes allergique au glycérol ou à l'un des autres composants contenus dans les suppositoires mentionnés dans la rubrique 6.
- En cas de douleurs abdominales d'origine incertaine.
- En cas d'empêchement du fonctionnement des intestins (transit intestinal) : paralysie ou obstruction intestinale.
- En cas de symptômes de déshydratation.
- En cas de nausées et de vomissements, d'une inflammation intestinale (rectocolite) et de fissures dans l'anus (fissures anales).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Glycérine suppositoires.

Faites attention à ce médicament :

- En cas d'usage prolongé. Un traitement prolongé aux laxatifs est déconseillé afin d'éviter les risques d'accoutumance.
- Si vous êtes âgé.
- Si vous êtes diabétique. Le taux de sucre (taux de glucose) des personnes souffrant de diabète nécessite un suivi en cas d'usage de ce médicament.
- En cas de constipation chronique. Il est recommandé de modifier vos habitudes alimentaires et d'adopter la nourriture plus riche en fibres.

- Si vous utilisez d'autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Glycérine Suppositoires».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Enfants et bébés

Utilisez à chaque fois les suppositoires du format correspondant.

Autres médicaments et Glycérine suppositoires

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

L'accélération du fonctionnement intestinal (transit intestinal) peut affecter la résorption d'autres médicaments.

Glycérine suppositoires avec des aliments et boissons

Non applicable.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Glycérine suppositoires peut être utilisé sans problème pendant la grossesse.

Allaitement

Glycérine suppositoires peut être utilisé sans problème pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les suppositoires à la glycérine n'ont pas d'effet sur l'aptitude à conduire ou sur l'utilisation de machines.

3. Comment utiliser Glycérine suppositoires ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est

Adultes

Utiliser toujours les suppositoires au format adéquat.

Introduire le suppositoire profondément dans l'anus; le suppositoire ne fond pas, mais se dissout. L'effet se manifeste dans les 30 minutes.

En général, il suffit d'utiliser 1 à 2 suppositoires par jour.

Utiliser ce médicament pendant une période aussi brève que possible. Il convient d'essayer de vaincre la constipation chronique en adaptant ses habitudes alimentaires et son mode de vie.

Enfants et bébés

Utiliser toujours les suppositoires au format adéquat.

Introduire le suppositoire profondément dans l'anus; le suppositoire ne fond pas, mais se dissout. L'effet se manifeste dans les 30 minutes.

En général, il suffit d'utiliser 1 à 2 suppositoires par jour.

Utiliser ce médicament pendant une période aussi brève que possible. Il convient d'essayer de vaincre la constipation chronique en adaptant ses habitudes alimentaires et son mode de vie.

Si vous avez utilisé plus de Glycérine suppositoires que vous n'auriez dû

En cas d'usage correct le risque de surdosage est très faible, étant donné l'évacuation rapide par défécation. En cas d'erreur ou d'inattention, il est possible d'absorber les suppositoires par la bouche.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Glycérine suppositoires, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Les symptômes éventuels après la prise orale d'une dose très importante sont : mal à la tête, nausées, diarrhée, soif, vertiges et confusion.

Traitement: traitement des symptômes.

Si vous oubliez d'utiliser Glycérine suppositoires

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Glycérine suppositoires

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Glycérine suppositoires peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans certains cas rares, une irritation ou une sensation de brûlure peut être observée dans la zone du rectum.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

www.afmps.be

Division Vigilance :

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Glycérine suppositoires

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Ne pas congeler

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Glycérine suppositoires

- La substance active est le glycérol
- Les autres composants sont l'eau purifiée et la gélatine

Aspect de Glycérine suppositoires et contenu de l'emballage extérieur

Boîte transparente en copolymère de polypropylène randon renfermant 10 suppositoires.

Boîte transparente en polystyrène renfermant 50 ou 100 suppositoires.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoires Sopreli sprl
Rue de la Pastorale 57
1070 Bruxelles
02/411 37 04
sopreli.belgium@skynet.be

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

Glycérine Fagron adultes 2,63 g suppositoires : BE103966
Glycérine Fagron enfants 1,95 g suppositoires : BE103941
Glycérine Fagron bébés 0,87 g suppositoires : BE103923

Mode de délivrance

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 08/2022.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2025