

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Glycerine Fagron volwassenen 2,63 g zetabletten

Glycerine Fagron kinderen 1,95 g zetabletten

Glycerine Fagron zuigelingen 0,87 g zetabletten

Glycerol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Glycerine Fagron en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Glycerine Fagron en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van voorbijgaande constipatie.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- In het geval van buikpijn zonder gekende oorzaak.
- In het geval uw darmkanaal geblokkeerd is (intestinale transit): darmverlamming en -obstructie.
- In het geval van verschijnselen van uitdroging.
- In het geval van misselijkheid en braken, bij darmontsteking (colitis) en aarskloven (anale fissuren).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Wees extra voorzichtig met dit geneesmiddel:

- In geval van langdurig gebruik. Een langdurige behandeling met laxeremiddelen wordt afgeraden om verslavingsrisico's te vermijden.
- Als u bejaard bent.
- Als u suikerziekte hebt. Het suikergehalte (glucose) van personen met suikerziekte benodigd een nauwe opvolging bij gebruik van dit geneesmiddel.
- In geval van chronische constipatie. Het wordt aanbevolen om uw voedingsgewoonten te wijzigen en meer vezelrijke voeding te eten.

- Als u andere geneesmiddelen gebruikt. Lees ook de rubriek «Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?».

Neem contact op met uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing zijn of dit in het verleden waren.

Kinderen en zuigelingen

Gebruik telkens de zetpillen van het overeenstemmende formaat.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Glycerine Fagron nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een versnelling van de werking van de darmen (intestinale transit) kan de resorptie van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Glycerine Fagron kan zonder problemen gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Glycerine Fagron kan zonder problemen gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Glycerine Fagron heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is

Volwassenen

Gebruik altijd de zetpillen van het juiste formaat.

Breng de zetpil diep in de anus in; het inbrengen van de zetpil wordt vergemakkelijkt door het te bevochtigen, dan glijdt het beter. De zetpil smelt niet, maar lost zich op. Het heeft binnen 30 minuten effect.

Over het algemeen, volstaat het 1 tot 2 zetpillen per dag te gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel voor een zo kort mogelijke periode. U moet proberen uw voedingspatroon en uw levensstijl aan te passen voor het oplossen van de chronische verstopping.

Kinderen en zuigelingen

Gebruik altijd de zetpillen van het juiste formaat.

Breng de zetpil diep in de anus in; het inbrengen van de zetpil wordt vergemakkelijkt door het te bevochtigen, dan glijdt het beter. De zetpil smelt niet, maar lost zich op. Het heeft binnen 30 minuten effect.

Over het algemeen, volstaat het 1 tot 2 zetpillen per dag te gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel voor een zo kort mogelijke periode. U moet proberen uw voedingspatroon en uw levensstijl aan te passen voor het oplossen van de chronische verstopping.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?

Bij een juist gebruik is het risico van overdosering zeer klein, door de snelle evacuatie via de ontlasting. Het is mogelijk om de zetpillen oraal in te nemen, in het geval van onoplettendheid of per ongeluk.

Wanneer u teveel van Glycerine Fagron heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De mogelijke symptomen na een orale inname van een zeer grote dosis zijn: hoofdpijn, misselijkheid, diarree, dorst, duizeligheid en verwarring.

Behandeling: behandeling van de symptomen.

Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Zelden kan irritatie of een branderig gevoel in het gebied rondom het rectum optreden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

www.fagg.be

Afdeling Vigilantie:

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet in de vriezer bewaren

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is glycerol.
- De andere hulpstoffen in dit geneesmiddel zijn gezuiverd water en gelatine.

Hoe ziet Glycerine Fagron eruit en wat zit er in een verpakking?

Doorzichtige plastic doos van polypropreen met 10 en 100 zetpillen.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoires Sopreli sprl

Rue de la Pastorale 57

1070 Brussel

02/411 37 04

sopreli.belgium@skynet.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Glycerine Fagron volwassenen 2,63 g zetpillen: BE103966

Glycerine Fagron kinderen 1,95 g zetpillen: BE103941

Glycerine Fagron zuigelingen 0,87 g zetpillen: BE103923

Wijze van aflevering

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2026.

Goedkeuringsdatum FAGG : 09/2026.