

Notice : Information du patient

Lisinopril Grindeks 5 mg comprimé Lisinopril Grindeks 10 mg comprimé Lisinopril Grindeks 20 mg comprimé

lisinopril

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Lisinopril Grindeks et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lisinopril Grindeks
3. Comment prendre Lisinopril Grindeks
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Lisinopril Grindeks
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Lisinopril Grindeks et dans quels cas est-il utilisé ?

Lisinopril Grindeks contient un médicament appelé lisinopril. Il fait partie d'une famille de médicaments appelés inhibiteurs de l'ECA.

Lisinopril Grindeks peut être utilisé dans les situations suivantes :

- Traitement d'une pression sanguine trop élevée (hypertension) chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés d'au moins 6 ans.
- Traitement de l'insuffisance cardiaque chez les adultes.
- Traitement d'une crise cardiaque récente (infarctus du myocarde) chez les adultes.
- Traitement de problèmes rénaux provoqués par un diabète de type 2 chez les adultes avec hypertension.

Lisinopril Grindeks agit en dilatant les vaisseaux sanguins. Cela contribue à diminuer la pression sanguine. Il permet également au cœur de pomper plus facilement le sang vers toutes les parties du corps.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lisinopril Grindeks

Ne prenez jamais Lisinopril Grindeks

- si vous êtes allergique au lisinopril ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez déjà développé une réaction allergique à un autre médicament inhibiteur de l'ECA. La réaction allergique peut provoquer un gonflement des mains, des pieds, des chevilles, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge. Elle peut aussi gêner la déglutition ou la respiration (angioedème).
- si vous avez pris ou prenez actuellement du sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter un type d'insuffisance cardiaque à long terme (chronique) chez les adultes, car cela augmente le risque d'angioedème (gonflement rapide sous la peau dans une zone comme la gorge).

- si un membre de votre famille a développé des réactions allergiques graves (angioedème) à un inhibiteur de l'ECA ou si vous avez développé des réactions allergiques graves (angioedème) sans cause connue.
- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter Lisinopril Grindeks au début de la grossesse ; voir la rubrique "Grossesse").
- si vous êtes atteint(e) de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) avec un médicament hypotenseur contenant de l'aliskirène.

En cas de doute à propos de ce qui précède, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Lisinopril Grindeks.

Si vous développez une toux sèche qui persiste pendant une longue période après le début du traitement par Lisinopril Grindeks, parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Lisinopril Grindeks :

- si vous présentez un rétrécissement (sténose) de l'aorte (artère du cœur) ou un rétrécissement de valve cardiaque (valve mitrale).
- si vous souffrez d'un rétrécissement (sténose) de l'artère rénale.
- si vous présentez une augmentation de l'épaisseur du muscle cardiaque (appelée cardiomyopathie hypertrophique).
- si vous avez des problèmes des vaisseaux sanguins (maladie du collagène vasculaire).
- si vous avez une pression sanguine trop élevée. Vous pouvez la ressentir par une sensation de vertiges ou d'étourdissement, surtout quand vous vous levez.
- si vous avez des problèmes de reins ou êtes traité(e) par dialyse rénale.
- si vous avez des problèmes du foie.
- si vous êtes diabétique.
- le risque d'angioedème (gonflement rapide sous la peau dans une zone comme la gorge) est augmenté si vous prenez un des médicaments suivants :
 - temsirolimus, sirolimus, évérolimus et autres médicaments de la famille des inhibiteurs de mTOR (utilisés pour éviter le rejet d'organe transplanté et contre le cancer)
 - racécadotril, un médicament utilisé pour traiter la diarrhée
 - vildagliptine, un médicament utilisé pour traiter le diabète
- si vous prenez un des médicaments suivants utilisés pour traiter l'hypertension :
 - un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) (également connu sous le nom de sartans, par exemple valsartan, telmisartan, irbésartan), en particulier si vous avez des problèmes rénaux liés au diabète
 - aliskirène.

Votre médecin peut vérifier régulièrement votre fonction rénale, votre pression sanguine et vos taux sanguins d'électrolytes (comme le potassium). Voir également les informations de la rubrique "Ne prenez jamais Lisinopril Grindeks".

- si vous avez récemment eu la diarrhée ou des vomissements.
- si votre médecin vous a conseillé de contrôler la quantité de sel dans votre alimentation.
- si vous avez un taux élevé de cholestérol et que vous suivez un traitement appelé LDL-aphérèse.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte ou si vous pourriez être enceinte. Lisinopril Grindeks est déconseillé en début de grossesse et vous ne devez pas le prendre si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car l'utilisation pendant cette période peut entraîner des dommages sérieux pour le bébé. (voir la rubrique "Grossesse").
- Lisinopril Grindeks peut être moins efficace si vous avez la peau noire. Vous pourriez aussi présenter plus facilement un effet secondaire appelé angioedème, une réaction allergique grave.

En cas de doute à propos de ce qui précède, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Lisinopril Grindeks.

Traitement des allergies comme celles aux piqûres d'insectes

Informez votre médecin si vous recevrez ou allez recevoir un traitement pour diminuer les effets d'une allergie comme celle aux piqûres d'insectes (traitement de désensibilisation). Si vous prenez Lisinopril Grindeks pendant que vous suivez ce traitement, cela peut provoquer une réaction allergique grave.

Interventions chirurgicales

Si vous devez subir une intervention chirurgicale (y compris une chirurgie dentaire), informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez du Lisinopril Grindeks. C'est parce que vous pourriez développer une diminution de la pression sanguine (hypotension) si on vous administre certains anesthésiques locaux ou généraux pendant le traitement par Lisinopril Grindeks.

Enfants et adolescent(e)s

Le lisinopril a été étudié chez les enfants. Pour des informations complémentaires, veuillez en discuter avec votre médecin. Lisinopril Grindeks est déconseillé chez les enfants de moins de 6 ans et chez tout enfant qui présente des problèmes rénaux graves.

Autres médicaments et Lisinopril Grindeks

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé, ou pourriez utiliser tout autre médicament. Ceci parce que Lisinopril Grindeks peut affecter l'action de certains médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur Lisinopril Grindeks. Votre médecin peut être amené à modifier votre dose et/ou à prendre d'autres précautions.

En particulier, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un des médicaments suivants :

- Autres médicaments qui contribuent à diminuer la pression sanguine.
- Un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) ou l'aliskirène, (voir également les informations dans les rubriques "Ne prenez jamais Lisinopril Grindeks" et "Mises en garde et précautions d'emploi").
- Diurétiques.
- Médicaments bêta-bloquants comme l'aténolol et le propranolol.
- Dérivés nitrés (utilisés pour des problèmes cardiaques).
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) utilisés pour traiter la douleur et l'arthrose.
- Acide acétylsalicylique (aspirine), si vous prenez plus de 3 grammes par jour.
- Médicaments pour la dépression et les problèmes mentaux, notamment le lithium.
- Suppléments de potassium (y compris les substituts de sel), diurétiques d'épargne potassique et d'autres médicaments qui peuvent augmenter le taux sanguin de potassium (p. ex. le triméthoprime et le cotrimoxazole utilisés contre les infections bactériennes ; ciclosporine, un médicament immunosuppresseur utilisé pour empêcher le rejet des greffes d'organes ; héparine, un médicament utilisé pour fluidifier le sang pour éviter la formation de caillots).
- Insuline ou médicaments pris par voie orale pour le diabète.
- Médicaments utilisés pour traiter l'asthme.
- Médicaments utilisés pour traiter la congestion du nez ou des sinus ou autres médicaments contre le rhume (y compris ceux disponibles sans ordonnance).
- Médicaments destinés à supprimer la réponse immunitaire de l'organisme (immunosuppresseurs).
- Allopurinol (pour la goutte).
- Procainamide (pour les problèmes de rythme cardiaque).
- Médicaments qui contiennent de l'or, comme l'aurothiomalate de sodium, qui peut vous être administré par injection.

Les médicaments suivants peuvent augmenter le risque d'angioœdème (les signes d'angioœdème peuvent être un gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec des difficultés à avaler ou à respirer) :

- Médicaments utilisés pour dissoudre les caillots sanguins (activateurs tissulaires du plasminogène), généralement administrés à l'hôpital.
- Médicaments le plus souvent utilisés pour éviter le rejet de greffe d'organe (temsirolimus, sirolimus, évérolimus et autres médicaments de la famille des inhibiteurs de mTOR). Voir rubrique 2 "Mises en garde et précautions".
- Racécadotril, utilisé pour traiter la diarrhée.

- Vildagliptine, utilisée pour traiter le diabète

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Votre médecin vous conseillera normalement d'arrêter de prendre Lisinopril Grindeks avant de commencer une grossesse ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte ; il vous conseillera un autre médicament pour remplacer Lisinopril Grindeks. Lisinopril Grindeks est déconseillé en début de grossesse et vous ne devez pas le prendre si vous êtes enceinte de plus de 3 mois parce que la prise de Lisinopril Grindeks après le troisième mois de grossesse pourrait entraîner des dommages sérieux pour le bébé.

Allaitement :

Vous devez informer votre médecin si vous allaitez au sein ou si vous envisagez un allaitement au sein. Lisinopril Grindeks est déconseillé pour les mères qui allaitent au sein ; votre médecin peut vous prescrire un autre traitement si vous désirez allaiter, particulièrement si votre bébé est un nouveau-né ou un prématuré.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

- Certaines personnes ont des vertiges ou se sentent fatiguées quand elles prennent ce médicament. Si vous ressentez ces symptômes, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines.
- Vous devez attendre de voir les effets du médicament avant d'essayer ces activités.

3. Comment utiliser Lisinopril Grindeks

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions fournies dans cette notice ou celles de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Lorsque vous avez commencé à prendre Lisinopril Grindeks, votre médecin peut effectuer des analyses de sang. Votre médecin pourra alors ajuster la dose de médicament qui vous convient.

Prise du médicament

- Avalez le comprimé avec un verre d'eau.
- Essayez de prendre les comprimés à la même heure chaque jour. Vous pouvez prendre Lisinopril Grindeks avant ou après des repas, cela n'a pas d'importance.
- Continuez à prendre Lisinopril Grindeks aussi longtemps que votre médecin vous le demande ; c'est un traitement à long terme. Il est important de continuer à prendre Lisinopril Grindeks chaque jour.

Prise de la première dose

- Faites particulièrement attention lors de votre première prise de Lisinopril Grindeks ou lors d'augmentation de la dose. Cela peut provoquer une baisse de la pression artérielle plus importante que les doses ultérieures.
- Cela peut entraîner des vertiges ou des étourdissements. Le cas échéant, il peut être utile de vous allonger. Si vous êtes concerné(e), parlez-en à votre médecin dès que possible.

Adultes

Votre dose dépend de votre affection et de la prise éventuelle d'autres médicaments. Votre médecin vous indiquera le nombre de comprimés à prendre chaque jour. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour l'hypertension

- La posologie de départ recommandée est de 10 mg une fois par jour.
- La posologie d'entretien habituelle est de 20 mg une fois par jour.

Pour l'insuffisance cardiaque

- La posologie de départ recommandée est de 2,5 mg une fois par jour.
- La posologie d'entretien est de 5 à 35 mg une fois par jour.

Après une crise cardiaque

- La posologie initiale recommandée est de 5 mg dans les 24 heures qui suivent la crise cardiaque et de 5 mg le lendemain.
- La posologie d'entretien habituelle est de 10 mg une fois par jour.

Pour les problèmes rénaux causés par le diabète

- La dose recommandée est de 10 ou 20 mg une fois par jour.

Si vous êtes âgé(e), si vous avez des problèmes rénaux ou si vous prenez des médicaments diurétiques, votre médecin peut vous donner une dose plus faible que la dose habituelle.

Utilisation chez les enfants et les adolescent(e)s (6 à 16 ans) avec hypertension

- Lisinopril Grindeks est déconseillé chez les enfants de moins de 6 ans et chez les enfants qui présentent des problèmes rénaux graves.
- Le médecin déterminera la dose correcte pour votre enfant. La dose dépend du poids corporel de l'enfant.
- Pour les enfants de 20 à 50 kg, la dose initiale recommandée est de 2,5 mg une fois par jour.
- Pour les enfants de plus de 50 kg, la dose initiale recommandée est de 5 mg une fois par jour.

Si vous avez pris plus de Lisinopril Grindeks que vous n'auriez dû

Si vous avez pris une dose de Lisinopril Grindeks supérieure à celle prescrite par votre médecin, contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital. Les effets les plus probables sont les vertiges et les palpitations.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Lisinopril Grindeks, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Lisinopril Grindeks

- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez cette dose dès que vous remarquez l'oubli. Cependant, si c'est presque le moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Lisinopril Grindeks

N'arrêtez pas de prendre vos comprimés, même si vous vous sentez bien, sauf si votre médecin vous le demande.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous présentez une des réactions suivantes, **arrêtez de prendre le Lisinopril Grindeks et consultez immédiatement votre médecin :**

- Réactions allergiques sévères (rare, affecte 1 à 10 patients sur 10 000). Les signes peuvent inclure l'apparition soudaine de :
 - Gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge. Cela peut rendre la déglutition difficile.
 - Gonflement sévère ou soudain des mains, des pieds et des chevilles.
 - Difficulté respiratoire.

- Démangeaisons sévères de la peau. (avec plaques).
- Troubles cutanés graves, comme une éruption soudaine et inattendue ou une peau brûlante, rouge ou qui décolle (très rare, affecte moins de 1 patient sur 10 000).
- Infection avec des symptômes comme de la fièvre et une détérioration grave de l'état général, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale comme des lésions de la gorge, du pharynx ou de la bouche, ou des problèmes urinaires (très rare, affecte moins de 1 patient sur 10 000).

Autres effets secondaires possibles :

Fréquent (affecte 1 à 10 patients sur 100)

- Mal de tête.
- Sensation de vertiges ou d'étourdissement, particulièrement en se mettant debout rapidement.
- Diarrhée.
- Toux sèche persistante.
- Vomissements.
- Problèmes rénaux (indiqués par une analyse de sang).

Fréquent (affecte 1 à 10 patients sur 1 000)

- Altérations de l'humeur.
- Changement de coloration des doigts ou des orteils (bleu pâle suivi d'une rougeur) ou engourdissement ou picotement des doigts ou des orteils.
- Altérations du goût.
- Sensation de somnolence.
- Sensation de tournoiement (vertige).
- Troubles du sommeil.
- Accident vasculaire cérébral.
- Augmentation de la fréquence cardiaque.
- Écoulement nasal.
- Nausées.
- Mal de ventre ou indigestion.
- Éruption cutanée ou démangeaisons.
- Incapacité d'obtenir une érection (impuissance).
- Sensation de fatigue ou sensation de faiblesse (manque de force).
- Une très forte baisse de la pression sanguine peut survenir chez les personnes qui présentent les conditions suivantes : maladie des artères coronaires ; rétrécissement de l'aorte (une artère qui part du cœur), de l'artère rénale ou de valves cardiaques ; augmentation de l'épaisseur du muscle cardiaque. Le cas échéant, vous pourriez avoir des vertiges ou la tête qui tourne, en particulier quand vous vous mettez debout rapidement.
- Modifications des résultats des analyses de sang qui permettent de surveiller la fonction du foie et des reins.
- Crise cardiaque.
- Hallucinations visuelles et auditives.

Rare (affecte 1 à 10 patients sur 10 000)

- Sensation de confusion.
- Éruption cutanée en plaques (urticaire).
- Sécheresse de la bouche.
- Chute des cheveux.
- Psoriasis (maladie de la peau).
- Altérations du goût.
- Développement des seins chez l'homme.
- Modifications de certaines des cellules ou d'autres composants du sang. Votre médecin peut effectuer de temps en temps des prélèvements sanguins pour vérifier si Lisinopril Grindeks a un effet sur votre sang. Les signes peuvent être les suivants : sensation de fatigue, peau pâle, mal de gorge, température élevée (fièvre), douleurs articulaires et musculaires, gonflement des articulations ou de ganglions, ou sensibilité à la lumière du soleil.

- Diminution du taux sanguin de sodium (les symptômes peuvent être de la fatigue, un mal de tête, des nausées, des vomissements).
- Insuffisance rénale soudaine.

Très rare (affecte moins de 1 patient sur 10 000)

- Sinusite (sensation de douleur et d'encombrement derrière les joues et les yeux).
- Respiration sifflante.
- Faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie). Les signes peuvent être les suivants : sensation de faim ou de faiblesse, sudation et fréquence cardiaque rapide.
- Inflammation des poumons. Les signes sont la toux, l'essoufflement et une température élevée (fièvre).
- Jaunissement de la peau et du blanc des yeux (jaunisse).
- Inflammation du foie. Cela peut entraîner une perte d'appétit, un jaunissement de la peau et des yeux, et des urines foncées.
- inflammation du pancréas. Cela provoque une douleur modérée à sévère dans le ventre.
- Affections graves de la peau. Les symptômes sont la rougeur, la formation de cloques et le décollement de la peau.
- Sudation.
- Diminution de la production d'urine ou absence d'urine.
- Insuffisance hépatique.
- Nodules.
- Inflammation de l'intestin.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Symptômes de dépression.
- Syncope.

Les effets secondaires chez les enfants semblent être similaires à ceux observés chez les adultes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 BRUXELLES Madou, Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be e-mail : adr@afmps.be. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Lisinopril Grindeks

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Lisinopril Grindeks 5 mg comprimé :

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

Lisinopril Grindeks 10 mg comprimé et Lisinopril Grindeks 20 mg comprimé :

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Lisinopril Grindeks

- La substance active est le lisinopril (sous forme de dihydrate). Chaque comprimé contient 5 mg, 10 mg ou 20 mg de lisinopril (sous forme de dihydrate).
- Les autres composants sont les suivants : hydrogénophosphate de calcium (E341) ; amidon de maïs ; mannitol (E421) ; crospovidone (E1202) ; silice colloïdale anhydre (E551) ; stéarate de magnésium (E572).

Comment se présente Lisinopril Grindeks et contenu de l'emballage extérieur

Lisinopril Grindeks 5 mg comprimé : comprimés blancs, ronds, non enrobés, à bords biseautés, de 6 mm de diamètre.

Lisinopril Grindeks 10 mg comprimé : comprimés blancs, ronds, non enrobés, à bords biseautés avec double barre de cassure sur une face, de 8 mm de diamètre. La barre de cassure permet seulement de faciliter la prise du comprimé, elle ne le divise pas en doses égales.

Lisinopril Grindeks 20 mg comprimé : comprimés blancs, ronds, non enrobés, à bords biseautés avec barre de cassure sur une face, de 10 mm de diamètre. La barre de cassure permet seulement de faciliter la prise du comprimé, elle ne le divise pas en doses égales.

Les comprimés de Lisinopril Grindeks sont disponibles dans des boîtes en carton contenant des plaquettes thermoformées en aluminium/PVC/PVDC de 14, 28, 30, 56, 60, 84 ou 98 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lettonie

Tél. : +371 67083205

Fax : +371 67083505

E-mail : grindeks@grindeks.lv

Numéros de l' Autorisation de Mise sur le Marché

Lisinopril Grindeks 5 mg comprimé= BE661163

Lisinopril Grindeks 10 mg comprimé= BE661164

Lisinopril Grindeks 20 mg comprimé= BE661165

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace économique européen sous les noms suivants :

Autriche	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten
Belgique	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimés
Bulgarie	Лизиноприл Гриндекс 5 mg, 10 mg, 20 mg таблетки
Espagne	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tablets
Estonie	Lisinopril Grindeks
Finlande	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit
France	Lisinopril Grindeks 5 mg comprimé Lisinopril Grindeks 10 mg comprimé Lisinopril Grindeks 20 mg comprimé
Grèce	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg δισκία
Hongrie	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tableta
Irlande	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tablets
Italie	Lisinopril Grindeks
Pologne	Lisinopril Grindeks
Portugal	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimidos
Roumanie	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimate
Slovaquie	Lisinopril Grindeks 5 mg, 10 mg, 20 mg tablety

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 02/2023.