

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Echinaceae purpurea

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen und wofür wird es angewendet ?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen beachten?
3. Wie ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen und wofür wird es angewendet ?

Echinaforcedmed ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der Symptome einer Erkältung.

Die Einnahme dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Echinaforcedmed ist bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahre angezeigt.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen beachten?

**Echinaforcedmed darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie allergisch gegen Echinaceae purpurea oder andere Pflanzen der Asteraceae-Familie (Korbblütler) sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinaforcedmed einnehmen.

- Wenn Sie an bestimmten progressiven systemischen Erkrankungen leiden (chronische Erkrankung einiger Organe oder des gesamten Körpers, die immer schwerer wird), Autoimmunerkrankungen (Krankheit, bei der der Körper die körpereigenen Zellen als fremd betrachtet), Immundefekten (ein

nicht oder nicht funktionierendes Immunsystem), Immunsuppression (Unterdrückung der natürlichen Abwehrreaktionen gegen körpereigene Substanzen) und Erkrankungen der weißen Blutkörperchen.

- Bei Verschlimmerung der Symptome oder hohem Fieber während der Einnahme von Echinaforcedmed sollte ein Arzt hinzugezogen werden.
- Wenn Sie eine genetische Veranlagung für eine Allergie haben, sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Ihren Arzt konsultieren.

### **Kinder**

Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

### **Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Es liegen keine Berichte über Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vor.

### **Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Echinaforcedmed kann zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken verwendet werden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### **Echinaforcedmed enthält Sucrose.**

Bitte nehmen Sie Echinaforcedmed erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Enthält 4,121 g Sucrose pro 5 ml. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

## **3. Wie ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### Die empfohlene Dosis beträgt:

*Kinder über 12 Jahre, Erwachsene und ältere Menschen:*

Tage 1 bis 3: 5 x täglich 5 ml einnehmen.

Tage 4 bis 10: 3 x täglich 5 ml einnehmen.

### **Anwendung bei Kindern**

Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Nur zum Einnehmen. Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein.

Vor Gebrauch schütteln.

Echinaforcedmed muss in 150 ml warmem Wasser aufgelöst werden. Vor dem Trinken rühren.

Beginnen Sie die Behandlung bei den ersten Anzeichen.

Wenn die Symptome länger als 10 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforcedmed eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforcedmed haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis eingenommen haben, sind im Allgemeinen keine Nebenwirkungen zu erwarten.

**Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben und nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein.

**Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed abbrechen**

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Einnahme dieses Arzneimittels abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Haut

Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Nesselsucht, Juckreiz, Anschwellen des Gesichts. Angioödem der Haut (plötzliche Ansammlung von Flüssigkeit in der Haut und Schleimhäuten (z. B. Hals oder Zunge), Atembeschwerden und/oder Juckreiz und Hautausschlag).

Allergische Reaktionen

Allergische Reaktionen in Höhe der Lunge, Bronchospasmen mit Obstruktion, Asthma.

Stevens-Johnson-Syndrom (schwere allergische Reaktion mit hohem Fieber, Blasenbildung auf der Haut, Gelenkschmerzen und/oder Augenentzündung).

Anaphylaktischer Schock (schwere allergische Reaktion auf bestimmte Substanzen, bei denen starker Blutdruckabfall, Blässe, Unruhe, schwacher schneller Puls, kalte und feuchte Haut und Bewusstseinsstörung infolge einer plötzlichen, starken Gefäßerweiterung auftreten).

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

B-1000 BRÜSSEL Madou

Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)

E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Echinaforcedmed Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern . Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).  
Nach dem Öffnen der Packung innerhalb eines Monats verwenden.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach <EXP> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Echinaforced enthält**

- Der Wirkstoff ist ein Extrakt aus der Pflanze und Wurzel von Echinacea purpurea (Purpur-Sonnenhut).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Saccharose, gereinigtes Wasser, konzentrierter Holunderbeerensaft, Zitronensäure-Monohydrat, modifizierte Stärke, mittelkettige Triglyceride, Kaliumsorbat.

### **Wie Echinaforced aussieht und Inhalt der Packung**

Echinaforced ist eine dunkelrote bis dunkelviolette klebrige Flüssigkeit mit einem aromatischen fruchtigen Holunderduft und einem aromatischen, fruchtigen, süßen, leicht sauren Geschmack.

Dieses Arzneimittel ist in Flaschen zu 100 ml verpackt.

### **Registrierungsinhaber und Hersteller**

#### Registrierungsinhaber

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54 Bus 7  
3560 Lummen  
Belgien  
Tel.: +32 (0) 13 35 89 40  
Fax: +32 (0) 13 52 39 41  
info@avogel.be

#### Hersteller

A.Vogel BV  
J.S. Broekhovenstraat 16  
8081 HC Elburg  
Niederlande  
Tel.: +31 (0) 525 687200  
Fax: +31 (0) 525 683932  
[registratie@avogel.nl](mailto:registratie@avogel.nl)

### **Registrierungsnummer**

BE-TU661454

### **Art der Abgabe**

Apothekenpflichtig.

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung.

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/2023.**