

## Notice : Information de l'utilisateur

### Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable

Echinaceae purpurea

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez fortement un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable, et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable
3. Comment utiliser Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce qu'Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable, et dans quel cas est-il utilisé

Echinaforcedmed est un médicament traditionnel à base de plantes, destiné à soulager les symptômes du rhume.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes à utiliser selon l'indication spécifiée uniquement sur la base d'une utilisation à long terme.

Echinaforcedmed est indiqué chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable

##### N'utilisez jamais Echinaforcedmed:

- Si vous êtes allergique à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à Echinacea purpurea ou à d'autres plantes de la famille des Asteraceae (Composées).

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Echinaforcedmed.

- Si vous souffrez de certaines maladies systémiques évolutives (maladie chronique touchant plusieurs organes ou le corps entier, qui s'aggrave de plus en plus), de certaines maladies auto-immunes (maladie dans laquelle l'organisme considère ses propres cellules comme étrangères), d'immunodéficience (votre système immunitaire ne fonctionne pas ou pas correctement), d'immunosuppression (inhibition des défenses naturelles contre les propres substances de l'organisme) ou de certaines maladies du système des globules blancs.
- Si les symptômes s'aggravent ou si vous développez une fièvre élevée pendant le traitement par Echinaforcemed, vous devez consulter un médecin.
- Si vous avez une prédisposition héréditaire à une allergie, vous devez consulter votre médecin avant de commencer à utiliser Echinaforcemed.

### **Enfants**

L'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

### **Autres médicaments et Echinaforcemed**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament qu'Echinaforcemed.

Aucune interaction avec d'autres médicaments n'a été rapportée.

### **Echinaforcemed avec des aliments et des boissons**

Echinaforcemed peut être utilisé en association avec des aliments et des boissons.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

L'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'est pas recommandée.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Les effets du médicament sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

### **Echinaforcemed contient du sucrose**

Si votre médecin vous a informé(e) que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Contient 4,121 g de saccharose par 5 ml. Ceci est à prendre en compte pour les patients atteints de diabète sucré.

## **3. Comment utiliser Echinaforcemed solution à diluer pour solution buvable**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de :

*Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées :*

Jour 1 à 3 : Prendre 5 ml 5 fois par jour.

Jour 4 à 10 : Prendre 5 ml 3 fois par jour.

### **Utilisation chez les enfants**

L'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Exclusivement par voie orale. Ne pas dépasser la dose recommandée.

Agiter avant emploi.

Echinaforcemed doit être dissous dans 150 ml d'eau chaude. Mélanger avant de boire.

Commencer le traitement dès les premiers symptômes.

Si les symptômes persistent pendant plus de 10 jours, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous avez utilisé plus d'Echinaforcedmed que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé trop d'Echinaforcedmed, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous avez utilisé plus que la dose recommandée, aucun effet indésirable n'est généralement attendu.

**Si vous oubliez d'utiliser Echinaforcedmed**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre et prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

**Si vous arrêtez d'utiliser Echinaforcedmed**

Aucun effet n'est attendu si vous arrêtez d'utiliser ce médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Peau

Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.

Angioedème cutané (accumulation soudaine de liquide dans la peau et les muqueuses, par exemple dans la gorge ou la langue, difficultés respiratoires et/ou démangeaisons et éruption cutanée).

Réactions allergiques

Réactions allergiques au niveau des poumons, bronchospasmes avec obstruction, asthme.

Syndrome de Stevens-Johnson (réaction allergique sévère avec fièvre élevée, cloques sur la peau, douleurs articulaires et/ou inflammation oculaire).

Choc anaphylactique (réaction allergique sévère à certaines substances, entraînant une forte baisse de la pression artérielle, une pâleur, une agitation, un pouls rapide et faible, une peau moite et une diminution de la conscience à la suite d'une vasodilatation soudaine et forte).

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Boîte postale 97

B-1000 BRUXELLES Madou

Site Internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

E-mail : [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. Comment conserver Echinaforcedmed solution à diluer pour solution buvable**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Après ouverture, conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C).

Utiliser dans le mois suivant l'ouverture de l'emballage.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage, après EXP. Un mois et une année sont indiqués. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

## **6. Contenu de l'emballage et autres informations**

### **Ce que contient Echinaforcemed**

- La substance active est un extrait de la plante et de la racine d'Echinacea purpurea (échinacée pourpre).
- Les autres composants (excipients) sont le sucrose, l'eau purifiée, le jus concentré de baies de sureau, l'acide citrique monohydraté, l'amidon modifié, les triglycérides à chaîne moyenne, le sorbate de potassium.

### **Comment se présente Echinaforcemed et contenu de l'emballage extérieur**

Echinaforcemed est un liquide visqueux de couleur rouge foncé à violet foncé, à l'odeur aromatique fruitée évoquant le sureau et au goût aromatique fruité, sucré et légèrement acide.

Ce médicament est conditionné en flacons de 100 ml.

### **Titulaire de l'enregistrement et fabricant**

#### Titulaire de l'enregistrement

A.Vogel S.A.  
Bosstraat 54 bus 7  
3560 Lummen  
Belgique  
Tél. : +32 (0) 13 35 89 40  
Fax : +32 (0) 13 52 39 41  
info@avogel.be

#### Fabricant

A.Vogel BV  
J.P. Broekhovenstraat 16  
8081 HC Elburg  
Pays-Bas  
Tél. : +31 (0) 525 687200  
Fax : +31 (0) 525 683932  
[registratie@avogel.nl](mailto:registratie@avogel.nl)

### **Numéro de l'enregistrement**

BE-TU661454

### **Mode de délivrance**

Médicament non soumis à prescription médicale.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec votre médecin ou pharmacien.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2023.**

