

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Echinaforcedmed Tabletten**

Echinaceae purpurea

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was sind Echinaforcedmed Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Tabletten beachten?
3. Wie sind Echinaforcedmed Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Echinaforcedmed Tabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind Echinaforcedmed Tabletten und wofür wird es angewendet?**

Echinaforcedmed Tabletten ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung der Symptome einer Erkältung.

Die Einnahme dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels im genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Echinaforcedmed Tabletten sind bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahre angezeigt.

Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Tabletten beachten?**

##### **Echinaforcedmed darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
- wenn Sie allergisch gegen Echinaceae purpurea oder andere Pflanzen der Asteraceae-Familie (Korbblütler) sind;
- wenn Sie allergisch gegen Erdnüsse oder Soja sind.

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

- Wenn Sie an bestimmten progressiven systemischen Erkrankungen leiden (chronische Erkrankung einiger Organe oder des gesamten Körpers, die immer schwerer wird), Autoimmunerkrankungen (Krankheit, bei der der Körper die körpereigenen Zellen als fremd betrachtet), Immundefekten (ein nicht oder nicht funktionierendes Immunsystem), Immunsuppression (Unterdrückung der natürlichen Abwehrreaktionen gegen körpereigene Substanzen) und Erkrankungen der weißen Blutkörperchen.
- Bei Verschlimmerung der Symptome oder hohem Fieber während der Einnahme von Echinaforcedmed ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.
- Wenn Sie eine genetische Veranlagung für eine Allergie haben, sollten Sie vor der Einnahme von Echinaforcedmed Ihren Arzt konsultieren.

### **Kinder**

Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

### **Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Es liegen keine Berichte über Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vor.

### **Einnahme von Echinaforcedmed zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Echinaforcedmed kann zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken angewendet werden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### **Echinaforcedmed enthält Lactose.**

Bitte nehmen Sie Echinaforcedmed erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **Echinaforcedmed enthält Soja-Polysaccharide**

Es darf nicht eingenommen/angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Erdnuss oder Soja sind.

## **3. Wie sind Echinaforcedmed Tabletten einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### Die empfohlene Dosis beträgt:

*Kinder über 12 Jahre, Erwachsene und ältere Menschen:*

- 2 bis 3 x täglich 1 Tablette.

### **Anwendung bei Kindern**

Die Einnahme durch Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Nur zum Einnehmen. Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein.  
Vor der Mahlzeit mit etwas Wasser einnehmen.

Wenn die Symptome länger als 10 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforcedmed eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie eine größere Menge von Echinaforcedmed haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

**Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, und nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein.

**Wenn Sie die Einnahme von Echinaforcedmed abbrechen**

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Einnahme dieses Arzneimittels abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Haut

Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Nesselsucht, Juckreiz, Anschwellen des Gesichts. Angioödem der Haut (plötzliche Ansammlung von Flüssigkeit in der Haut und Schleimhäuten, z. B. im Hals oder in der Zunge, kann zu Engegefühl und/oder Schwellungen führen).

Allergische Reaktionen

Allergische Reaktionen in Höhe der Lunge, Bronchospasmen mit Obstruktion, Asthma.

Stevens-Johnson-Syndrom (schwere allergische Reaktion mit hohem Fieber, Blasenbildung auf der Haut, Gelenkschmerzen und/oder Augenentzündung).

Anaphylaktischer Schock (schwere allergische Reaktion auf bestimmte Substanzen, bei denen starker Blutdruckabfall, Blässe, Unruhe, schwacher schneller Puls, kalte und feuchte Haut und Bewusstseinsstörung infolge einer plötzlichen, starken Gefäßerweiterung auftreten).

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

Postfach 97

B-1000 BRÜSSEL Madou

Website: [www.notifierunefetindesirable.be](http://www.notifierunefetindesirable.be)

E-Mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie sind Echinaforcedmed Tabletten aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.  
Nach dem Öffnen der Packung innerhalb von 7 Monaten aufbrauchen.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach <EXP> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Echinaforcedmed enthält**

- Der Wirkstoff ist ein Extrakt aus der Pflanze und der Wurzel von Echinacea purpurea (Purpur-Sonnenhut).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose, Stärke, Soja-Polysaccharide und Magnesiumstearat.

### **Wie Echinaforcedmed aussieht und Inhalt der Packung**

Echinaforcedmed sind runde, bikonvexe Tabletten mit einem abgeschrägten Rand und einem aromatischen Duft sowie einem aromatischen, süßen und betäubenden Geschmack.

Dieses Arzneimittel ist in Flaschen mit 30 und 40 Tabletten verpackt.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Registrierungsinhaber und Hersteller**

#### Registrierungsinhaber

A. Vogel N.V.  
Bosstraat 54 Bus 7  
3560 Lummen  
Belgien  
Tel.: +32 (0) 13 35 89 40  
Fax: +32 (0) 13 52 39 41  
info@avogel.be

#### Hersteller

A.Vogel BV  
J.S. Broekhovenstraat 16  
8081 HC Elburg  
Niederlande  
Tel.: +31 (0) 525 687200  
Fax: +31 (0) 525 683932  
[registratie@avogel.nl](mailto:registratie@avogel.nl)

#### **Registrierungsnummer**

BE-TU661456

#### **Art der Abgabe**

Apothekenpflichtig.

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung.

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/2023.**