

Notice : Information de l'utilisateur

Echinaforcedmed comprimés

Echinaceae purpurea

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez fortement un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Echinaforcedmed comprimés et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcedmed comprimés
3. Comment utiliser Echinaforcedmed comprimés
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Echinaforcedmed comprimés
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Echinaforcedmed comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?

Echinaforcedmed comprimés, est un médicament traditionnel à base de plantes, destiné à soulager les symptômes du rhume.

Ce produit est un médicament traditionnel à base de plantes à utiliser selon l'indication spécifiée uniquement sur la base d'une utilisation à long terme.

Echinaforcedmed comprimés, est indiqué chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Echinaforcedmed comprimés ?

N'utilisez jamais Echinaforcedmed

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à Echinacea purpurea ou à d'autres plantes de la famille des Asteraceae (Composées).
- Si vous êtes allergique aux arachides ou au soja.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

- Si vous souffrez de certaines maladies systémiques évolutives (maladie chronique touchant plusieurs organes ou le corps entier, qui s'aggrave de plus en plus), de certaines maladies auto-immunes (maladie dans laquelle l'organisme considère ses propres cellules comme étrangères), d'immunodéficience (votre système immunitaire ne fonctionne pas ou pas correctement), d'immunosuppression (inhibition des défenses naturelles contre les propres substances de l'organisme) ou de certaines maladies du système des globules blancs.
- Si les symptômes s'aggravent ou si vous développez une fièvre élevée pendant l'utilisation d'Echinaforcemed, vous devez consulter un médecin.
- Si vous avez une prédisposition héréditaire à une allergie, vous devez consulter votre médecin avant de commencer à utiliser Echinaforcemed.

Enfants

L'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Autres médicaments et Echinaforcemed

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Aucune interaction avec d'autres médicaments n'a été rapportée.

Echinaforcemed avec des aliments et des boissons

Echinaforcemed peut être utilisé en association avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

L'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement n'est pas recommandée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les effets du médicament sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

Echinaforcemed contient du lactose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Echinaforcemed contient des polysaccharides de soja

Si vous êtes allergique à l'arachide ou au soja, ne pas utiliser ce médicament.

3. Comment utiliser Echinaforcemed comprimés ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de :

Enfants de plus de 12 ans, adultes et personnes âgées :

- 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants

L'utilisation chez l'enfant de moins de 12 ans n'est pas recommandée.

Exclusivement par voie orale. Ne pas dépasser la dose recommandée.
Prendre avant le repas, avec un peu d'eau.

Si les symptômes persistent pendant plus de 10 jours, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus d'Echinaforcemed que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop d'EchinaforceMED, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Echinaforcemed

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre et prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Si vous arrêtez d'utiliser Echinaforcemed

Aucun effet n'est attendu si vous arrêtez d'utiliser ce médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Peau

Réactions d'hypersensibilité telles qu'une éruption cutanée, une urticaire, des démangeaisons et un gonflement du visage.

Angioedème cutané (accumulation soudaine de liquide dans la peau et les muqueuses, par exemple dans la gorge ou la langue, pouvant entraîner une oppression et/ou un gonflement).

Réactions allergiques

Réactions allergiques au niveau des poumons, bronchospasmes avec obstruction, asthme.

Syndrome de Stevens-Johnson (réaction allergique sévère avec fièvre élevée, cloques sur la peau, douleurs articulaires et/ou inflammation oculaire).

Choc anaphylactique (réaction allergique sévère à certaines substances, entraînant une forte baisse de la pression artérielle, une pâleur, une agitation, un pouls rapide et faible, une peau moite et une diminution de la conscience à la suite d'une vasodilatation soudaine et forte).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Boîte postale 97

B-1000 BRUXELLES Madou

Site Internet : www.notifieruneffetindesirable.be

E-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Echinaforcemed comprimés

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Utiliser dans les 7 mois suivant l'ouverture de l'emballage.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage, après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Echinaforcemed

La substance active est un extrait de la plante et de la racine d'Echinacea purpurea (échinacée pourpre).

- Les autres composants (excipients) sont le lactose, l'amidon, les polysaccharides de soja et le stéarate de magnésium.

Comment se présente Echinaforcemed et contenu de l'emballage extérieur

Echinaforcemed se présente sous forme de comprimés ronds, biconvexes, à bord biseauté, à l'odeur aromatique et au goût aromatique, sucré et anesthésiant.

Ce médicament est conditionné en flacons contenant 30 ou 40 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Titulaire de l'enregistrement

A.Vogel S.A.

Bosstraat 54 boîte 7

3560 Lummen

Belgique

Tél. : +32 (0) 13 35 89 40

Fax : +32 (0) 13 52 39 41

info@avogel.be

Fabricant

A.Vogel BV

J.P. Broekhovenstraat 16

8081 HC Elburg

Pays-Bas

Tél. : +31 (0) 525 687200

Fax : +31 (0) 525 683932

registratie@avogel.nl

Numéro d'enregistrement

BE-TU661456

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec votre médecin ou pharmacien.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2023.