Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

OSTEOCYNESINE orodispergeerbare tabletten
Calcarea carbonica ostrearum 3 DH, Calcarea fluorica 3 DH,
Calcarea phosphorica 3 DH, Sulfur iodatum 4 CH

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 1 maand niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die traditioneel gebruikt worden tijdens de groeiperiode, gevolgen van breuken en stoornissen van het calciummetabolisme.
Dit geneesmiddel kan worden gebruikt op voorwaarde dat een ernstige pathologie vooraf door een arts is uitgesloten

2. Wanneer mag u OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u OSTEOCYNESINE niet gebruiken?
Wanneer u allergisch bent aan één van de actieve bestanddelen of aan een ander bestanddeel aanwezig in het geneesmiddel, vermeld in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Dit geneesmiddel kan worden gebruikt op voorwaarde dat een ernstige pathologie vooraf door een arts is uitgesloten.

Kinderen
Dit geneesmiddel is ook aangewezen voor gebruik door kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast OSTEOCYNESINE nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er bestaan geen gegevens over het gebruik van OSTEOCYNESINE bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er wordt geen enkele bijwerking, te wijten aan de werkzame bestanddelen, verwacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding wegens hun graad van verdunning. Voor zover actueel gekend mag OSTEOCYNESINE gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
OSTEOCYNESINE heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

OSTEOCYNESINE bevat lactose en natrium
Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1mmol natrium (23mg) per tablet, d.w.z. in wezen “natriumvrij”.

3. Hoe gebruikt u OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Volwassenenen en kinderen: 2 tabletten per dag.

Wijze van toediening: Sublinguale toediening. De tabletten onder de tong laten smelten. De tablet kan opgelost worden in een beetje water om de toediening bij kinderen jonger dan 2 jaar te vergemakkelijken.

Behandelingsduur: De behandelingsduur is 1 maand, hernieuwbaar.

Heeft u te veel OSTEOCYNESINE ingenomen?
Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zijn bijgevolg geen bijwerkingen te verwachten.
Wanneer u te veel van OSTEOCYNESINE heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten OSTEOCYNESINE in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van OSTEOCYNESINE
Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

België:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
Postbus 97
1000 BRUSSEL
Madou
Website: **www.eenbijwerkingmelden.be**
e-mail: **adr@fagg.be**

Luxemburg:
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments
Tél. : (+352) 2478 5592
E-mail : **pharmacovigilance@ms.etat.lu**
Link voor het formularium :
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u OSTEOCYNESINE, orodispergeerbare tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Dit geneesmiddel moet bewaard worden op een temperatuur die niet hoger is dan 30°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in OSTEOCYNESINE?

- **De werkzame stoffen zijn:**

Calcarea carbonica ostrearum	3 DH	0,625 mg
Calcarea fluorica	3 DH	0,625 mg
Calcarea phosphorica	3 DH	0,625 mg
Sulfur iodatum	4 CH	0,625 mg

Voor een orodispergeerbare tablet van 250 mg.

- **De andere stoffen zijn:** Lactose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat

Hoe ziet OSTEOCYNESINE er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Orodispergeerbare tabletten in blisterverpakking (PVC/Aluminium) in een doos van 60 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE661444

Wijze van aflevering

Vrije aflevering

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 05/2023.