

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Ubichinon compositum Injektionslösung

Acetylsalicylicum acidum D10, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Anthraquinone D10, Ascorbicum acidum D6, Coenzyme A D10, Coenzyme Q D10, Colchicum autumnale D4, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Histaminum D10, Hydrastis canadensis D4, Hydroquinone D8, Magnesium gluconicum D10, Manganum phosphoricum D8, Naphthoquinone D10, Natrium diethyloxalacetikum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D10, Nicotinamidum D6, Para-benzoquinonum D10, Podophyllum peltatum D4, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Sarcosyl acidum D6, Sulphur D8, Thiaminum hydrochloridum D6, Thiocitricum acidum D8, Trichinoyl D10, Vaccinium myrtillus D4

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Ubichinon compositum Injektionslösung und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ubichinon compositum Injektionslösung beachten?
3. Wie ist Ubichinon compositum Injektionslösung anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ubichinon compositum Injektionslösung aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Ubichinon compositum Injektionslösung und wofür wird es angewendet?

Ubichinon compositum ist ein homöopathisches Arzneimittel mit Bestandteilen, die traditionell zur Unterstützung des Zellstoffwechsels verwendet werden.

Dieses homöopathische Arzneimittel wird entsprechend den Grundsätzen der bioregulatorischen Medizin angewendet.

Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Ubichinon compositum Injektionslösung beachten?

Ubichinon compositum darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6. genannten Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Ubichinon compositum anwenden.

Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre

Dieses Arzneimittel darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Ubichinon compositum zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.
Es wurden keine Wechselwirkungen gemeldet und aufgrund der homöopathischen Verdünnungen sind sie nicht zu erwarten.

Anwendung von Ubichinon compositum zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Soweit bekannt, kann dieses Arzneimittel zusammen mit Speisen und Getränken eingenommen werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Für die in diesem Arzneimittel enthaltenen homöopathisch verdünnten Substanzen sind keine schädlichen Wirkungen auf Schwangerschaft und Stillzeit bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurde kein Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen gemeldet. Sie ist auch nicht aufgrund der homöopathischen Verdünnungen zu erwarten.

Ubichinon compositum enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosis, d.h. es ist nahezu "natriumfrei".

3. Wie ist Ubichinon compositum Injektionslösung anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Ubichinon compositum ist eine Injektionslösung, die von einem Arzt verabreicht wird.
Die Lösung wird intramuskulär (in einen Muskel), subkutan (unter die Haut) oder intradermal (in die Haut) injiziert.

Dosierung für Erwachsene:


Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1- bis 3-mal wöchentlich 1 Ampulle.

Dosierung für Kinder:

Jugendliche von 12 bis 18 Jahren

Bei akuten Beschwerden täglich, sonst 1- bis 3-mal wöchentlich 1 Ampulle.

Anweisungen zum Öffnen der Ampulle:



Halten Sie die Ampulle aufrecht, so dass der farbige Punkt nach vorne zeigt. Klopfen Sie die eventuell im Ampullenspieß enthaltene Lösung nach unten. Legen Sie den Daumen auf den farbigen Punkt und drücken Sie den Ampullenspieß von sich weg, bis der Hals der Ampulle bricht.
Übriggebliebener Inhalt sollte nicht mehr verwendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Ubichinon compositum angewendet haben, als Sie sollten

Gemäß der Lehre der Homöopathie steht die Wirkung mehr mit dem Verdünnungsgrad, als mit der Dosierung im Zusammenhang. Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis von Ubichinon compositum anwenden, wird die Wirkung daher nicht stärker sein.

Wenn Sie eine größere Menge von Ubichinon compositum angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Ubichinon compositum vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Ubichinon compositum abbrechen

Keine Anwendung.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
Postfach 97
1000 BRÜSSEL Madou
Website: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Ubichinon compositum Injektionslösung aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten zwei Ziffern geben den Monat an, die vier nächsten das Jahr. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Ubichinon compositum enthält

- Die Wirkstoffe in einer Ampulle zu 2,2 ml sind: Acetylsalicylicum acidum D10, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Anthraquinone D10, Ascorbicum acidum D6, Coenzyme A D10, Coenzyme Q D10, Colchicum autumnale D4, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Histaminum D10, Hydrastis canadensis D4, Hydroquinone D8, Magnesium gluconicum D10, Manganum phosphoricum D8, Naphthoquinone D10, Natrium diethylmalaceticum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D10, Nicotinamidum D6, Para-benzoquinonum D10, Podophyllum peltatum D4, Pyridoxinum hydrochloricum D6,

Sarcosyl acidum D6, Sulphur D8, Thiaminum hydrochloridum D6, Thioceticum acidum D8, Trichinoyl D10, Vaccinium myrtillus D4 à 22 mg.

- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.

Wie Ubichinon compositum aussieht und Inhalt der Packung

Injektionslösung.

Zur intramuskulären, subkutanen oder intradermalen Verabreichung.

Packung mit 10 Ampullen zu 2,2 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

E-mail: info@heel.be

Zulassungsnummer

HO-BE661646

Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 07/2023.