

Notice : information du patient

Ubichinon compositum solution injectable

Acetylsalicylicum acidum D10, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Anthraquinone D10, Ascorbicum acidum D6, Coenzyme A D10, Coenzyme Q D10, Colchicum autumnale D4, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Histaminum D10, Hydrastis canadensis D4, Hydroquinone D8, Magnesium gluconicum D10, Manganum phosphoricum D8, Naphthoquinone D10, Natrium diethyloxalaceticum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine dinucleotide D10, Nicotinamidum D6, Para-benzoquinonum D10, Podophyllum peltatum D4, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Sarcosolacticum acidum D6, Sulphur D8, Thiaminum hydrochloridum D6, Thioceticum acidum D8, Trichinoyl D10, Vaccinium myrtillus D4

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Ubichinon compositum solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ubichinon compositum solution injectable ?
3. Comment utiliser Ubichinon compositum solution injectable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ubichinon compositum solution injectable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Ubichinon compositum solution injectable et dans quel cas est-il utilisé ?

Ubichinon compositum est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés pour soutenir le métabolisme cellulaire.

Ce médicament homéopathique est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ubichinon compositum solution injectable ?

N'utilisez jamais Ubichinon compositum

- si vous êtes allergique à aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Ubichinon compositum.

Enfants jusqu'à 12 ans

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

Autres médicaments et Ubichinon compositum

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Aucune interaction n'a été signalée. Aucune n'est attendue en raison des dilutions homéopathiques.

Ubichinon compositum avec des aliments et boissons

Aucune interaction n'a été signalée. Pour autant que l'on sache, ce médicament peut être utilisé en association avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue lors de la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun effet sur l'aptitude à conduire et à utiliser des machines n'a été signalé et n'est pas non plus attendu en raison des dilutions homéopathique.

Ubichinon compositum contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par dose, c.à.d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment utiliser Ubichinon compositum solution injectable ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Ubichinon compositum est une solution injectable à administrer par un médecin.

La solution sera injectée par voie intramusculaire (dans un muscle), sous-cutanée (sous la peau) ou intradermique (dans la peau).

Posologie pour adultes :


En cas de plaintes aiguës une ampoule par jour, sinon une ampoule 1 à 3 fois par semaine.

Posologie pour population pédiatrique :

Adolescents de 12 à 18 ans :

En cas de plaintes aiguës une ampoule par jour, sinon une ampoule 1 à 3 fois par semaine.

Instructions pour l'ouverture de l'ampoule :



Tenez l'ampoule droite avec le point coloré face à vous. Tapotez la tête de l'ampoule jusqu'à ce que tout le liquide descende. Appuyez avec le pouce sur le point coloré. Cassez d'un coup sec le col de l'ampoule en exerçant une pression dans la direction opposée au point coloré.

N'utilisez pas les restes du contenu de l'ampoule.

Si vous avez utilisé plus de Ubichinon compositum que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous utilisiez plus d'Ubichinon compositum que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort.

Si vous avez utilisé trop d'Ubichinon compositum, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d'utiliser Ubichinon compositum

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Ubichinon compositum

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
1000 BRUXELLES Madou
Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Ubichinon compositum solution injectable

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine. Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations**Ce que contient Ubichinon compositum**

- Les substances actives d'un ampoule de 2,2 ml sont : Acetylsalicylicum acidum D10, Adenosinum triphosphoricum acidum D10, Anthraquinone D10, Ascorbicum acidum D6, Coenzyme A D10, Coenzyme Q D10, Colchicum autumnale D4, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Histaminum D10, Hydrastis canadensis D4, Hydroquinone D8, Magnesium gluconicum D10, Manganum phosphoricum D8, Naphthoquinone D10, Natrium diethyloxalaceticum D8, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Nicotinamide adenine

dinucleotide D10, Nicotinamidum D6, Para-benzoquinonum D10, Podophyllum peltatum D4, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Sarcosine D6, Sulphur D8, Thiaminum hydrochloridum D6, Thioceticum acidum D8, Trichinoyl D10, Vaccinium myrtillus D4 à 22 mg.

- Les autres composants (excipients) sont : le chlorure de sodium et l'eau pour préparations injectable.

Aspect d'Ubichinon compositum et contenu de l'emballage extérieur

Solution injectable.

Pour injection par voie intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique.

Emballage contenant 10 ampoules de 2,2 ml.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drongen (Gent)

Tel.: 09/265 95 65

E-mail: info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

HO-BE661646

Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2023.